

Oversigt over tendenser for ynglefugle og vinterfugle. For hver art er vist en langtidstendens dækkende alle de år, hvor der er udarbejdet indeks for arten samt en korttidstendens for den seneste 10-årige periode. For begge er angivet den gennemsnitlige procentuelle ændring per år, om tendensen er signifikant (**: $p < 0,01$, *: $p < 0,05$) samt om artens bestandsudvikling er positiv, negativ, stabil eller ukendt.

Art (Species)	Yngle (Breeding)				Vinter (Winter)			
	1976-2009		2000-2009		1975/76-2008/09		1999/00-2008/09	
Lille Lappedykker (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	0,58	●	0,69 (ns)	?	5,69 (**)	▲	-2,56 (ns)	?
Toppet Lappedykker (<i>Podiceps cristatus</i>)	-2,29 (**)	▼	3,88 (**)	▲				
Gråstrubet Lappedykker (<i>Podiceps grisegena</i>)	3,09 (**)	▲	5,25 (*)	▲				
Skarv (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	10,37 (**)	▲▲	-2,65 (**)	▼	10,25 (**)	▲▲	10,21 (**)	▲▲
Fiskehejre (<i>Ardea cinerea</i>)	4,01 (**)	▲	-1,48 (*)	▼	3,15 (**)	▲	1,40	●
Knopsvane (<i>Cygnus olor</i>)	0,11	●	-0,67	●	0,86	●	1,92 (*)	▲
Sangsvane (<i>Cygnus cygnus</i>)					7,85 (**)	▲▲	4,48 (**)	▲
Grågås (<i>Anser anser</i>)	6,34 (**)	▲	7,74 (**)	▲▲	22,39 (**)	▲▲	23,65 (**)	▲▲
Canadagås (<i>Branta canadensis</i>)					15,13 (**)	▲▲	4,57	?
Gravand (<i>Tadorna tadorna</i>)	-2,33 (**)	▼	-1,45	●	-7,47 (**)	▼	-11,27 (**)	▼
Gråand (<i>Anas platyrhynchos</i>)	2,02 (**)	▲	1,51 (*)	▲	2,94 (**)	▲	0,97	●
Taffeland (<i>Aythya ferina</i>)	-3,99 (*)	▼	-7,17 (*)	▼	0,79	●	3,24 (ns)	?
Troldand (<i>Aythya fuligula</i>)	0,71	●	-0,91	●	1,82 (*)	▲	5,92 (**)	▲
Ederfugl (<i>Somateria mollissima</i>)	0,07	●	-2,37 (ns)	?	0,27	●	-0,86	●
Hvinand (<i>Bucephala clangula</i>)					1,73 (**)	▲	-0,10	●
Lille Skallesluger (<i>Mergellus albellus</i>)					-3,00 (ns)	?	-16,12 (**)	▼▼
Toppet Skallesluger (<i>Mergus serrator</i>)	-2,42 (**)	▼	5,84 (*)	▲	-0,03	●	-3,61 (ns)	?
Stor Skallesluger (<i>Mergus merganser</i>)					1,20	●	-0,84	●
Rørhøg (<i>Circus aeruginosus</i>)	4,99 (**)	▲	-0,11					
Blå Kærhøg (<i>Circus cyaneus</i>)					-0,89	●	1,76 (ns)	?
Duehøg (<i>Accipiter gentilis</i>)	-4,83 (**)	▼	-10,09 (*)	▼	1,20	●	-12,20 (**)	▼
Spurvehøg (<i>Accipiter nisus</i>)	-0,35	●	-2,31 (ns)	?	-1,87 (**)	▼	-4,76 (**)	▼
Musvåge (<i>Buteo buteo</i>)	2,15 (**)	▲	-1,21	●	2,22 (**)	▲	-0,38	●
Fjeldvåge (<i>Buteo lagopus</i>)					-4,41 (**)	▼	-1,27 (ns)	?
Tårnfalk (<i>Falco tinnunculus</i>)	1,21	●	-1,43	●	0,11	●	-3,36 (**)	▼
Agerhøne (<i>Perdix perdix</i>)	-3,04 (**)	▼	-3,24 (ns)	?	-4,34 (**)	▼	-8,92 (*)	▼
Fasan (<i>Phasianus colchicus</i>)	-0,93 (**)	▼	2,49 (**)	▲	0,73 (*)	▲	1,75	●
Grønbenet Rørhøne (<i>Gallinula chloropus</i>)	-1,92 (**)	▼	-1,27	●	4,93 (**)	▲	17,08 (**)	▲▲
Blishøne (<i>Fulica atra</i>)	0,74	●	3,50 (**)	▼	2,99 (**)	▲	-1,87	●
Strandskade (<i>Haematopus ostralegus</i>)	-0,97 (*)	▼	-1,83 (*)	▼				
Vibe (<i>Vanellus vanellus</i>)	-2,30 (**)	▼	-3,90 (**)	▼	-2,21 (**)	▼	-0,48	●
Dobbeltbekkasin (<i>Gallinago gallinago</i>)	-3,83 (**)	▼	-8,28 (**)	▼				
Storspove (<i>Numenius arquata</i>)	-0,42	●	-5,42 (ns)	?				
Rødben (<i>Tringa totanus</i>)	-3,30 (**)	▼	-3,35 (**)	▼				
Hættemåge (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)	-3,73 (**)	▼	-2,38 (**)	▼	-2,21 (**)	▼	-0,48	●
Stormmåge (<i>Larus canus</i>)	-0,27	●	2,15 (*)	▲	2,03 (**)	▲	2,87 (**)	▲
Sølvmåge (<i>Larus argentatus</i>)	2,21 (**)	▲	1,34	●	-0,82 (*)	▼	1,63 (*)	▲
Svartbag (<i>Larus marinus</i>)	5,19 (**)	▲	-0,27	●	-1,07	●	-2,15	●
Huldue (<i>Columba oenas</i>)	4,15 (**)	▲	1,44 (ns)	?				
Ringdue (<i>Columba palumbus</i>)	1,73 (**)	▲	1,72 (**)	▲	2,97 (**)	▲	3,00 (**)	▲
Tyrkerdue (<i>Streptopelia decaocto</i>)	0,26	●	0,81	●	-1,58	●	-0,91	●
Gøg (<i>Cuculus canorus</i>)	-0,81 (**)	▼	-0,88 (*)	▼				
Natugle (<i>Strix aluco</i>)	-0,96	●	-15,30 (**)	▼				
Mursejler (<i>Apus apus</i>)	-0,31	●	-2,37 (**)	▼				
Isfugl (<i>Alcedo atthis</i>)					7,87 (**)	▲	-0,30 (ns)	?
Grønspætte (<i>Picus viridis</i>)	-3,73 (**)	▼	-11,27 (**)	▼	-1,34	●	1,53 (ns)	?
Sortspætte (<i>Dryocopus martius</i>)	-0,96	●	1,00 (ns)	?				
Stor Flagspætte (<i>Dendrocopos major</i>)	0,82 (**)	▲	3,73 (**)	▲	0,78 (**)	▲	2,33 (**)	▲
Sanglærke (<i>Alauda arvensis</i>)	-1,79 (**)	▼	-4,09 (**)	▼	1,03	●	-15,20 (*)	▼▼
Digesvale (<i>Riparia riparia</i>)	-5,00 (**)	▼	-4,82 (**)	▼				
Landsvale (<i>Hirundo rustica</i>)	-0,50 (*)	▼	2,49 (**)	▲				
Bysvale (<i>Delichon urbicum</i>)	1,16 (**)	▲	-2,23 (**)	▼				
Skovpiber (<i>Anthus trivialis</i>)	-1,09 (**)	▼	0,22	●				
Engpiber (<i>Anthus pratensis</i>)	-2,57 (**)	▼	-1,87	●	2,08	●	2,88 (ns)	?
Gul Vipstjert (<i>Motacilla flava</i>)	-4,46 (**)	▼	3,60 (ns)	?				
Hvid Vipstjert (<i>Motacilla alba</i>)	2,68 (**)	▲	1,66 (**)	▲				
Silkehale (<i>Bombycilla garrulus</i>)					3,56 (*)	▲	15,06 (*)	▲
Vandstær (<i>Cinclus cinclus</i>)					-2,95 (*)	▼	-8,36 (*)	▼
Gærdesmutte (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	2,49 (**)	▲	-0,23	●	3,15 (**)	▲	0,84	●
Jernspurv (<i>Prunella modularis</i>)	-2,61 (**)	▼	-3,87 (**)	▼	-1,80	●	8,04 (*)	▲
Rødhals (<i>Erethacus rubecula</i>)	0,18	●	-1,73 (**)	▼	1,03 (**)	▲	-1,57	●
Nattergal (<i>Luscinia luscinia</i>)	-1,47 (**)	▼	-0,72	●				
Husrødstjert (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	-3,21 (*)	▼	-6,50 (*)	▼				
Rødstjert (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	1,94 (**)	▲	0,90	●				
Bynkefugl (<i>Saxicola rubetra</i>)	-5,65 (**)	▼	-6,03 (**)	▼				
Stenpikker (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	-6,54 (**)	▼	6,71 (ns)	?				
Solsort (<i>Turdus merula</i>)	1,08 (**)	▲	-0,91 (**)	▼	0,59 (**)	▲	-1,82 (**)	▼
Sjagger (<i>Turdus pilaris</i>)	-1,43	●	-5,94 (**)	▼	-0,98 (*)	▼	4,54 (**)	▲
Sangdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	-0,33 (*)	▼	-0,48	●				
Vindrossel (<i>Turdus iliacus</i>)					5,38 (**)	▲	23,85 (**)	▲▲
Misteldrossel (<i>Turdus viscivorus</i>)	1,43	●	-1,88	●				
Græshoppesanger (<i>Locustella naevia</i>)	-3,32 (**)	▼	4,27 (ns)	?				
Sivsanger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	-1,07	●	-3,79 (*)	▼				

Art (Species)	Yngle (Breeding)				Vinter (Winter)			
	1976-2009		2000-2009		1975/76-2008/09		1999/00-2008/09	
Kærsanger (<i>Acrocephalus palustris</i>)	0,72 (*)	▲	0,61	●				
Rørsanger (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	-1,17 (**)	▼	-4,12 (**)	▼				
Gulbug (<i>Hippolais icterina</i>)	-3,78 (**)	▼	-2,86 (**)	▼				
Gærdesanger (<i>Sylvia curruca</i>)	-2,42 (**)	▼	0,17	●				
Tornsanger (<i>Sylvia communis</i>)	0,39 (*)	▲	0,04	●				
Havesanger (<i>Sylvia borin</i>)	-1,40 (**)	▼	-1,45 (**)	▼				
Munk (<i>Sylvia atricapilla</i>)	2,80 (**)	▲	3,25 (**)	▲				
Skovsanger (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)	-3,24 (**)	▼	-0,57	●				
Gransanger (<i>Phylloscopus collybita</i>)	5,19 (**)	▲	4,02 (**)	▲				
Løvsanger (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	-2,99 (**)	▼	-3,96 (**)	▼				
Fuglekonge (<i>Regulus regulus</i>)	-1,14 (**)	▼	-0,26	●	-1,03 (**)	▼	-1,48 (*)	▼
Grå Fluesnapper (<i>Muscicapa striata</i>)	0,16	●	-6,29 (**)	▼				
Broget Fluesnapper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	-3,52 (**)	▼	-3,16 (ns)	?				
Halemejse (<i>Aegithalos caudatus</i>)	0,06	●	-5,65 (ns)	?	-3,23 (**)	▼	0,07	●
Sumpmejse (<i>Parus palustris</i>)	-1,04 (*)	▼	5,58 (**)	▲	-0,79 (*)	▼	3,02 (**)	▲
Topmejse (<i>Parus cristatus</i>)	-2,95 (**)	▼	0,73 (ns)	?	-1,47 (**)	▼	1,95 (ns)	?
Sortmejse (<i>Periparus ater</i>)	-1,51 (**)	▼	-0,57	●	0,71	●	-0,73	●
Blåmejse (<i>Cyanistes caeruleus</i>)	0,72 (**)	▲	1,60 (*)	▲	0,47 (*)	▲	3,78 (**)	▲
Musvit (<i>Parus major</i>)	-0,84 (**)	▼	0,47	●	-0,46 (**)	▼	1,21 (**)	▲
Spætmejse (<i>Sitta europaea</i>)	2,20 (**)	▲	4,10 (**)	▲	1,41 (**)	▲	9,17 (**)	▲▲
Træløber (<i>Certhia familiaris</i>)	1,43 (**)	▲	-0,30	●	0,00	●	0,66	●
Rødrygget Tornskade (<i>Lanius collurio</i>)	-3,06 (**)	▼	-4,60 (*)	▼				
Stor Tornskade (<i>Lanius excubitor</i>)					0,91	●	7,18 (ns)	?
Skovskade (<i>Garrulus glandarius</i>)	0,27	●	3,14 (**)	▲	0,21	●	0,26	●
Husskade (<i>Pica pica</i>)	0,61 (*)	▲	-0,45	●	0,04	●	-1,00	●
Allike (<i>Corvus monedula</i>)	0,17	●	1,17	●	1,19 (**)	▲	1,32	●
Råge (<i>Corvus frugilegus</i>)	1,61 (**)	▲	-0,87	●	-0,29	●	0,34	●
Krage (<i>Corvus corone/cornix</i>)	0,81 (**)	▲	-0,26	●	-0,84 (**)	▼	-1,26 (**)	▼
Ravn (<i>Corvus corax</i>)	9,49 (**)	▲▲	4,43 (*)	▲	12,50 (**)	▲▲	13,72 (**)	▲▲
Stær (<i>Sturnus vulgaris</i>)	-1,99 (**)	▼	-3,42 (**)	▼	-0,16	●	-0,27	?
Gråspurv (<i>Passer domesticus</i>)	-1,61 (**)	▼	-0,13 (ns)	●	-3,64 (**)	▼	-4,75 (**)	▼
Skovspurv (<i>Passer montanus</i>)	2,36 (**)	▲	-0,35 (ns)	●	0,30	●	1,44	●
Bogfinke (<i>Fringilla coelebs</i>)	0,54 (**)	▲	-1,05 (**)	▼	-0,29	●	-3,34 (**)	▼
Kvækerfinke (<i>Fringilla montifringilla</i>)					-0,53	●	-4,66 (ns)	?
Grønirisk (<i>Carduelis chloris</i>)	1,86 (**)	▲	-0,73 (ns)	●	-0,29	●	-0,13	●
Stillits (<i>Carduelis carduelis</i>)	7,53 (**)	▲▲	-4,68 (**)	▼	2,10 (*)	▲	-3,61 (*)	▼
Grønsisken (<i>Carduelis spinus</i>)					-1,00 (*)	▼	3,77 (*)	▲
Tomirisk (<i>Carduelis cannabina</i>)	-2,34 (**)	▼	-4,51 (**)	▼				
Bjergirisk (<i>Carduelis flavirostris</i>)					-2,55 (ns)	?	-4,34 (ns)	?
Gråsisken (<i>Carduelis flammea/cabaret</i>)	-1,77 (**)	▼	-9,75 (*)	▼▼	-2,07 (*)	▼	1,52	?
Lille Korsnæb (<i>Loxia curvirostra</i>)	-3,25 (**)	▼	-2,29 (ns)	?	1,01	●	2,71 (ns)	?
Dompap (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	0,39	●	-7,01 (**)	▼	-0,30	●	-4,76 (**)	▼
Kernebider (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	2,29 (**)	▲	-5,45 (*)	▼	0,46	●	-13,15 (**)	▼
Gulspurv (<i>Emberiza citrinella</i>)	-2,22 (**)	▼	-2,15 (**)	▼	-1,89 (**)	▼	-2,92 (**)	▼
Rørspurv (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	-0,71 (*)	▼	0,00	●	4,13 (ns)	?	-3,07 (ns)	?
Bomlærke (<i>Miliaria calandra</i>)	-0,21	●	-1,24	●	4,25 (**)	▲	-0,58 (ns)	?