



Eremittrossel, Christiansø, 3. november 2021. Foto: Kim Liljehult

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2021

Af Kent Olsen, Henrik Böhmer, Morten Bentzon Hansen, Andreas Bruun Kristensen, Rune Sø Neergaard, Anders Odd Wulff Nielsen, Søren Haaning Nielsen, Oskar Nilsson og Troels Eske Ortvad

Rapport nr. 53 fra Sjældenhedsudvalget

Indledning

Denne rapport omhandler 271 færdigbehandlede fund fra Danmark, heraf 212 fra 2021. Heri indgår også tre sager, som Sjældenhedsudvalget (SU) har behandlet, da det vedrører arter, som skønnes at være sjældne lokalt og derfor indgår som lokale SU-arter i visse regioner, men ikke figurerer på den nationale SU-liste. Sådanne fund publiceres (siden SU-rapport 1995-1996) i den landsdækkende årsrapport, andetsteds i *Fugleåret*, men er tillige nævnt i denne rapport. På opfordring fra lokalrapporternes redaktioner eller DOFbasens Kvalitetsudvalg (DKU) behandler Sjældenhedsudvalget også sager omhandlende fund af almindelige arter truffet på et usædvanligt tidspunkt af året, men i 2021 har der ikke været sådanne sager. 236 (87 %) af de færdigbehandlede fund (heraf 198 (93 %) fra 2021) blev godkendt, hvilket kan sammenlignes med en godkendelsesprocent på mellem 72 % og 92 % de seneste ti år. 216 (92 %) af de godkendte fund blev dokumenteret ved hjælp af foto, video, lydoptagelse, DNA-analyse mv. Fra Grønland færdigbehandlede 27 sager, som alle blev godkendt.

Til og med denne rapport henligger der 25 sager, som af forskellige årsager endnu ikke er færdigbehandlede. En liste over disse sager samt en liste over forkastede fund findes bagerst i rapporten.

Rækkefølgen af arter i den systematiske gennemgang af forekomsterne samt arts- og underartsstatus for diverse taxa følger *International Ornithological Congress* (IOC) *World Bird List* (Gill et al. 2022).

Regionsopdelingen følger samme inddeling, som Sjældenhedsudvalget har fulgt siden 1992 (SU-rapport 1992). Forekomster i *Danmarks eksklusive økonomiske zone* regnes også som danske fund. En uddybende forklaring mht. til definition og afgrænsning af denne zone kan ses i SU-rapport 2011.

Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for hhv. første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen er mindst i sit andet (tredje) kalenderår, men kan være ældre. Derudover er ad. = adult (gammel, udfarvet fugl), imm. = immatur (dragter mellem juvenil og adult), juv. = juvenil (første egentlige fjerdragt), pull. = pullus

(dununge), rst. = rastende, sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt, ekldr. = eklipsedragt, prdr. = pragtdragt, trk.fors. = trækforsøgende, trk. = trækkende, syng. = syngende og ringm. = ringmærket.

Hvor aldersangivelse er baseret på fuglens udseende, benyttes kalenderår (ex. 3K+) frem for dragttype (ex. juvenil, immature og adult). Kalenderårsangivelsen er en betegnelse i henhold til fuglens dragtmæssige udseende og kendskabet til dragtudvikling hos den pågældende art frem for en egentlig aldersbetegnelse. Derfor vil eksempelvis en overvintrende amerikansk sortand (*Melanitta americana*) i adult dragt blive angivet som 3K+ ved fund i 1. halvår og 2K+ i andet halvår uanset om Sjældenhedsudvalget vurderer, at der i 1. og 2. halvår er tale om en genganger. Ligeledes vil eksempelvis en terekklire (*Xenus cinereus*) i adult dragt blive angivet som 2K+, selvom der er tale om et individ, der igennem flere år regnes som en genganger.

Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal anerkendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før 1. januar 1950, 2) antal godkendte fund og individer fra og med 1. januar 1950 til og med 2020 og 3) antal godkendte fund og individer i 2021. Denne opdeling er i overensstemmelse med den standard, der anbefales af Association of European Rarities Committees (AERC 2022). Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid er identisk med antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på én dag ved samme lokalitet regnes som fem fund.



Figur 1. Oversigt over regionsopdelingen anvendt i denne rapport.

I lighed med europæisk standard regnes ynglefund (inkl. unger) som ét fund, hvorfor unger af danske yngleforekomster ikke medregnes i opsummeringen.



Prærietrane, Avnø, 16. januar 2021. Foto: Helge Sørensen



Halsbåndstrolch, Mossø, 11. februar 2021. Foto: Poul Holm Pedersen

Såfremt det vurderes at være overvejende sandsynligt eller sikkert, at fund registreret på flere lokaliteter omhandler samme individ(er), regnes det som ét fund. Derfor vil f.eks. en trækkende sortbrynet albatros (*Thalassarche melanophris*) set fra forskellige kystlokaliteter i Kattegat blive regnet som ét fund ligesom en amerikansk pibeand (*Mareca americana*), der ud fra dragt karakterer kan genkendes på forskellige lokaliteter, vil blive regnet som ét fund. Returnerende individer fra år til år indgår ikke i opsummeringen.

Antal fund og individer fordelt på underarter opsummeres så vidt muligt også. Efter observatørnavnet er det oplyst, om de enkelte fund er dokumenteret med foto (Foto), video (Video), lydoptagelse (Lyd), telemetrisporing (GPS), DNA-analyse (DNA) eller indsamlet død fugl (Død). Desuden er findere(n) ved hvert fund markeret med en asterisk (*) foran observatørnavnet. Imidlertid fremgår det ikke altid tydeligt af beskrivelserne, hvem finderen er, og der kan derfor mangle enkelte markeringer. I beskrivelser til Sjældenhedsudvalget bør det angives, hvem finderen er.

I bemærkningerne til de enkelte arter/underarter er deres normale udbredelsesområder tilføjet i parentes, hvorfra de danske hhv. grønlandske forekomster vurderes at stamme fra.

SU-listen

En liste over arter og underarter, som skal godkendes af SU, kan findes på udvalgets hjemmeside på adressen: www.dof.dk/aktiv-i-dof/grupper-og-udvalg/sjaeldenhedsudvalget/den-danske-fugleliste.

Til og med 2021 skulle fund af buskrørsanger (*Acrocephalus dumetorum*) godkendes af Sjældenhedsudvalget, mens arten udgår af SU-listen fra og med 2022.

En generel vejledning til indsendelse af fund til Sjældenhedsudvalget kan findes på udvalgets hjemmeside. Det er muligt for indsendere at uploade SU-beskrivelser direkte til SU's database. Hvis man vil uploade en beskrivelse til Sjældenhedsudvalget, kan man gå ind på adressen: <http://su.dof.dk/su-opload/index.php>, hvor man vil blive vejledt. Sjældenhedsudvalget modtager også fortsat gerne beskrivelser pr. e-mail, men observatører opfordres til så vidt muligt at uploade deres beskrivelser via Sjældenhedsudvalgets hjemmeside.

Sjældenhedsudvalget behandler fund af arter og underarter, der er på listen over taxa, som skal forelægges udvalget, og nye arter eller underarter for landet fra alle fem kategorier (se nedenfor), og for at få så fyldestgørende et billede som muligt af de enkelte arters og underarters forekomst er det i princippet vigtigt, at alt bliver rapporteret til udvalget. Sjældenhedsudvalget behandler som udgangspunkt alle forekomster af SU-arter, samt taxa, der vurderes at have potentiale til at optræde spontant (kategori A og B) i Nordvesteuropa eller som fritlevende individ fra en selvsupplerende bestand (kategori C). Er man i tvivl om, hvorvidt et fund bør behandles af SU, kan man kontakte udvalget.

Kategorier

I henhold til AERC-standard (AERC 2022) og IUCN-definitioner (McInerny et al. 2022) inddeles de i Danmark

trufne arter og underarter i fem hovedkategorier med underkategorier defineret som følger:

- A: Arter og underarter, der betragtes som tilsyneladende spontant optrædende, og er truffet mindst én gang siden 1. januar 1950, f.eks. amerikansk pibeand (*Mareca americana*) og vibe (*Vanellus vanellus*). Som spontant optrædende regnes ligeledes skibs- eller på anden måde assisterede forekomster, så længe fuglen ikke er blevet fodret eller tilbageholdt undervejs.
- B: Arter og underarter, der betragtes som spontant optrædende, men kun er truffet i perioden fra år 1800 til 1949, f.eks. lille sultanhøne (*Porphyrio alleni*) og østlig kravetrappe (*Chlamydotis macqueenii*).
- C: Arter og underarter, der stammer fra translokation(er) (dvs. udsatte og undslupne arter (IUCN/SCC 2013)), der har resulteret i etableringen af en fritlevende og selvsupplerende bestand, enten herhjemme eller i andre lande. Den danske liste inkluderer ti arter i kategori C: canadagås (*Branta canadensis*), indisk gås (*Anser indicus*) siden 1995, sortsvane (*Cygnus atratus*) siden 1995, nilgås (*Alopochen aegyptiaca*) siden 1993, rustand (*Tadorna ferruginea*) siden 1999, mandarinand (*Aix galericulata*) siden 1995, amerikansk skarveand (*Oxyura jamaicensis*) siden 1985, fasan (*Phasianus colchicus*), klippedue (*Columba livia*) og stor hornugle (*Bubo bubo*). Rustand er i kategori A og kategori C, da arten både forekommer som spontan gæst og som gæst fra fritlevende og selvsupplerende bestande etableret uden for Danmark. Stor hornugle er i kategori B og kategori C, da arten uddøde som ynglefugle i Danmark i 1884, men

er genindvandret i 1984 fra Tyskland, hvor en fritlevende og selvsupplerende bestand har etableret sig på baggrund af introducerede individer. Kategori C opdeles i de seks underkategorier:

- C1: Introducerede arter, der yngler herhjemme, og som alene forekommer som følge af udsætninger og/eller undslupne fangenskabsfugle enten herhjemme eller i andre lande, fx canadagås, nilgås og fasan.
- C2: Introducerede arter, der optræder som følge af udsætninger og/eller undslupne fangenskabsfugle enten herhjemme eller i andre lande, men som også optræder spontant, fx rustand.
- C3: Tidligere ynglefugle, der i dag optræder som følge af re-introduktion enten herhjemme eller i andre lande, fx stor hornugle.
- C4: Introducerede tamformer af arter, som har etableret fritlevende bestand, fx klippedue.
- C5: Arter, som udelukkende optræder som trækgæster fra en fritlevende og selvsupplerende bestand i andre lande.
- C5.1: Arter, som udelukkende optræder som trækgæster fra en fritlevende og selvsupplerende bestand af individer introducerede i andre lande med henblik på at reetablere en tidligere ynglebestand, men hvor der ikke er dokumentation for, at Danmark har indgået i udbredelsen. Ingen danske C-arter er placeret i denne underkategori.
- C5.2: Arter, som udelukkende optræder som trækgæster fra en fritlevende og selvsupplerende bestand af individer introducerede udenfor deres normale udbredelsesområde i lande uden for Danmark, fx indisk gås og sortsvane fra introducerede bestande i Holland og Belgien.



Prærietrane, Lille Vildmose, 9. april 2021. Foto: Christian Andersen Jensen



Asiatisk rødrygget svale, Grenen, Skagen, 2. juni 2021.
Foto: Knud Pedersen

- C6: Arter, som tidligere var placeret i C1, men ikke længere har selvsupplerende bestand og/eller er uddøde. Ingen danske arter er placeret i denne underkategori.
- D: Arter som ville være placeret i A eller B, hvis ikke der var rimelig tvivl om, hvorvidt de nogensinde havde optrådt spontant i landet, f.eks. bøffelend (*Bucephala albeola*) og hvid pelikan (*Pelecanus onocrotalus*).
- E: Arter der betragtes som undsluppet fra fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i landet, eller hvis fritlevende bestande – hvis eksisterende – formentlig ikke er selvsupplerende, f.eks. rosapelikan (*Pelecanus rufescens*), lammegrib (*Gypaetus barbatus*), steppeørn (*Aquila nipalensis*) med stropper og fund af rødhøne (*Alectoris rufa*).



Hætteværling, Grenen, Skagen, 25. maj 2021.
Foto: Sakari Kauppinen



Brun løvsanger, Bygholm Vejle, 2. november 2021. Foto: Henrik Haaning Nielsen



Himalayasanger, Harboøre Tange, 31. oktober 2021. Foto: Stephan Skaarup Båsen Lund

Den officielle danske liste udgøres af arterne i kategori A, B og C. Fund i kategori C, D og E publiceres særskilt bagerst i SU-rapporten.

Danmarkslisten

Sjældenhedsudvalget fører en liste over arter og underarter, som er truffet i Danmark. Listen kan findes på udvalgets hjemmeside på adressen: www.dof.dk/aktiv-i-dof/grupper-og-udvalg/sjaeldenhedsudvalget/den-danske-fugleliste. Sjældenhedsudvalget følger de taksonomiske anbefalinger fra *International Ornithologists' Union* (Gill et al. 2022).

Fra år 2021 er der godkendt én ny art for landet i kategori A: eremitdrossel (*Catharus guttatus*), der er polytypisk med otte underarter: ssp. *guttatus* (eremitdrossel), ssp. *nanus* (yukon-eremitdrossel), ssp. *slevini* (vestcalifornisk eremitdrossel), ssp. *sequoiensis* (mesa- eremitdrossel), ssp. *polionotus* (white mountain-eremitdrossel), ssp. *auduboni* (bjergereemitdrossel), ssp. *faxoni* (østcanadisk eremitdrossel) og ssp. *crymophilus* (newfoundland-eremitdrossel) (Gill et al. 2022). Østcanadisk eremitdrossel (*C. g. faxoni*) yngler fra det nordvestlige til det østlige Canada fra Yukon i vest til de tre maritime provinser: New Brunswick, Nova Scotia og Prince Edward Island i øst og det østlige USA mod syd. Østcanadisk eremitdrossel overvintrer mod syd ned til Florida, og regnes som den mest sandsynlige underart, der kan forekomme i Danmark.

I 2021 er der godkendt det første fund af rødrygget svale (*Cecropis daurica*) tilhørende én af de to asiatiske underarter, ssp. *daurica* (rødrygget svale) eller ssp. *japonica* (centralasiatisk svale). Rødrygget svale er polytypisk med otte underarter: ssp. *daurica* (rødrygget svale), ssp. *japonica* (centralasiatisk svale), ssp. *nipalensis* (himalaya-svale), ssp. *erythropygia* (punjab-svale), ssp. *rufula* (rødnakket svale), ssp. *melanocrissus* (sortgumpet svale), ssp. *kumboensis* (bamenda-svale) og ssp. *emini* (ugandasvale) (Gill et al. 2022). Underarten *daurica* yngler i Mongoliet og det nordlige Kina, mens *japonica* yngler i det østlige Kina og Japan (Gill et al. 2022). Uden enten at kunne foretage biometriske målinger eller en

DNA-analyse er de to asiatiske underarter svært adskil-
lelige. Fundet er godkendt som ssp. *daurica/japonica*,
da det ikke kan henføres til hvilken af de to underarter,
der er tale om, og derfor indgår ingen af de to taxa på
den danske liste.

Fra år 2018 er der godkendt én ny underart for landet
i kategori A i form af grønlandsk gråsiken, ssp. *rostrata*.
Gråsiken (*Acanthis flammea*) er polytypisk med to
underarter: ssp. *flammea* (gråsiken) og ssp. *rostrata*
(grønlandsk gråsiken) (Gill et al. 2022). Formen ssp.
islandica anerkendes ikke længere og er nu inkluderet
under ssp. *rostrata* (Gill et al. 2022).

Med eremitdrossel er der hermed godkendt 490 fugle-
arter i kategori A, B og C i Danmark til og med 2021.

Sjældenhedsudvalgets medlemmer

I 2021 trådte Rasmus Due Nielsen og Simon Sigaard
Christiansen ud af udvalget og blev erstattet af hen-
holdsvis Oskar Nilsson og Henrik Böhmer. Udvalget
bestod ved udgangen af 2021 af følgende medlemmer:
Henrik Böhmer, Ole Zoltan Göller, Morten Bentzon
Hansen, Sakari Kauppinen, Andreas Bruun Kristensen,
Anders Odd Wulff Nielsen, Henrik Haaning Nielsen,
Oskar Nilsson, Kent Olsen (formand) og Troels Eske
Ortvad. Derudover er Søren Sørensen og David Boert-
mann tilknyttet udvalget som konsulenter ved behand-
lingen af fund fra Færøerne hhv. Grønland.

Sjældenhedsudvalgets adresse:

Sjældenhedsudvalget, DOF, Vesterbrogade 138-140,
1620 København V. E-mail: su@dof.dk.

Sjældenhedsudvalgets hjemmeside:

[www.dof.dk/aktiv-i-dof/grupper-og-udvalg/
sjaeldenhedsudvalget](http://www.dof.dk/aktiv-i-dof/grupper-og-udvalg/sjaeldenhedsudvalget)



Kejserørn, Skagen,
17. juni 2021. Foto:
Henrik Haaning
Nielsen

Tak:

For kritik og kommentarer til denne rapport takkes
Jørgen Staarup Christensen, Tim Hesselballe Hansen
og Palle A. F. Rasmussen foruden udvalgets øvrige
medlemmer. For hjælp ved behandlingen af en-
keltsager takkes J. Martin Collinson, Dick Forsman,
Yann Kolbeinsson, Juho Könönen, Hans Larsson,
Björn Malmhagen, Rasmus Strack og Roni Väisänen.
Derudover takkes Niklas Andersson, Tor A. Olsen, Roni
Väisänen, Tadeusz Stawarczyk, Christopher König,
Vincent van der Spek, Paul French og Yann Kolbeins-
son for informationer om forekomster i hhv. Sverige,
Norge, Finland, Polen, Tyskland, Holland, Storbritannien
og Island. Den største tak rettes dog til de mange, der
rapporterede deres observationer til Sjældenheds-
udvalget og dermed skabte grundlaget for denne
rapport.



Korttået lærke, Christiansø, 29. maj 2021. Foto: Rasmus Tranberg



Sibirisk bynkefugl/japansk bynkefugl, Grønningen, 21. oktober 2021. Foto: Hans Ægidius

Sjældne fugle i 2021

Årets første sjældne fugl blev fundet nytårsdag i form af en amerikansk sortand på Mols (ÅH). Ellers var januar præget af den fortsatte tilstedeværelse af en række langtidsstationære fugle, der var blevet fundet allerede i slutningen af 2020, f.eks. to asiatiske fløjsænder i Odsherred (S), en mellemflagspætte i Rindum (RK) og en langnæbbet sneppeklire ved Horsens Fjord (VE/ÅH). Derudover blev en prærietrane, der var blevet fundet på Møn i de allersidste dage af december 2020, set på ikke mindre end fire forskellige sjællandske lokaliteter i løbet af januar. Samme fugl sås i løbet af februar til maj uden på flere lokaliteter i det nordlige Jylland, før den i starten af maj trak ud mod Sverige fra Skagen (NJ).

Starten af februar bød på to halsbåndstrolde i det jyske ved hhv. Mossø (ÅH) og Slivsø (SJ). Derudover var det mest bemærkelsesværdige en gps-mærket høgeørn ("3C"), der midt i februar blev registreret via GPS-signal fra Lovrup Skov (SJ). Samme fugl opholdt sig i Danmark i store dele af 2020 og har således sandsynligvis tilbragt vinteren i Danmark.

Overskriften i marts var en hun hvidkindet værling, der sås ved foderpladser i sommerhushaver ved Rødhus (NJ) i dagene 14-28/3. I samme del af landet noteredes i marts endvidere en stellersand på Hirsholmene (NJ). I den anden ende af Jylland sås en mellemflagspætte i Kollund Skov (SJ), og sidst på måneden trak årets eneste blå glente forbi Tontoft Nakke på Als (SJ). Desuden blev en halsbåndstrolde opdaget på Sydsjælland ved

Bjørnebæk Sø (S), samme fugl sås i april i både Gyrstinge Sø (S) og Søndersø (S).

Den største overraskelse i april var en sortbrynet albatros, der 17/4 trak forbi Skagen (NJ), samme fugl sås derefter 22/4 ved Gilleleje (S). Dertil bød april på en mellemflagspætte i Kogsbøl Mose (SJ), en nathejre trækende over Middelfart (F) om natten, en kohejre i Vejlerne (NJ), en høgeørn i Skagen (NJ) samt en langnæbbet sneppeklire opdaget sidst på måneden på Fanø (RB).

Vejret i maj var domineret af usædvanlig koldt vejr, hvilket satte sit præg på mængden og diversiteten af sjældne fugle. Ikke desto mindre sås en række sjældne arter, mest overraskende landets tredje tornhalesejler, som sås 17/5 ved Vest Stadil Fjord (RK) samt en storskråpe, der 15/5 først sås trække forbi Blåvand (RB) og senere på dagen forbi Søndervig (RK). Dertil rastede en rødvinget braksvalde i flere dage ved Vilsted Sø (NJ), og en lille bjergand opholdt sig i over to uger i Vejlerne (NJ). To rødstrubede sangere sås ved henholdsvis Nørre Rubjerg (NJ) og Gedser Odde (LF). En iberisk sanger rastede én dag på Christiansø (B), hvilket var landets sjette fund og første, uden for den jyske vestkyst. I Skagen (NJ) sås i maj en alpe sejler og en hætteværling. Maj bød også på en kohejre i Lille Vildmose (NJ), samt to korttåede lærker på hhv. Hesselø (S) og Christiansø (B); endnu én fulgte i juni på Fanø (RB).

I starten af juni kom varmen, og med sig bragte den en kavalkade af sjældne fugle. Især i Skagen (NJ), hvor landets første rødryggede svalde ssp. *daurica/japonica* sås

2/6. Skagen bød i juni desuden på en vestlig bjergløv-sanger, endnu en hætteværpling, en bonapartemåge, en kejserørn, en rosenderne, en atlantisk/scopolis skråpe, en høgeørn samt en gåsegrib, der gjorde trækforsøg i starten af måneden. Samme fugl sås sidenhen på Langeland (F) og Samsø (ÅH), hvor den opholdt sig helt til slutningen af juli. Af småfugle i juni kan nævnes en hætteværpling på Christiansø (B) og en rødhovedet tornskade ved Oksbøl (RB). Derudover skal nævnes en sortvinget braksvaler i Vejlerne (NJ), en purpurhejre ved Skjern Enge (RK) og en alpesejler i Gedser (LF) samt to syngende dværgrørvagtler i hhv. Sølsted Mose (SJ) og Lille Vildmose (NJ).

Som vanligt forløb juli mere stille og roligt. Højdepunktet var landets blot andet fund af orientbraksvaler, som blev gjort 4/7 ved Margrethe Kog (SJ). Fuglen sås på lokaliteten i flere dage i juli, før den forsvandt, for igen at dukke op på samme lokalitet i midten af oktober. Eneste øvrige fund af sjældne vadefugle var en lille gulben ved Kammerlusen (RB) og en prærieløber i Margrethe Kog (SJ). Bemærkelsesværdigt var også det første fund af nordsanger i juli, idet en fugl blev ringmærket 28/7 i Blåvand (RB).

Det mest overraskende fund i august var uden tvivl en østlig turteldue 31/8 på Ertholmene (B) på en for arten meget tidlig dato i Europa. Derudover sås blot meget få sjældne fugle, nævnes skal to forskellige balearskræper på den jyske vestkyst og en triel, der rastede på Værnengene (RK).



*Rødvinget braksvaler,
Vilsted Sø, 19. maj 2021.
Foto: Albert Steen-Hansen*

I september løb Skagen (NJ) endnu en gang med overskrifterne, da Danmarks tredje grøn sanger blev fotograferet og lydoptaget 7/9 i Ellekrattet. Lige i hælene fulgte Christiansø (B) med en ringmærket stribet græshoppesanger 14/9 samt ditto blåstjert 29/9. Begge arter er blot registreret én gang tidligere på Ertholmene. Rovfuglene udmærkede sig med fund af stor skrikeørn ved Stevns (S) og ørnevåge ved Rudbøl Kog (SJ). Af



Kohejre, Rakkeby, Mors, 17. november 2021. Foto: Poul Holm Pedersen

havfugle sås en atlantisk/scopolis skråpe ved Hundested (S) samt en balearskråpe ved Vejers Strand (RB) - årets tredje fund af arten. Værd at bemærke var også landets andet septemberfund af amerikansk pibeand, da en han rastede en enkelt dag i Hovvig (S). Samme fugl dukkede op igen i området i slutningen af november.

Som sædvanligt bød oktober på mange sjældne fugle. En bairdsryle blev månedens sjældneste, da en fugl blev opdaget 21/10 i Blåvand (RB) i forbindelse med felttræf. På vanlig vis sås i oktober en række sjældne småfugle især langs den jyske vestkyst. Således bød området ved Blåvand (RB) på en blåstjert, en schwarz' løvsanger, tre tajgapibere og to sibiriske/japanske bynkefugle. Andre steder på den jyske vestkyst sås en tajgapiber ved Roborghus (RB), en sibirisk/japansk bynkefugl i Thyborøn (RK) og i samme område en himalayasangere på Harboøre Tange (RK), samt sluttelig en blåstjert og en brun løvsanger på Mandø (RB) - yderligere tre brune løvsangere fulgte i landet i november. Dertil blev en nonnestenpikker fundet på Ertholmene (B) og en pileværting sås rastede på Saltholm (S). Af øvrige sjældne fugle i oktober kan nævnes en lille gulben i Margrethe Kog (SJ), en atlantisk/scopolis skråpe ved Fyns Hoved (F), en polartomvie ved Gilleje (S), en kohejre i Vestsjælland og en amerikansk sortand ved Hulsig (NJ).

Novembers ubetingede højdepunkt var Danmarks første fund af eremitdrossel, i form af en fugl, der blev ringmærket 4/11 Christiansø (B). På samme lokalitet sås

også en himalayasangere midt på måneden. I den anden ende af landet holdt landets tredje isabellastenpikker til 14-17/11 på stranden ved Blåvand (RB). Dertil kan nævnes endnu en kohejre - denne gang på Mors (NJ) samt årets eneste jagtfalk, som blev opdaget i Vejlerne (NJ) sidst på måneden.

I december indfandt der sig mellemflagspætter på to for arten efterhånden klassiske lokaliteter i det sønderjyske, Gråsten Slotspark (SJ) og Draved Skov (SJ). Måneden bød desuden på en amerikansk sortand ved Øster Hurup (NJ) og en asiatisk fløjlsand returnerede for anden vinter i træk til Høve Strand (S) i Odsherred.

Kategori A: Spontane forekomster

Category A: Species recorded in an apparently wild state

Amerikansk pibeand *Mareca americana* (0, 45/45, 2/2)

2021: 1-2/6, Arup Vejle (NJ), 2K han, *Henrik Haaning Nielsen, Jan Svejgaard Jensen (Foto). - 16/6 + 29-30/6, Bygholm Vejle (NJ), 2K han, Henrik Haaning Nielsen, Mogens Neergaard, Carsten Svejstrup Sørensen (Foto). - 26/9, Hovvig, Nykøbing Sjælland (S), 2K+ han, *Erik Vikkelsø Rasmussen m.fl. (Foto). - 27/11-5/12, Nykøbing Bugt, Nykøbing Sjælland (S), 2K+ han, *Knud Flensted, Erik Vikkelsø Rasmussen m.fl. (Foto).

Fundene i juni i Arup Vejle og Bygholm Vejle vurderes at omhandle samme individ og regnes som ét fund.



Lille bjergand, Han Vejle, 24. maj 2021. Foto: Henrik Haaning Nielsen



Amerikansk pibeand, Bygholm Vejle, 29. juni 2021. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Tilsvarende bliver fundene fra Hovvig og Nykøbing Bugt regnet som ét fund. Dermed det kun femte godkendte fund fra Sjælland. Artens forekomst i Danmark er med en klar overvægt af fund fra Nord- og Vestjylland, mens antallet af fund er markant færre i Østjylland og på Fyn, Sjælland og Bornholm. (Nordamerika)

Hvidøjet and *Aythya nyroca* (4/4, 64/71, 1/1)

2021: 1-5/1, Grusgrave ved Birkum (F), 3K+ han, Per Rasmussen, Henrik Kalckar Hansen m.fl. (Foto). – 1/1-10/2, Kiskelund Plantage og Kruså Møllesø (SJ), 3K+ han, Jørn Vinther Sørensen m.fl. (Foto). – 1-6/6, Knabberup Sø (VE), han, Johnny Videriksen m.fl. (Foto). – 18/7-24/8, Damhussøen, København (S), 2K+ han, *Tim Andersen, Jørgen Hulbæk Christiansen, Rasmus Strack m.fl. (Foto). – 22/8-4/10, Sønderød, Maribo (LF), 2K+ han, *Rasmus Strack m.fl. (Foto). – 31/10-31/12, Kiskelund Plantage og Kruså Møllesø (SJ), 2K+ han, *Jørn Vinther Sørensen m.fl. (Foto).

År 2021 bød på ét nyt fund, i Knabberup Sø, samt fire gengangere: Fuglen ved Grusgrave ved Birkum blev opdaget ved lokaliteten 31/10 2020 (SU-rapport 2020); fuglen ved Kiskelund Plantage og Kruså Møllesø er set ved lokaliteterne årligt siden 2017, i vinterhalvåret (yderdatoer, 6/10-19/3); fuglen i Damhussøen har oversomret ved lokaliteten årligt siden 2019 (yderdatoer hidtil, 27/6-21/8); fuglen i Sønderød, Maribo, regnes som genganger fra tidligere år; arten er set årligt i Maribosøerne siden 2016. (Øst- & Sydøsteuropa; overvintrer Middelhavet, Sortehavet & Nordafrika)



Halsbåndstrolchand, Sønderød, 15. april 2021. Foto: Sakari Kauppinen

Halsbåndstrolchand *Aythya collaris* (0, 20/20, 2/2)

2021: 4/1-1/2, Skjern Enge (RK), 3K+ han, *Ole Amstrup m.fl. (Foto). – 2-27/2, Mossø (ÅH), 3K+ han, *Jens Ballegaard m.fl. (Foto). – 10-18/2, Slivssø, Hoptrup (SJ), 3K+ han, *Gerda Bladt m.fl. (Foto). – 8/3-5/4, Bjørnebæk Sø, Bissrup (S), 3K+ han, *Jørgen Hulbæk Christiansen, *Tim Andersen, Rasmus Strack m.fl. (Foto). – 12/4, Gyrtinge Sø, Ringsted (S), 3K+ han, *Jan Svejgaard Jensen m.fl. (Foto). – 13-25/4, Sønderød, Værløse (S), 3K+ han, *Jesper Brodersen m.fl. (Foto). – 22-23/10, Sønderød, Værløse (S), 2K+ han, *Jesper Brodersen, Jonatan Hauge Noldegaard m.fl. (Foto & Video).

År 2021 bød på to fund, som vurderes at omhandle "nye" individer; fundene ved Mossø og Slivsø. Fundet fra Skjern Enge regnes som genganger med fuglen, som har gæstet lokaliteten de seneste to vintre, senest 1-4/1 2020 (SU-rapport 2020). Endvidere regnes fundene fra Bjørnebæk Sø og Gyrrtinge Sø som samme individ og som genganger med fuglen i Søndersø, Værløse. Det er første gang, at sidstnævnte vurderes som en genganger med fund uden for NØ-Sjælland. (Nordamerika)

Lille bjergand *Aythya affinis* (0, 9/9, 1/1)

2021: 15/5-1/6, Kogleaks, Han Vejle og Selbjerg Vejle (NJ), 3K+ han, *Asger Lykkegaard Møldrup, Henrik Haaning Nielsen, Lars Grøn m.fl. (Foto).

Første fund siden 2015/2016 og det tredje fund i Vejlerne, som også husede Danmarks første fund, 5-7/5 1985 ad. han Bygholm Vejle (SU-rapport 1994). De i alt ti danske fund falder i perioden fra december-juni, med nu to fund i både december, februar og maj. (Nordamerika)

Stellersand *Polysticta stelleri* (7/9, 94/116, 1/1)

2000: 31/12, Korshage, Rørvig (S), 1K/hun trk., derefter rst., *Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl.

2021: 16-19/3, Hirsholmene (NJ), 3K+ han, *Frede Jakobsen m.fl. (Foto).

Fundet i 2021 er det første siden 2018, hvor der blev set to fugle (SU-rapport 2018). Fundet udgør det kun syvende fund af arten siden 2010, hvor arten genindtrådte på SU-listen. Arten var taget af SU-listen 1991-2009, men opsummeringen inkluderer nu alle fund jf. Christensen *et al.* (2022) foruden fundet fra 2000. (Sibirien; overvintrer Barentshavet & Østersøen)

Asiatisk fløjlsand *Melanitta stejnegeri* (0, 6/6, 0)

2021: 1-25/1, Høve Strand (S), 3K+ han, Sebastian Klein m.fl. (Foto & Video). – 3/1-23/3, Kattegat ud for Sandflugtsplantagen, Rørvig (S), 3K+ han, *Rasmus Strack, *Peter Christiansen m.fl. (Foto & Video). – 19-31/12, Høve Strand og Ordrup Næs (S), 3K+ han, *Joshua Haahr, *Sebastian Thorup Hansen m.fl. (Foto).

Alle fundene gjort i 2021 regnes som gengangere fra tidligere år. Fuglen, der sås i januar ved Høve Strand, blev opdaget allerede i december 2020 (SU-rapport 2020). Den regionale fordeling af de danske fund er RB (2) og S (4). Den månedlige fordeling af de danske fund er februar (2), september (1), oktober (2) og december (1). Første danske fund blev gjort så sent som 2009, hvor en fugl blev fundet i oktober ved Blåvand (SU-rapport 2009). I det nordvestlige Estland blev der ved Cape Põõsaspea i perioden 1/7-5/11 2019 registreret 67.000 trækkende fløjlsænder (*M. fusca*), hvoraf størstedelen ikke var mulige at tjekke for asiatisk eller amerikansk fløjlsand. Ikke desto mindre blev otte asiatiske fløjlsænder samt tre ubestemte asiatiske/amerikanske fløjlsænder (*M. deglandi*) fundet trækkende forbi - alle 2K+ hanner. På baggrund af observationerne blev det vurderet, at for hver 800 positivt identificeret 2K+ han, var der én asiatisk fløjlsand eller asiatisk/amerikansk fløjlsand (Könönen 2022). (Nordøstasien)



Alpeesejler, Gedser Odde, 6. juni 2021. Foto: Gert Juul Jeppesen

Amerikansk sortand *Melanitta americana* (0, 33/33, 3/3)

2021: 1-26/1, Dragsmur (ÅH), 3K+ han, *Morten D. D. Hansen, Emil Skovgaard Brandtoft m.fl. (Foto). – 1/1-24/1, Asserbo Strand og Melby Overdrev (S), 3K+ han, Morten Christensen m.fl. (Foto). – 1-30/3, Asserbo Strand (S), 3K+ han, Sakari Kauppinen, Jakob Engelhard m.fl. (Foto). – 21/2, Hvidbjerg Strand, Blåvand (RB), 3K+ han, *Henrik Böhmer (Foto). – 22+31/3 + 11-14/4, Hirtshals Havn, Kjul Strand og Hirtshals Øststrand (NJ), 3K+ han, Rune Sø Neergaard m.fl. (Foto & Video). – 8/4, Blåvands Huk (RB), 3K+ han, Samuel Perfect, David Manstrup, Bent Jacobsen (Foto). – 16-20/10, Hulsig og Karred, Ålbæk Bugt (NJ), 2K+ han, *Henrik Thorhauge Rask, Alex Sand Frich m.fl. (Foto). – 24/10, Asserbo Strand (S), 2K+ han, *Jakob Engelhard m.fl. (Foto). – 24-31/12, Asserbo Strand og Melby Strand (S), 2K+ han, *Jakob Engelhard m.fl. (Foto). – 27/10, Vejers Strand (RB), 2K+ han, *Henrik Böhmer. – 14/12, Kysten mellem Øster Hurup og Tofte Skov (NJ), 2K+ han, *Rune Sø Neergaard (Foto & Video). – 17-18/12, Dragsmur (ÅH), 2K+ han, *Kim Nørgaard Mouritsen, Michael Knudsen m.fl. (Foto).

Der blev registreret tre nye fund i 2021: Dragsmur i januar, Hulsig/Karred i oktober og kysten mellem Øster Hurup og Tofte Skov i december. De resterende fund i 2021 anses som gengangere. Danmark er det land i Europa med næstflest fund af amerikansk sortand kun overgået af Sverige, hvor der er gjort 43 fund t.o.m. 2021, heraf tre fund i 2021. I de øvrige lande i Nordvesteuropa er der t.o.m. 2021 gjort følgende antal fund: Finland (7) (Tarsiger 2022), Holland (4) (CDNA 2022), Norge (5) (Norgelisten 2022), Polen (16) (Komisja Faunistyczna 2022), Storbritannien (15) (Paul French pr. mail) og Tyskland (5) (Christopher König pr. mail). (Nordamerika & Nordøstsibirien)

Tornhalesejler *Hirundapus caudacutus* (0, 2/2, 1/1)

2021: 17/5, Vest Stadil Fjord (RK), rst., derefter trk., *Svend Erik Petersen, Jens Ballegaard (Foto).

Tredje fund og, ligesom de to tidligere fra henholdsvis Juvre, Rømhøj (SJ) 21/10 2012 (SU-rapport 2012) og Grønhøj Strand (NJ) 28/7 2019 (SU-rapport 2019),

blot set ganske kortvarigt. Fuglen fouragerede langs et læhegn i to minutter ved 9-tiden om morgenen og blev fotodokumenteret med en smartphone, før den fortsatte mod nord. Der var ingen fund af arten i vores nabolande i 2021, men Island havde sit første fund af arten ved Latrabjarg, NV-Island, 20/6 (Birding Iceland 2021). (Nordlige Asien; overvintrer Sydøstasien & Australien)

Alpesejler *Tachymarpis melba* (3/3, 36/37, 2/2)

2021: 10/5, Pælebakke Klit, Skagen (NJ), trk., *Hans Christophersen, Knud Pedersen, Mikkel Høybye Ras-mussen m.fl. – 6/6, Gedser Odde (LF), rst., derefter trk., *Louis A. Hansen, *Jimmy Skat Hansen, Ole Friis Larsen m.fl. (Foto).

Ottende fund i Skagen, men første siden 2002. Fundet i Gedser er det andet for lokaliteten; første var en trk. 18/9 1994 (SU-rapport 1994). Bedste år for arten med tre fund er 1986, 1994 og 2013. (Alperne, Sydeuropa & Lilleasien mod øst til vestlige Himalaya; overvintrer tropisk Afrika)

Østlig turteldue *Streptopelia orientalis* (6/6, 4/4, 1/1)

2021: 31/8-4/9, Ertholmene (B), 1K, *Anton Herrig Liebermann, *Hans Ole Matthiesen m.fl. (Foto).

Et fænologisk meget overraskende fund; tidligere danske fund er gjort i perioden oktober til marts, og størstedelen af fund i Nord- og Vesteuropa er gjort i det sene efterår og om vinteren. Fra Sverige foreligger dog et fund af en 1K hun i Västerbotten 10-24/8 1923 (Birdlife Sverige 2022). I 2021 var der i Sverige to fund;

januar-marts i Västerbotten og december i Uppland (Artportalen 2022), mens Norge havde et enkelt i november (Olsen 2022). (Centrale Sibirien & Uzbekistan østpå til Stillehavet; overvintrer Sydasien)

Dværgrørvagtel *Zapornia pusilla* (3/3, 17/17, 2/2)

2021: 5-7/6, Lille Vildmose (NJ), han syng., *Jan Svejgaard Jensen m.fl. (Lyd). – 7-28/6, Sølsted Mose (SJ), han syng., Kaj Abildgaard, Lene Berthing m.fl. (Lyd).

Tredje år i træk med fund af arten. 15 af de 22 danske fund er gjort i juni; de resterende er fra maj (4), juli (4) og september (1). Fundet i Lille Vildmose er det femte for lokaliteten – alle siden 2011, hvilket kun er overgået af Vejlerne (NJ) med seks fund; her er seneste fund dog helt tilbage i 1998. Tyskland havde ca. fem fund i 2021 (Christopher König pr. mail), mens arten sidst er set i Sverige i 2012. Den er aldrig truffet i Norge. (Syd- & Østeuropa; overvintrer Afrika)

Prærietrane *Antigone canadensis* (0, 2/2, 0)

Med karakterer svarende til lille prærietrane, ssp. *canadensis* (0, 2/2, 0)

2021: 2/1, Masnedsund Havn, Vordingborg (S), 3K+, Arne Holdensen (Foto). – 14-16/1, Avnø og Svinø (S), 3K+, *Jørgen Peter Kjeldsen m.fl. (Foto). – 31/1, Melby Overdrev (S), 3K+, trk. NV, *Marianne Brynfeldt, *Thomas Vikstrøm. – 31/1, Torup Enghave og Sølager Strandeng ved Hundested, Halsnæs (S), 3K+, rst. og dernæst trk., *Michael Trasborg, *Didrich Didrichsen, *Stig Rubæk m.fl. (Foto). – 14-19/2, Gravlev Sø, Støvring (NJ), 3K+, *Aage Langeland, Hans Christophersen, Thomas



Østlig turteldue, Ertholmene, 31. august 2021. Foto: Anton Herrig Liebermann



Prærietrane, Viskum, 20. marts 2021. Foto: Tonny Ravn Kristiansen

Munch m.fl. (Foto). – 20/3, Viskum (NJ), 3K+, *Tonny Ravn Kristiansen m.fl. (Foto). – 27/3-9/4, Lille Vildmose (NJ), 3K+, *Claus Rømer m.fl. (Foto). – 12/4-2/5, Vust Holme og Bygholm Vejle (NJ), 3K+, *Stig Brix, Henrik

Haaning Nielsen m.fl. (Foto). – 8/5, Troldkær, Råbjerg Enge (NJ), 3K+, *Peter Manstrup, Oluf Lou m.fl. (Foto). – 8/5, Hulsig Hede og Skagen (NJ), 3K+ trk., Anders Østerbye, Alex Sand Frich m.fl. (Foto).



Prærietrane, Avnø, 15. januar 2021. Foto: Bo Tureby



Bairdsryle, Hvidbjerg Strand, 21. oktober 2021. Foto: Louis Kristoffer Poulsen

Alle årets fund vedrører samme individ på danmarksturné. Fuglen sås første gang i Danmark 27/12 2020 ved Røddinge, Møn (SU-rapport 2020). Efter at være trukket ud ved Skagen blev fuglen genfundet i Jämtland, Sverige, ca. 600 km NNØ for Skagen 13-14/5 (Artportalen 2022), i Troms og Finnmark, Nordnorge, 1/6-30/8 (Olsen 2022) og nær Oulo, Nordfinland, 5-12/10 (Tarsiger 2022). Fuglen er godkendt som lille prærietrane (ssp. *canadensis*), som yngler i NØ-Sibirien, Alaska og det nordlige Canada til Baffinøen (Gill *et al.* 2022), og som må betragtes som den klart mest potentielle strejfgæst i Europa. (ssp. *canadensis*: Nordøstlige Sibirien, Alaska og det nordlige Canada til Baffin Island; overvintrer sydvestlige USA)

Triel *Burhinus oediceus* (13/13, 44/44, 1/1)

2021: 30/8, Værnengene, Ringkøbing Fjord (RK), *Jan Mønsted (Foto).

I Fennoskandinavien var der følgende antal fund i 2021: Finland (2) (Tarsiger 2022), Norge (3) (Olsen 2022) og Sverige (1) (Artportalen 2022). Rent tidsmæssigt er fundet ikke videre typisk, idet det kun er det femte fund fra august måned. Den månedlige fordeling af de danske fund er med årets fund følgende: januar (1), april (6), maj (17), juni (7), juli (9), august (5), september (2), oktober (5), november (4) og december (1). Dertil kommer et ældre fund fra 1850 uden eksakt datoangivelse. (Mellem- & Sydeuropa; overvintrer Sydeuropa & Nordafrika)

Bairdsryle *Calidris bairdii* (0, 5/5, 1/1)

2021: 21-24/10, Hvidbjerg Strand og Grønningen, Blåvand (RB), 1K, *Carit Johan Xerxes Walter, *Louis K. Poulsen m.fl. (Foto).

Første fund fra oktober og dermed det seneste danske fund. Bortset fra et fund af en adult fugl 26/8 2006 ved Gerå (NJ) har alle øvrige danske fund drejet sig om 1K-fugle set i september (SU-rapport 2006). Af disse var det hidtil seneste fund 23-24/9 2017, Ballum (SJ) (SU-rapport 2017). Artens optræden i Nordvesteuropa i 2021 var relativt normal, således var der ét fund i Tyskland (Christopher König pr. mail) og fem i Storbritannien (Paul French pr. mail). I perioden 1989-2018 er der i gennemsnit gjort 6,4 fund pr år (BBRC 2022). Arten sås ikke i hverken det øvrige Skandinavien eller i Holland i 2021. (Arktisk Nordamerika & nordøstligste Sibirien; overvintrer Sydamerika)

Prærieløber *Calidris subruficollis* (1/1, 52/53, 1/1)

2021: 25-26/7, Margrethe Kog (SJ), 2K+ sdr., *Christian Leth, Henrik Læssøe m.fl.

Fundet udgør det sjette fund fra juli og det syvende fra Tøndermarsken (SJ). Med årets fund er den månedlige fordeling af de danske fund: maj (7), juni (3), juli (6), august (15), september (15) og oktober (8). I 2021 var der to fund i Norge (Olsen 2022), ét i Finland (Tarsiger 2022) og fem i Sverige (Artportalen 2022). (Arktisk Nordamerika; overvintrer Sydamerika)

Langnæbbet sneppeklire *Limnodromus scolopaceus* (1/1, 17/17, 1/1)

2021: 1-16/1, Borre, Horsens Fjord (VE), 2K, Kim Biledgaard m.fl. (Foto). – 1-19/1, Alrø Egehoved (ÅH), 2K, Gitte Nielsen m.fl. (Foto). – 29/4-12/5, Fanø Nordveststrand (RB), sdr., *Per Kjær m.fl. (Foto).

De to fund fra hhv. Borre og Alrø Egehoved drejer sig om samme fugl, der pendlede mellem de to lokaliteter,

som ligger på hver sin side af Horsens Fjord. Denne fugl blev fundet allerede i november 2020 (SU-rapport 2020). Fundet fra Fanø er det tredje fra april. Månedsfordelingen af de danske fund er januar (1), april (3), maj (6), juni (2), juli (2), august (1), september (2) og november (2). Ganske bemærkelsesværdigt var der i 2021 hele seks fund i Tyskland, hvilket skal ses i lyset af blot ti tidligere fund i perioden 1977-2020 (Christopher König pr. mail). I de øvrige lande i Nordvesteuropa var forekomsten mere moderat med følgende antal fund i de forskellige lande: Holland (1) (CDNA 2022), Norge (2) (Olsen 2022), Storbritannien (4) (Paul French pr. mail) og Sverige (1) (Artportalen 2022). (Nordamerika & østlige Sibirien; overvintrer Sydamerika)

Terekklire *Xenus cinereus* (0, 59/59, 0)

2021: 28/5, Vidåslusen, Højer (SJ), sdr., *Jens Ballegaard m.fl. (Foto).

Eneste fund i 2021 drejer sig om det tilbagevendende individ, som hvert år siden 2008 er set i området ved Vidåslusen/Saltvandssøen (SU-rapport 2019). (Finland, Belarus og Rusland; overvintrer tropisk Afrika, kysterne langs Det Indiske Ocean, Sydøstasien & Australien)

Lille gulben *Tringa flavipes* (1/1, 13/13, 2/2)

2021: 1/7, Indvindingen, Kammerlusen, Ribe (RB), 2K+ sdr., *Rune Sø Neergaard (Foto & Video). – 7-11/10 + 2-15/11, Saltvandssøen, Margrethe Kog (SJ), 1K, *Kari Varvikko, *Pentti Huttunen, Bjarne Nielsen m.fl. (Foto).

To fund af arten i år, hvilket er det næstbedste år kun overgået af 2020, hvor der blev gjort hele fire fund. Det er samtidig tredje år i træk med fund af arten. Både i oktober og november sås lille gulben stort set samme sted i den sydlige del af Saltvandssøen. Derfor regnes fundene på lokaliteten i oktober og november for at dreje sig om samme fugl, selvom der var en pause på 20 dage mellem observationerne. Den regionale fordeling af fund af arten er dermed følgende: NJ (5), RK (1), RB (2), SJ (4), F (1), S (1) og LF (2). Til sammenligning var der følgende antal fund i andre Nord- og Mellem-europæiske lande: Finland (1) (Tarsiger 2022), Holland (1) (CDNA 2022), Norge (3) (Olsen 2022), Polen (1) (Komisja Faunistyczna 2022), Sverige (2) (Artportalen 2022) og Tyskland (1) (Christopher König pr. mail). (Nordamerika; overvintrer Mellem- & Sydamerika)

Rødvinget braksval *Glareola pratincola* (1/1, 16/16, 1/1)

2021: 17-20/5, Vilsted Sø (NJ), sdr., *Thomas Siig, Mikkel Rasmussen m.fl. (Foto).

Fundet er det sjette siden årtusindskiftet. Fordelingen af de danske fund på årtier er som følger: før 1950 (1), 1970-1979 (1), 1980-1989 (5), 1990-1999 (5), 2000-2009 (2), 2010-2019 (3) og 2020-2021 (1). Fundmønsteret indikerer således, at arten er blevet sjældnere i Danmark siden årtusindskiftet. Årets fund er tidsmæssigt typisk, idet maj er den måned med flest danske fund. Månedsfordelingen er følgende: maj (8), juni (4),



Langnæbbet sneppeklire, Fanø Nordveststrand, 8. maj 2021. Foto: Søren Brinch



*Orientbraksvale,
Margrethe Kog,
17. oktober 2021.
Foto: Jan Lindgaard
Rasmussen*

juli (1), august (4) og september (1). Arten sås også i flere af de andre nordeuropæiske lande i 2021: Finland (1) (Tarsiger 2022), Polen (3) (Komisja Faunistyczna 2022), Storbritannien (6) (Paul French pr. mail) og Tyskland (4) (Christopher König pr. mail). Bemærk, at der var en fejl i opsummeringen i SU-rapport 2019 (se rettelser sidst i indeværende rapport). (Sydeuropa & Centralasien; overvintrer tropisk Afrika)

Orientbraksvale *Glaucopis trichotis* (0, 1/1, 1/1)

2021: 4-8/7, Vidåslusen og Margrethe Kog (SJ), 2K+ sdr., *Lilly Sørensen, *Niels Bomholt Jensen, Jesper Johannes Madsen m.fl. (Foto). – 16-19/10, Margrethe Kog (SJ), 2K+ vdr., *Ole Goldschmidt m.fl. (Foto).

Landets andet fund udgøres af en fugl, der først sås i juli og derefter igen i oktober i området ved Margrethe Kog. Første danske fund var 26/5 2010, Vest Stadil Fjord (RK) (SU-rapport 2010). På baggrund af individspecifikke

skader i svingfjerene i begge vinger kunne det konstateres, at det var samme fugl, der sås på flere lokaliteter i det sydvestlige Norge i perioden 29/4-24/6 2021 (Olsen 2022). Samme fugl sås desuden i Hauke-Haien-Koog i Tyskland i både august og september (Christopher König pr. mail). Fundet udgør cirka det 23. i Vestpalæarktis med fund i følgende lande: Cypern (1), Egypten (1), Finland (1), Frankrig (1), Holland (2), Israel (1), Kuwait (2), Norge (4), Sverige (3), Tyskland (1) (Tarsiger 2022) og Storbritannien (7) (Paul French pr. mail). Bemærk, at det samlede antal fund i ovennævnte lande er højere end det samlede antal fund i Vestpalæarktis, hvilket skyldes, at den samme fugl i enkelte tilfælde er set i flere lande. (Østasien; overvintrer Sydøstasien & Australien)

Sortvinget braksvale *Glaucopis trichotis* (2/2, 12/13, 1/1)

2021: 16/6, Bygholm Vejle (NJ), sdr., *Henrik Haaning Nielsen, Jens Frimer Andersen m.fl. (Foto).

Et typisk fund både hvad angår lokalitet og tidspunkt. Nordjylland er med seks fund den region med flest fund, hvoraf de fire er fra Vejlerne. Øvrige regioner med fund af arten er: RK (2), SJ (3), F (1) og S (3). Juni og maj er med hver fire fund de bedste måneder for arten. Månedsfordelingen af de danske fund: maj (4), juni (4), juli (2), august (2), september (2) og oktober (1). Af øvrige fund i Nord- og Mellemeuropa i 2021 var der følgende: Holland (1) (CDNA 2022), Norge (1) (Olsen 2022), Polen (1) (Komisja Faunistyczna 2022), Storbritannien (2) (Paul



Sortvinget braksvale, Bygholm Vejle, 16. juni 2021. Foto: Henrik Haaning Nielsen



Polarlomvie, Børstrup Hage, Gilleleje, 23. oktober 2021. Foto: Lars Andersen

French pr. mail) og Tyskland (2-4) (Christopher König pr. mail). (Sortehavsegnene & Centralasien; overvintrer sydlige Afrika)

Bonapartemåge *Chroicocephalus philadelphia* (0, 7/7, 1/1)

2021: 14-29/6, Skagen Havn, Sønderstrand og Grenen (NJ), 2K, *Anders Sydney Jensen m.fl. (Foto).

Ottende danske fund af denne art, hvoraf de seks har været fra Nordjylland. De to øvrige fund er fra hhv. Blåvand i 2012 (SU-rapport 2012) og Thorsminde i 2018 (SU-rapport 2018). Den månedlige fordeling af de danske fund er dermed som følger: juni (1), juli (1), august (2), oktober (1), november (2) og december (1). Eneste andre fund i Skandinavien i 2021 var fra Norge, hvor der sås fire fugle i juni/juli. Med årets fund foreligger der i alt 27 fund fra Norge (Olsen 2022). (Nordamerika)

Sandterne *Gelochelidon nilotica*

2021: 30/6, Bøtø Nor (LF), 3K+ sdr., Rene Christensen (Foto).

Til og med 2015 skulle fund af arten uden for vadehavsregionen forelægges Sjældenhedsudvalget, men fra og med 2016 behandler Sjældenhedsudvalget kun fund uden for Jylland. Seneste fund uden for Jylland var også fra Bøtø Nor i 2018 (SU-rapport 2018, SU-rapport 2019). (Europa; overvintrer Afrika)

Rosenterne *Sterna dougallii* (1/1, 3/3, 1/1)

2021: 26/6, Grenen, Skagen (NJ), 3K+ sdr., *Rolf Christensen m.fl. (Foto).

Fundet fra Skagen udgør landets femte fund. Et tidsmæssigt typisk fund, idet de tidligere fund alle er fra

juni/juli, således 3/7 2002 Agger Tange (NJ) og Thyborøn Havn (RK) (SU-rapport 2002), 21/6 2003 Nødebohuse Strand og Kikhavn (S) (SU-rapport 2003) samt 19/7 2013 Hanstholm Havn (NJ) (SU-rapport 2017). Dertil kommer ét ældre fund (uden dato) af en skudt fugl fra ca. 1900 i Lillebælt (VE) (SU-rapport 2020). Den engelske bestand af rosenterne var i 2021 på 150 par, hvilket er rekordhøjt. Alle engelske ynglepar er i én koloni på Coquet Island i Northumberland beliggende ca. 600 km stik vest for Blåvands Huk. Ud over den engelske koloni var der små 2.000 ynglepar i Irland i 2021. I 1989 var den samlede engelske og irske bestand på blot 467 ynglepar (Birdguides 2021). Bemærk, at opsummeringen er ændret i forhold til SU-rapport 2020, hvor der var der var en fejl (se rettelser sidst i indeværende rapport). (De Britiske Øer, Bretagne & Azorerne; overvintrer Atlanterhavet ud for tropisk Afrika)

Polarlomvie *Uria lomvia* (5/5, 10/10, 1/1)

2017: 22/10, Nordstrand, Skagen (NJ), vdr. trk., *Erik Christophersen, Karsten Klausen.

2019: 10/12, Hvide Sande Havn (RK), vdr., *Svend Erik Petersen, Jens Ballegaard, Peter Leth Olsen.

2021: 23/10, Børstrup Hage, Gilleleje (S), vdr. trk., *Lars Adler Krogh, Jimmy Skat Hansen (Foto). – 23/10, Udsholt Strand (S), vdr. trk., Michael Delpierre, Hans Meilstrup.

Fuglen fra Børstrup Hage er særdeles veldokumenteret med gode fotos, og samme fugl blev set senere ved Udsholt Strand, også på kort afstand. For ovennævnte tre godkendte fund er der tale om veldokumenterede fugle, der er set på kort afstand, og hvor observatorerne har set karakterer, der er uden for variation hos de øvrige alkefuglearter. I oktober og november 2021

oplevede både den danske og svenske Kattegatkyst et relativt stort antal meldinger om polarlomvier. Langt de fleste indsendte sager er uden fotodokumentation og pga. sværhedsgraden i korrekt bestemmelse af arten, er mange af de danske fund fortsat under behandling, da kriterier for godkendelse af fund forsøges fastlagt i koordination med det svenske sjældenhedsudvalg, da en tilsvarende stor forekomst også rapporteredes i Sverige. Med de tre nye danske fund er månedsfordelingen: januar (4), februar (1), marts (1), oktober (3), november (2) og december (4). Den regionale fordeling er: NJ (5), RK (2), F (1) og S (7). Dertil kommer et udateret fund fra en ukendt lokalitet i 1911 (Christensen & Rasmussen 2015). (Arktiske egne, herunder Grønland, Island & det nordlige Norge; overvintrer nordlige Atlanterhav ned til det centrale Norge)

Sortbrynet albatros *Thalassarche melanophrys* (0, 4/4, 1/1)

2021: 17/4, Grenen, Skagen (NJ), 5K+ trk., *Alex Sand Frich, Rolf Christensen. – 22/4, Gilleleje Flak og Tragten (S), 5K+, *Christian Glahder, Jens Lind, Jesper Hornskov (Foto). – 25-26/4, Saltholm og Øresund (S), 5K+, Tomas Svensson, Anders Laurin m.fl. (Foto).

Årets fund af sortbrynet albatros er første siden 2017, hvor en adult-lignende fugl turnerede både danske og svenske kyster i flere dage i oktober. Det samme gjorde sig gældende ved årets fugl, der først blev set 17/4 ved Grenen, 21/4 ved Hönö i Sverige, 22/4 ved Gilleleje og til sidst 25-26/4 i Øresund omkring Saltholm og øst mod Malmö i Sverige (Artportalen 2022). Fuglens optræden i Øresund sluttede med, at den blev jaget af havørne (*Haliaeetus albicilla*) omkring Saltholm, hvor den til sidst forsvandt. Årets fund godkendes som Danmarks femte fund af sortbrynet albatros, da fotos af fuglen taget ved Malmö viser, at næbbet ikke var helt udfarvet. Således drejer årets fugl sig om et andet individ end den adulte fugl, der har turneret i Nordsøen, siden den sås første gang i Skagen i maj 2014 (SU-rapport 2014), og som har opholdt sig i sulekolonier på Helgoland og på den engelske Nordsøkyst. (Sydlige Atlanterhav)

Lille stormsvale *Hydrobates pelagicus*

2021: 23/10, Korshage, Rørvig (S), trk., *Christian Gade, Jørgen Bech, Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl.

Fund uden for den jyske vestkyst, fra og med 1/1 2007, skal behandles af Sjældenhedsudvalget. (Atlanterhavet)

Atlantisk skråpe / scopolis skråpe *Calonectris borealis* / *Calonectris diomedea* (0, 60/61, 5/5)

2021: 13/6, Børstrup Hage, Gilleleje (S), trk., *Jakob Engelhard, Michael Køie Poulsen (Foto). – 15/6, Grenen, Skagen (NJ), rst., derefter trk., *Jan Hjort Christensen, Erik Christophersen m.fl. (Foto). – 18/7, Skagens Rev, Skagen (NJ), *Per Gustavsson (Foto). – 23/9, Kikhavn Hundested (S), trk., *Michael Trasborg, Søren Haaning Nielsen. – 16/10, Fyns Hoved (F), *Leif Bisschop-Larsen (Foto).

Fem fund af denne sydlige skråpe er det højeste antal

i nyere tid. Det årlige antal fund siden 2015 har været 2015 (0), 2016 (1), 2017 (2), 2018 (2), 2019 (1) og 2020 (3). Fuglen fra Børstrup Hage 13/6 kunne være identisk med en fugl, der sås ved Hovs Hallar i Skåne (Artsportalen 2022) dagen før, men ellers er der ingen umiddelbar sammenhæng mellem de danske og svenske fund i 2021. Sverige havde i øvrigt også fem fund af atlantisk/scopolis skråpe i 2021 med flest fund i august (Artsportalen 2022). Fundet fra Børstrup Hage 13/6 og Skagen 16/6 falder uden for normalen og er kun tredje og fjerde danske fund i juni. De resterende af årets danske fund falder alle tidsmæssigt inden for normalen fra med august til oktober som bedste periode for arten. Scopolis skråpe er fortsat en ekstrem sjældenhed i det nordvestlige Europa. Der er således kun tre fund fra Storbritannien, hvoraf to er fotograferet ud for Scilly, England; én 2/8 2004 (Fisher & Flood 2010) og én 11/7 2019 (Flood & Fisher 2020), og ét er fra den britiske østkyst 9/7-15/8 2020 (Paul French pr. mail). Endvidere er der registreringer for Centraleuropa fra Østrig, Polen og Schweiz (Flood & Fisher 2020) og derudover et fund fra Færøerne 9/8 1877, hvilket i øjeblikket repræsenterer den nordligste fund i Europa og muligvis Atlanterhavet (Olsen et al. 2020). (Midtatlanten & Middelhavet; overvintrer Middelhavet, Syd- & Midtatlanten)

Storskråpe *Ardenna gravis* (1/1, 8/8, 1/1)

2021: 15/5, Blåvands Huk (RB), trk., *Henrik Böhmer, Martin Søgaard Nielsen. – 15/5, Søndervig, Holmsland Klit (RK), trk., Erik Enevoldsen, Svend Erik Petersen.

De to fund gælder samme individ, der først sås trækkende mod nord ved Blåvands Huk kl. 6.10 og derefter ved Søndervig kl. 7.45, hvor den ligeledes trak mod nord. Hermed Danmarks tiende fund af storskråpe og første siden 2010, hvor en fugl 25/8 kunne følges langs den nordsjællandske kyst fra Gilleleje til Liseleje (SU-rapport 2010). Årets fund er fænologisk meget afvigende, da arten er meget sjælden i Nord- og Vest-europa om foråret. Månedsfordelingen af de danske fund er dermed januar (3), maj (1), august (2), september (3) og oktober (1). I Europa ses storskråpe typisk august til oktober, mens arten på den nordlige halvkugle i maj næsten udelukkende ses langs den nordamerikanske østkyst. Bemærk, at opsummeringen er ændret i forlængelse en genbehandling af alle fund af storskråpe (Ortvad et al. 2015). (Øer i det sydlige Atlanterhav; overvintrer nordvestlige Atlanterhav)

Balearskråpe *Puffinus mauretanicus* (1/1, 91/96, 3/3)

2021: 13/8, Vejers Strand (RB), trk., *Henrik Böhmer. – 14/8, Ørhage (NJ), trk., *Henrik Haaning Nielsen, Henrik Læssøe. – 14/8, Vangså Strand (NJ), trk., *Klaus Malling Olsen. – 16/9, Vejers Strand (RB), trk., *Henrik Böhmer.

Fundene ved Ørhage og Vangså Strand regnes som samme individ. Fuglen blev først set trækkende mod syd ved Ørhage kl. 08.27 og senere ved Vangså Strand kl. 17.30. Med hele tre fund er årets total den største siden 2015, hvor der blev set fire forskellige fugle. Årets fund følger det generelle forekomstmønster, hvor

arten primært observeres mellem ultimo juli og primo oktober, og lokaliteterne er ligeledes klassiske for arten. (Middelhavet; overvintrer Middelhavet & Biscayen)

Nathejre *Nycticorax nycticorax* (3/3, 31/32, 1/1)

2021: 13/4, Middelfart (F), trk., Michael Brunhøj Hansen (Lyd).

Første fund af arten siden 2019 omhandler en overflyvende fugl fra Middelfart, der blev registreret i forbindelse med natoptagelser (Nocmig). Fuglen kaldte en enkelt gang, men optagelsen var karakteristisk nok til, at fundet kunne godkendes som Danmarks 35. fund af nathejre. Fundet er relativt tidligt i forhold til artens forekomstmønster (ultimo april til primo juni), men der foreligger både to fund i januar og ét fund i marts. (Europa; overvintrer Afrika)

Kohejre *Bubulcus ibis* (4/4, 22/25, 4/4)

2021: 1-5/1, Stubbe Enge øst for Stubbe Sø og Ree Park (ÅH), Steen Kjærlund Hansen m.fl. (Foto). – 15/4, Torup Holme, Vejlerne (NJ), sdr., *Rune Sø Neergaard, Anders Vadstrup, Henrik Haaning Nielsen (Foto). – 21-22/5, Lille Vildmose (NJ), sdr., Flemming Hvarregaard Pedersen (Foto). – 19-21/10, Tuse Enghave og Mårsø Enge (S), *Jonas Morsing Thomasen m.fl. (Foto). – 10/11, Ramsømagle Sø, Roskilde (S), Anders Wiig Nielsen, Jan Svejsgaard Jensen m.fl. (Foto). – 10-19/11, Rakkeby, Mors (NJ), *Vagn Riis-Jensen, Jens Kristian Kjærgård, Kristian Tikjøb Olsen m.fl. (Foto). – 21/11-2/12, Grænge (LF), *Stig Hansen, Knud Flensted, Rene Christensen m.fl. (Foto).



Purpurhejre, Albæk Fælled, Skjern Enge, 5. juni 2021. Foto: Bo L. Christiansen

Med fire fund i 2019, tre fund i 2020 og fire fund i 2021 har kohejren de senere år for alvor gjort sit indtog i Danmark, og dermed er ti af de 30 danske fund gjort på bare tre år. Fuglen fra Stubbe Sø blev fundet sidst i oktober 2020 (SU-rapport 2020). Fuglen fra Tuse Enghave, Ramsømagle og Grænge anses for samme individ pga. observationsperioderne og ingen tegn på forskelle i dragten ud fra den dokumentation, der foreligger. Årets fund passer fint med artens forekomstmønster, hvor april-maj og oktober-november er bedste perioder for arten. (Sydeuropa, Mellemøsten & Nordafrika)

Purpurhejre *Ardea purpurea* (6/6, 17/17, 1/1)

2021: 5-6/6, Albæk Fælled, Skjern Enge (RK), 3K+ rst., derefter trk., *Erik Enevoldsen m.fl. (Foto).

Første fund af arten siden 2017. Det er første flerdagesfugl siden fuglen, der rastede i Gammel



Kohejre, Rakkeby, Mors, 19. november 2021. Foto: Tonny Ravn Kristiansen



Høgeørn, Skagen, 20. april 2021. Foto: Knud Pedersen

Frederikskog (SJ) 13-15/10 2004 (SU-rapport 2004). På trods af en ynglende bestand og større forekomster så tæt på som Holland - bl.a. 405 trækkende fugle på én lokalitet 31/8 2020 (Waarneming 2022) - er arten fortsat meget fåtallig i Norden. I 2021 var der ét fund i hhv. Norge (oktober) (Olsen 2022) og Sverige (maj) (Artportalen 2022). (Europa; overvintrer Afrika)

Blå glente *Elanus caeruleus* (0, 23/23, 1/1)

2021: 28/3, Tontoft Nakke, Als (SJ), rst., derefter trk., *Dennis Langholz (Foto).

Efter fire og fem fund i hhv. 2019 og 2020 blev der blot gjort et enkelt fund i 2021. I Sverige er der i alt ni fund, hvoraf det seneste er fra 2020 (BirdLife Sverige 2022). Holland havde hele 18 fund i 2021, ud af i alt 74 fund. Arten udgår fra 2022 fra den hollandske SU-liste (Vincent van der Spek pr. mail). Arten er fortsat ikke truffet i Norge (Tor A. Olsen pr. mail). Fundet fra Als (SJ) er kun det andet fund i marts, hvilket giver en månedlig fordeling af de i alt 24 danske fund, som ser således ud: marts (2), april (11), maj (3), juni (2), juli (2), august (2) og september (2). (Sydvestlige Frankrig, Iberiske Halvø & Nordvestafrika)

Gåsegrib *Gyps fulvus* (1/1, 10/43, 1/1)

2021: 5-6/5, Hulsig Hede og Skagen (NJ), 2K trk.fors., *Peter Hedegaard Kristensen m.fl. (Foto). – 8/6, Fakkebjerg, Langeland (F), 2K trk.fors., *Philip Bo Stobbe (Foto). – 12/6-22/7, Nordby Bakker, Samsø (ÅH), 2K, *Kristian Kreiner, Mogens Wedel-Heinen m.fl. (Foto).

De tre observationer fra 2021 regnes som samme individ, der kunne identificeres ud fra slitage i fjerdragten. Mest bemærkelsesværdigt for dette fund var fuglens

over fem uger lange ophold på Samsø (ÅH), hvor den observeredes dagligt og ofte på kort afstand. (Iberiske Halvø, Sydfrankrig & Balkan)

Stor skrigeørn *Clanga clanga* (4/4, 91/91, 2/2)

2021: 12/6, Ny Borre, Høvblege og Sømarke, Østmøn (M), 2K, *Mikkel Willemoes, Sissel Sjøberg, Niels Bahl Andersen (Foto). – 14/6, Denderup Sø, Haslev (S), 2K, *Jens Eriksen (Foto). – 20/9, Stevns Fyr, Højerup (S), 3K+ trk., Jan Svejgaard Jensen m.fl. (Foto).

Fundene fra hhv. Østmøn og Denderup Sø regnes som samme individ. Det drejer sig om det blot fjerde fund i juni. Langt størstedelen af de danske fund er gjort i april-maj og september-oktober. (Rusland, Ukraine, Belarus, østlige Polen & Baltikum; overvintrer Sydøsteuropa, Mellemøsten, Indien & Nordøstafrika)

Kejserørn *Aquila heliaca* (0, 20/20, 1/1)

2021: 16-17/6, Skagen, Hulsig Hede og Råbjerg (NJ), 3K trk.fors., *Henrik Thorhauge Rask, Lars Paaby m.fl. (Foto).

Fundet fra 2021 er det ottende fra Skagen og det tredje danske fund siden 2008. Det falder inden for den typiske forekomstperiode med flest fund i henholdsvis maj og juni. Den månedlige fordeling af de i alt 21 danske fund, er som følger: februar (1), april (2), maj (5), juni (6), juli (1), august (2), oktober (3) og december (1). (Sydøsteuropa & Sydlige Rusland; overvintrer Sydeuropa, Mellemøsten & Østafrika)

Høgeørn *Aquila fasciata* (0, 7/7, 0)

For andet år i træk besøgte de samme to immature høgeørne Danmark i 2021. Det drejer sig om GPS-mærkede individer, der blev mærket som unger i Sydfrankrig i 2019 (Aigle de Bonelli 2021). Af hensyn til overskueligheden er nedenstående fund fordelt på de respektive individer, som i det franske projekt kaldes:

"3C":

2021: 14/2, Lovrup Skov (SJ), 3K, satellitdata via Aigle de Bonelli (GPS). – 10/5, Jerup (NJ), 3K, satellitdata via Aigle de Bonelli (GPS). – 10/5, Skagen Klitplantage og Hulsig Hede (NJ), 3K, Knud Pedersen m.fl. – 4/6, Klitmøller og Nystrup Klitplantage (NJ), 3K, satellitdata via Aigle de Bonelli (GPS). – 5/6, Tversted og Tversted Plantage (NJ), 3K, satellitdata via Aigle de Bonelli (GPS). – 5/6, Råbjerg Mile (NJ), 3K, satellitdata via Aigle de Bonelli (GPS). – 5-6/6, Skagen, Hulsig Hede og Råbjerg Hede (NJ), 3K trk.fors., *Ole Zoltan Göller, *Sebastian Klein m.fl. (Foto & GPS).

"26":

2021: 20/4, Skagen (NJ), 3K trk.fors., *Knud Pedersen, Andreas Egelund Christensen m.fl. (Foto & GPS). – 20-21/4, Skagen Klitplantage (NJ), 3K, satellitdata via Aigle de Bonelli (GPS). – 21/4, Ålbæk Klitplantage (NJ) og Jerup (NJ), 3K, satellitdata via Aigle de Bonelli (GPS). – 21/4, Dronninglund Storskov (NJ), 3K, satellitdata via Aigle de Bonelli (GPS). – 21-22/4, Melholt Rimmer, Gerå (NJ), 3K, satellitdata via Aigle de Bonelli (GPS). – 22/4, Lille Vildmose (NJ), 3K, satellitdata via Aigle de Bonelli (GPS). – 22/4, Randers (ÅH), 3K, satellitdata via Aigle de

Bonelli (GPS). – 22/4, Horsens (VE), 3K, satellitdata via Aigle de Bonelli (GPS). – 22-23/4, Rohden og Rohden Ådal (VE), 3K, satellitdata via Aigle de Bonelli (GPS).

Oplysninger fra det franske projekt dokumenterer, at "3C" har opholdt sig i Danmark efter fundet 19/10 2020 ved Vejerslev på Mors (NJ) (SU-rapport 2020), men på grund af mangel på tilstrækkeligt med sollys til at genoplade batterierne på GPS-senderen i perioden 19/10 2020-27/2 2021 foreligger kun få konkrete koordinater og derfor er en del af forekomsten af "3C" stadig ukendt. Ikke desto mindre vurderer Aigle de Bonelli (2021), at "3C" siden oktober 2020 har opholdt sig i Vestjylland, hvor den overvintrede frem til februar 2021 og dermed repræsenterer den nordligste dokumenterede overvintring i Europa nogensinde. 26/2 krydsede "3C" grænsen mod syd og 15 dage senere var den ankommet til det sydvestlige Frankrig (Aigle de Bonelli 2021). Ikke desto mindre kunne de franske forskere meddele, at "3C" vendte tilbage til Danmark, idet de modtog signal 10/5 fra Jerup (NJ) syd for Skagen. Det vides ikke, hvornår "3C" ankom til landet, men det har muligvis været samme dag eller dagen før. Efter fundet ved Jerup (NJ) og trækforsøg i Skagen (NJ) samme dag fløj "3C" ned til et område ved Haderup lidt nord for Herning, hvor den også havde opholdt sig i 2020 (Hansen & Ilsøe 2021), men der er ikke adgang til de konkrete koordinater og datoer. I starten af juni kom nye koordinater på "3C" fra Thy (NJ), som var et område den også havde besøgt i 2020 (Hansen & Ilsøe 2021). Endelig blev den set foretage trækforsøg i Skagen (NJ) 5-6/6 for en sidste gang at krydse grænsen mod syd 15/6. Seneste information er at "3C" er fundet død tæt på Perpignan nær dens fødested i Frankrig (Aigle de Bonelli 2021).

Oplysninger fra det franske projekt dokumenterer, at "26" foretog et besøg i Danmark med tre overnatninger i april. Først gjorde den trækforsøg i 20/4 Skagen (NJ), hvor det i øvrigt lykkedes ud fra billeder at aflæse bogstavkoden på farveringen, hvilket bekræftede, at der var tale om "26". Om aftenen overnattede den i Skagen Klitplantage, mens den dagen efter overnattede ved Melholt Rimmer nord for Limfjorden og for til sidste at overnatte ved Rohden Ådal nord for Vejle Fjord inden den 23/4 krydsede grænsen ud af landet. (Sydeuropa, Nordafrika & Mellemøsten)

Ørnevåge *Buteo rufinus* (1/1, 22/22, 1/1)

2021: 16/9, Rudbøl Kog (SJ), 2K, *Emil Frederiksen (Foto).

Fundet fra 2021 er blot det andet fund fra september. Den månedlige fordeling af de i alt 24 danske fund er som følger: april (1), maj (3), juni (6), juli (3), august (7), september (2), oktober (1) og december (1). (Sydøsteuropa, Mellemøsten & Centralasien; overvintrer nordlige del af Afrika, Mellemøsten & Indien)

Musvåge *Buteo buteo*

Med karakterer svarende til steppevåge, ssp. *vulpinus* (0, 1/1, 0)

Tre fund: 10/9 1912, død fundet i Helsingør, Nordsjælland (S) (Christensen & Rasmussen 2015), 7+10/6 1996, 3K+ rød type trækforsøgende i Skagen (NJ) (SU-rapport 1995-1996) og 19/4 2004, 3K+ trækkende i Skagen (NJ)

(SU-rapport 2004) anerkendes efter genbehandling ikke længere. Eneste fund, der endnu er under genbehandling, men henstår Sjældenhedsudvalgets beslutning er: 1-10/6 1972, 3K+ trækforsøgende i Skagen (NJ) (SU-rapport 1972). (Nordøstlige Skandinavien, Baltikum & Rusland; overvintrer Afrika)

Mellemflagspætte *Dendrocytes medius* (ynglefugl, uddød 1959 med enkelte fund til og med 1963, herefter 19/19, 1/1)

2021: 1/1-24/2, Rindum (RK), Finn Bro m.fl. (Foto). – 7/2-8/5, Draved Skov (SJ), *Leif Schack-Nielsen, Jytte Fuglsang Nissen, Svend Anker Schwebs (Foto). – 9/3, Kollund Skov (SJ), *Jørn Vinther Sørensen (Foto). – 12/4, Kogsbøl Mose (SJ), *Ralph Quinten (Foto). – 17-31/12, Gråsten (SJ), han, *Hanne Eriksen, *Jens Eriksen (Foto). – 29-31/12, Draved Skov (SJ), *Thomas W. Johansen, Tim Andersen, Frederik Rejsby Johansen (Foto).

Fundene fra Rindum (RK), Kollund Skov (SJ), Gråsten (SJ) og Draved Skov (SJ) regnes som gengangere fra tidligere år. Bortset fra et fund 7/4 2015 ved Søby, Ærø (F) (SU-rapport 2015) er alle fund siden 2011 gjort i den sydlige halvdel af Jylland. (Syd- & Mellem Europa)

Jagtfalk *Falco rusticolus* (40/40, 134/135, 1/1)

2021: 26/11-11/12, Bygholm Vejle og Holmkær (NJ), 1K, *Henrik Læssøe, Henrik Haaning Nielsen, Kristian Tikjøb Olsen m.fl. (Foto).

Årets fund udgør det syvende i Vejlerne. Et ret typisk fund både hvad angår tid og sted. Arten har været årlig siden 2003. De største år er hhv. 2012 (10) og 2015 (13). (Nordskandinavien & Rusland)

Rødhovedet tornskade *Lanius senator* (2/2, 47/47, 1/1)

2021: 5/6, Gåsekær, Ål Plantage, Oksbøl (RB), han, *Erik Overlund, Ib Jensen, Bent Jakobsen m.fl. (Foto).

Arten er knapt årlig i Danmark med primær forekomst i maj og juni og ses hyppigst i landets vestlige egne. Derfor ligger dette fund fint inden for det generelle forekomstmønster. Således står Blåvand-området for 11 ud af de 50 danske fund. Bemærk, at opsummeringen er ændret i forhold til SU-rapport 2019, hvor der var en fejl, der har været gentaget gennem flere rapporter (se rettelser sidst i indeværende rapport). (Sydeuropa; overvintrer Afrika)

Korttået lærke *Calandrella brachydactyla* (0, 55/56, 3/3)

2021: 28/5, Hesselø (S), *Søren Haaning Nielsen, *Sebastian Klein (Foto). – 29/5, Christiansø (B), *Henrik Böhmer, *Rasmus Tranberg, *Poul Ulrik m.fl. (Foto). – 9-28/6, Fanø Nordveststrand (RB), *Per Kjær, Tim Hesselballe Hansen, Sigrid Kistrup Ilsøe (Foto).

Korttået lærke er næsten årlig i Danmark, men de bedste år er tilbage i 1996 (fire fund) og 2000 (seks fund). Årstotalerne fra de senere år er 2018 (2), 2019 (2) og 2020 (3). De fleste danske fund er fra maj og juni, og derfor ligger årets fund også inden for det generelle forekomstmønster for arten. Fuglen på Hesselø er det første fund fra øen, og fuglen på Christiansø er det



Korttået lærke, Hesselø, 28. maj 2021. Foto: Søren Haaning Nielsen

niende fund for Ertholmene. Fanø tegner sig nu for syv fund. (Sydeuropa, Nordafrika, Lilleasien & Centralasien; overvintrer Afrika & sydlige Asien)

Rødrygget svale *Cecropis daurica*

Med karakterer svarende til rødrygget svale, ssp. *daurica/japonica* (0, 0, 1/1)

2021: 2/6, Grenen, Skagen (NJ), *Claus Brostrøm Nielsen, Simon Sigaard Christiansen m.fl. (Foto & Lyd).

Første fund af rødrygget svale ssp. *daurica/japonica* i Danmark. Læs mere om fundet andetsteds i Fugleåret (Nielsen & Christiansen 2022). Underarten ssp. *daurica* (rødrygget svale) yngler i Mongoliet og det nordlige Kina, mens ssp. *japonica* (centralasiatisk svale) yngler i det østlige Kina og Japan. Bemærk, at rødrygget svale er polytypisk og den underart, der normalt forekommer i Danmark, er rødnavet svale ssp. *rufula*. De to asiatiske underarter er svært adskillelige uden DNA/biometri og derfor er det danske fund godkendt som ssp. *daurica/japonica*. Rødrygget svale ssp. *daurica/japonica* forekommer meget sjældent i Europa, og de nordeuropæiske fund fordeler sig således: Norge (6) (Tor A. Olsen pr. mail), Sverige (2) (Niklas Andersson pr. mail), Finland (3) (Roni Väisänen pr. mail) og Storbritannien (2) (Paul French pr. mail). Der er hverken fund fra Tyskland, Polen eller Holland. Det danske fund falder tidsmæssigt inden for mønsteret for de øvrige nordeuropæiske fund med maj til juni som den bedste periode. Fuglen i Skagen rastede ved parkeringspladsen ved Grenen Kunstmuseum og kunne i perioder ses på meget tæt hold. (ssp. *daurica/japonica*: Central- & Østasien; overvintrer Syd- & Sydøstasien)

Bjergløvsanger *Phylloscopus bonelli* (0, 8/8, 1/1)

2021: 3/6, Grenen, Skagen (NJ), han, syng., derefter ringm., *Sebastian Klein, Jonas Pedersen, Simon Sigaard Christiansen m.fl. (Foto, Lyd & DNA).

Hermed andet fund i Skagen; det første fund omhandler en ringmærket fugl, 31/5 2005 (SU-rapport



Bjergløvsanger, Grenen, Skagen, 3. juni 2021. Foto: Jørgen Kabel

2008). Fuglen i 2021 blev opdaget på sangen og blev artsbestemt på kaldet, som var blevet opfanget på en videooptagelse. Fuglen befandt sig ganske tæt ved Skagen Fuglestations ringmærkningsnet, som blev åbnet for at indfange fuglen. Kort efter netåbning havde fuglen fået ring om benet. Dens biometri indikerer bjergløvsanger på grund af en forholdsvis rund vinge ($P2 = P6/7$), men karakteren er ikke tilstrækkelig til en artsbestemmelse, og vingelængden (65 mm) overlapper med balkanløvsanger (*P. orientalis*) (Svensson 1992). En analyse af spektrogrammer lavet ud fra optagelser af fuglens sang og kald viste, at der i henhold til Groenendijk & Luijendijk (2011) og Boesman (2016) var tale om en helt igennem typisk bjergløvsanger. Derudover er artsbestemmelsen blevet bekræftet ud fra en DNA-analyse baseret på en fjer, som blev indsamlet i forbindelse med ringmærkningen (J. Martin Collinson pr. mail). (Sydvest- & Mellemeuropa; overvintrer tropisk Afrika)

Himalayasangser *Phylloscopus humei* (0, 33/33, 2/2)

2021: 31/10, Harboøre Tange (RK), *Stephan Skaarup Båsen Lund m.fl. (Foto). – 13-18/11, Christiansø (B), ringm., *Anton Herrig Liebermann, Vicky Knudsen m.fl. (Foto & Lyd).

Begge fugle blev artsbestemt på både dragtkendetegn og kald. Fuglen på Christiansø er den næstseneeste forekomst på Ertholmene; den seneste forekomst er også landets seneste, 24/11-3/12 2003 (SU-rapport 2003, rettelser sidst i indeværende rapport). Fundet på Harboøre Tange er det første fund i region Ringkøbing. Den geografiske fordeling er: NJ (3), RK (1), RB (10), S (5), LF (1), M (1), B (14). (Centralasien; overvintrer Nepal & Indien)

Schwarz' løvsanger *Phylloscopus schwarzi* (0, 30/30, 1/1)

2021: 18/10, Blåvands Huk (RB), *Sebastian Thorup Hansen, *Jonas Pedersen, Joshua Emil Haahr (Foto & Lyd).



Schwarz' løvsanger, Blåvands Huk, 18. oktober 2021. Foto: Sakari Kauppinen

Hermed det syvende fund i Blåvand-området og den tredje fugl fundet i felten hér; de øvrige fire fund blev fanget ifm. ringmærkning ved Blåvand Fuglestation. (Sydøstlige Sibirien; overvintrer Sydøstasien)

Brun løvsanger *Phylloscopus fuscatus* (0, 84/84, 4/4)

2021: 31/10-6/11, Mandø (RB), *Thomas W. Johansen m.fl. (Foto & Lyd). – 2/11, Bygholm Vejle (NJ), *Henrik Haaning Nielsen (Foto). – 11/11, Christiansø (B), ringm., *Kim Liljehult, Anton Herrig Liebermann, Sune Jepsen (Foto). – 15-16/11, Nordstrand, Skagen (NJ), *Anders Odd Wulff Nielsen, Erik Christophersen, Simon Sigaard Christiansen m.fl. (Foto & Lyd).

Med fire fund blev totalen en tredjedel af rekorden i 2020 (tolv fund) (SU-rapport 2020). Fuglene optrådte væsentligt senere end normalt – middeldato er 20/10 t.o.m. 2019 (Christensen *et al.* 2022). (Østlige Asien; overvintrer sydøstasien)

Grøn sanger *Phylloscopus nitidus* (0, 2/2, 1/1)

2021: 7/9, Ellekrattet, Skagen (NJ), han, syng., *Alex Sand Frich m.fl. (Foto & Lyd).

Hermed Danmarks tredje fund og det første fra efteråret. Fundet følger blot året efter det seneste fund, og højst overraskende blev fuglen fundet på præcis samme lokalitet hvor en fugl sang, 27/5 2020 (SU-rapport 2020). Den blev opdaget på kaldet og kunne tillige høres sub-syngende. Fuglen blev artsbestemt til lundsanger (*P. trochiloides*) i felten, men da observatøren gennemgik sin lydoptagelse en måned senere faldt artsbestemmelsen på plads, idet dens kald og sang samlet set udelukker både lundsanger og østlig lundsanger (*P. plumbeitarsus*) (Slaterus 2019). Fuglens

dragtkarakterer er i øvrigt i fuld overensstemmelse med grøn sanger. I lighed med det danske fund i 2020, var fundet i 2021 en del af et influx til Vesteuropa, af i alt fire individer i det tidlige efterår: Norge havde hele to fund, 28/8, 2K+ ringm., Sula, Trøndelag og 4-14/9, 2K+ ringm., Værøy, Nordland (Olsen 2022), mens Storbritannien havde sit tiende fund, 9/9, 2K+ ringm., Buckton, Yorkshire (Thomas 2021). Det er bemærkelsesværdigt, at de tre ringmærkede individer i 2021 omhandlede adulte fugle. Det har ikke været muligt at fastslå alderen på fuglen i Ellekrattet i 2021. De senere års stigning i forekomsten i Nord- og Vesteuropa er formentligt reel og ikke blot udtryk for øget kendskab til artens feltkendetegn og stemme, da flere af fuglene er truffet ifm. ringmærkning. Fundet vidner om, at arten kan forventes både om foråret og om efteråret; begge de to hidtidige danske fund er fra 27/5. Ligesom for de øvrige sjældne arter i slægten *Phylloscopus*, kan en stemmeoptagelse således få stor betydning for artsbestemmelsen. (Tyrkiet til Iran; overvintrer Indien & Sydøstasien)

Nordsanger *Phylloscopus borealis* (0, 7/7, 1/1)

2021: 28/7, Blåvands Huk (NJ), 2K+ ringm., *Jonas Pedersen, *Samuel Perfect m.fl. (Foto).

Hermed det tredje fund i Blåvand-området og det andet fund truffet ifm. ringmærkning ved Blåvand Fuglestation. Både årstiden og fuglens alder er usædvanlig i nordvesteuropæisk sammenhæng, hvor forekomsten i andet halvår domineres af ungfugle i september. I nyere tid er der således blot to andre juli-fund i den sydlige del af Skandinavien: 31/7-1/8 1995, 2K+ ringm., Ottenby, Øland, Sverige og 6/7 1992, Utsira, Sydvestnorge (Nielsen 2021). Funddatoen ligger dog tæt på den eneste anden danske forekomst af en adult

fugl, omhandlende en ringmærket fugl ved Blåvand Fuglestation, 11-12/8 2008 (SU-rapport 2008, SU-rapport 2009). De øvrige danske fund ligger alle i perioden 22/8-28/9. Nordsanger er for nyligt blevet opdelt i tre monotypiske arter: japansk løvsanger (*P. xanthodryas*), kamchatka løvsanger (*P. examinandus*) og nordsanger (*P. borealis*) (Gill et al. 2022). Ganske overraskende er der et nyligt fund af en syngende kamchatka løvsanger i Enontekiö i det nordligste Finland, 18/7 2021; første fund i Vestpalæarktis (Lehikoinen & Viles 2021). Arten yngler i Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne (østlige Rusland) og Hokkaido (nordlige Japan) og overvintrer på Filippinerne og Indonesien. Feltbestemmelse af kamchatka løvsanger på basis af udseende er formentlig ikke mulig; arten ligner meget nordsanger, men er lidt større, og hvad dragten angår, er den klar grøn og gul, mens nordsanger typisk er mere blegt farvet. Til gengæld er både kald og sang diagnostisk (Alström et al. 2011). Hvad angår årets fund af nordsanger i Blåvand var dragten typisk for arten, og vingemålet på 63,5 mm er så vidt vides uden for variationen hos kamchatka løvsanger (Round et al. 2016). Stemmen blev ikke hørt. (Nordskandinavien & Sibirien; overvintrer Filippinerne, Sydøstasien & Indonesien)

Buskrørsanger *Acrocephalus dumetorum* (0, 101/102, 10/10)

2021: 21/5, Grenen, Skagen (NJ), ringm., *Rasmus Mathiesen-Juhl, *Laima Bagdonaite, *Mikkel Friberg Mortensen m.fl. (Foto). – 28/5, Gedser Odde (LF), ringm., *Hans Lind, *Vagn Lind (Foto & DNA). – 1/6, Christiansø (B), ringm., *Alexandra Rose Buxton, Anton Herrig Liebermann (Foto). – 2/6, Christiansø (B), ringm., *Anton Herrig Liebermann, Alexandra Rose Buxton m.fl. (Foto). – 5/6, Reservatet, Skagen (NJ), han, syng., *Henrik Böhmer, David Manstrup, Nicole Natascha Böhmer m.fl. (Lyd). – 7/6, Christiansø (B), ringm., *Anton Herrig Liebermann, Alexandra Rose Buxton m.fl. (Foto). – 8-17/6, Broksø, Fensmark (S), han, syng., *John Faldborg, Torben Sebro m.fl. (Foto & Lyd). – 9-14/6, Smøringe, Åkirkeby (B), han, syng., *Hanne Tøttrup, Sune Riis Sørensen m.fl. (Lyd). – 23/6-11/7, Kalvebod Fælled, Amager (S), han, syng., *Stig Kjærgaard Rasmussen m.fl. (Foto & Lyd). – 4-15/7, Næbskoven, Præstø (S), han, syng., *Gert Rønne, John Faldborg m.fl. (Lyd).

Årets ti fund udgør den tredje-højeste årstotal, efter 28 fund i 2020 og 15 fund i 2014. Fundet fra Næbskoven, Præstø er det fjerde danske fund i juli måned. Buskrørsanger udgår af SU-listen pr. 1/1 2022. (Finland, Baltikum, Belarus & Rusland; overvintrer Indien & Burma)

Stribet græshoppesanger *Locustella lanceolata* (3/3, 3/3, 1/1)

2021: 14/9, Christiansø (B), 1K ringm., *Anton Herrig Liebermann, Mikkel Lausten m.fl. (Foto).

Hermed det andet fund på Christiansø, som i lighed med det første blev truffet i forbindelse med ringmærkning; første fund på Christiansø var en 1K fra 2/10 2004. Der er tale om det første danske fund i september idet de øvrige fund er fra perioden 2-17/10, heraf hele fem



Nordsanger, Blåvands Huk, 28. juli 2021. Foto: David Manstrup



Buskrørsanger, Christiansø, 1. juni 2021. Foto: Anton Herrig Liebermann



Stribet græshoppesanger, Christiansø, 14. september 2021. Foto: Anton Herrig Liebermann

fund i perioden 2-7/10. Den tidligste efterårsforekomst i Sverige er 5/9 2008 1K ringm. Bingsmarken, Skåne (Bird-life Sverige 2022). Den europæiske yngleforekomst tæller ca. 30.000-60.000 par, og arten har ekspanderet mod vest i nyere tid (Christensen et al. 2022). Denne relativt tidlige forekomst kunne tyde på, at fuglen stammer fra den vestlige del af yngleudbredelsen. Der var ingen fund i det i øvrige Skandinavien i 2021. (Syd- & Centralsibirien til Nordøstkina & nordlige Japan; overvintrer nordøstlige Indien & Sydøstasien)



Iberisk sanger, Christiansø, 19. maj 2021. Foto: Anton Herrig Liebermann



Rødstrubet sanger, Nørre Rubjerg, Lønstrup, 13. maj 2021. Foto: Jan Lindgaard Rasmussen

Iberisk sanger *Curruca iberiae* (0, 5/5, 1/1)

2021: 19/5, Christiansø (B), han, *Anton Herrig Liebermann, *Alexandra Rose Buxton m.fl. (Foto & Lyd).

Første fund af arten på Ertholmene. Feltbestemmelse af iberisk sanger og rødstrubet sanger er stadig en stor udfordring - se resultatet af Sjældenhedsudvalget genbehandling af de danske fund i SU-rapporten 2020 og Nielsen *et al.* (2021). Den aktuelle fugl viste en smal skægstribe, lys tøjle og udbredt rustrøde flanker, helt om til undergumpen, hvilket kendetegner arten, mens der ikke er sikker dokumentation af haletegningen. Lyd-optagelsen udelukker makisanger *C. subalpina*. (Iberiske halvø, sydlige Frankrig, nordvestlige Italien, nordvestlige Afrika fra Marokko til Tunesien; overvintrer Afrika)

Rødstrubet sanger *Curruca cantillans* (0, 12/12, 2/2)

2021: 11-13/5, Nørre Rubjerg, Lønstrup (NJ), han, *Per Christensen m.fl. (Foto). – 30/5, Gedser Odde (LF), 2K hun ssp. *cantillans* ringm., *Hans Lind, Vagn Lind, Louis A. Hansen m.fl. (Foto & DNA).

Rødstrubet sanger er polytypisk med underarterne *cantillans* og *albistriata* (Gill *et al.* 2022). Bestemmelse af underarten er kun mulig ud fra en DNA-analyse. J. Martin Collinson og Tereza Senfeld fra University of Aberdeen i Skotland har endnu engang ydet uvurderlig hjælp ved, at foretage en DNA-analyse af fjer, indsamlet ifm. ringmærkningen af fuglen fra Gedser Odde. Analysen viste, der var tale om underarten *cantillans* (J. Martin Collinson pr. mail). Der er hermed to danske fund af ssp. *cantillans*, hvilket er lige så mange som for ssp. *albistriata*; det første fund af ssp. *cantillans* er 2/6 2018 2K hun ringm. Christiansø (B) (SU-rapport 2018). Fuglen fra Nørre Rubjerg blev artsbestemt på baggrund af murstensrød strube i kontrast til lyse flanker samt bred skægstribe. (Nordøstlige Italien til vestlige Tyrkiet, sydlige Italien & Sicilien; overvintrer Afrika)

Eremiddrossel *Catharus guttatus* (0, 0, 1/1)

2021: 3-4/11, Christiansø (B), 1K han ringm., *Anton Herrig Liebermann m.fl. (Foto & Lyd).

Første forekomst i Danmark. Der er tale om den anden art af slægten *Catharus*, som er truffet herhjemme, og

nok engang var det et spejlnet på landets østligste lokalitet, som leverede varen. Den aktuelle forekomst følger nemlig i kølvandet på Danmarks hidtil eneste fund af olivenskovdrossel *C. ustulatus*, samme sted, 21-30/10 2012 1K ringm. (SU-rapport 2012). Begge fugle blev observeret i felten efter ringmærkning. Fundet er nærmere behandlet andetsteds i nærværende publikation (Olsen *et al.* 2022). (Nordamerika; overvintrer sydlige USA & Mellemamerika)

Rubinnattergal *Calliope calliope* (0, 3/3, 0)

1990: ca. 20/11, Skovlunde, København (S), 1K han fundet død, Per Husum, Brian Philipsen, Peter Sunesen m.fl. (Foto & Død).

Fuglen har hidtil været godkendt som en adult (2K+) han fra ca. 20/11 1990 (SU-rapport 1990). Ved den første behandling af fundet vurderede Sjældenhedsudvalget, at fuglens alder, lokaliteten og graden af slitage talte imod spontan forekomst, hvorfor det blev accepteret i kategori E (SU-rapport 1990). Sjældenhedsudvalget har genbehandlet fundet på baggrund af nye fotos af den udstoppede fugl og er nået frem til, at der er tale om en 1K han, altså ikke adult som oprindeligt vurderet. Hvad angår graden af slitage, er halens fjerspidser på fuglen i 1990 relativt slidte, men en gennemgang af en række billeder af håndholdte fugle har vist, at det formentlig grundet artens jordlevende levevis ikke er ualmindeligt at se tilsvarende slid på ung-fugle om efteråret. Lokaliteten udelukker i øvrigt ikke en spontan forekomst; der er fx et nyligt svensk fund af en 1K (senere 2K) han fundet i et villakvarter i Vargön, Västra Götaland, 15/11 2021-17/4 2022 (Artportalen 2022). Sjældenhedsudvalget mener derfor ikke, at der er noget, som taler imod spontan forekomst, hvorfor fundet efter genbehandling overføres fra kategori E til kategori A. Rubinnattergalen fra Skovlunde blev indleveret til konservator Brian Filipsen af Per Husum, som har oplyst til en lokalavis (kopi af artikel ligger i Sjældenhedsudvalgets arkiv), at han modtog den døde fugl af hans genbo, mens fuglen stadig var varm, en dag "midt i november 1990". Fuglen blev fundet tæt på et vindue, og vurderedes, at være død af kollisionen med ruden.



Blåstjert, Christiansø, 29. september 2021. Foto: Anton Herring Liebermann

Konservator Peter Sunesen udstoppede fuglen, der nu befinder sig i en privat samling. De nye billeder, der er indgået i genbehandlingen, er taget af de nuværende ejere. De to øvrige danske fund er begge fra Christiansø (B), og omhandler fugle fundet i spejlnet i forbindelse med ringmærkning: 20/10 1985 1K hun (SU-rapport 1985) og 30/10-2/11 1995 1K han (SU-rapport 1995-

1996). (Sibirien, nordlige Mongoliet, nordøstlige Kina & Nordkorea; overvintrer Sydøstasien)

Blåstjert *Tarsiger cyanurus* (0, 26/26, 3/3)

2021: 29/9, Christiansø (M), 1K ringm., *Mikkel Lau-sten, Anton Herring Liebermann m.fl. (Foto). – 8-10/10, Blåvands Huk (RB), 1K ringm., *Jonas Pedersen, Luke Nelson, Sebastian Thorup Hansen m.fl. (Foto). – 19-20/10, Mandø By (RB), 1K, *Tim Hesselballe Hansen, Jan Speierman m.fl. (Foto).

Hermed andet fund på både Christiansø og Mandø, og det sjette fund i Blåvand-området. Der er i øvrigt tale om den første ringmærkede fugl på Christiansø, da det første fund omhandler en feltobservation, 19/10 1996 (SU-rapport 1995-1996). Begge de ringmærkede fugle blev fundet i spejlnet. (Finland, Rusland, nordøstlige Kina & Japan; overvintrer Korea, sydlige Kina, nordlige Indokina, Thailand & Myanmar)

Hvidhalset fluesnapper *Ficedula albicollis*

2021: 31/5, Grenen, Skagen (NJ), hun, *Mikkel Wille-moes, Anders Odd Wulff Nielsen, Andreas Egelund Christensen m.fl. (Foto).

Fund vest for Storebælt er usædvanlige og fund af hun-farvede individer i Nordjylland skal forelægges Sjældenhedsudvalget som lokal SU-art. Fuglen blev



Hvidhalset fluesnapper, Grenen, Skagen, 31. maj 2021. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen



Sibirisk bynkefugl/japansk bynkefugl, Thyborøn, 21. oktober 2021. Foto: Allan Kjær Villesen

bestemt i felten, bl.a. på baggrund af foto af vingen, som viste, at den hvide tegning på håndsvingfjerene nåede ud til P4 (Svensson 1992). (Øland, Gotland, Central- og Østeuropa & vestlige Rusland; overvintrer sydlige Afrika)

Sibirisk bynkefugl / japansk bynkefugl *Saxicola maurus* / *Saxicola stejnegeri* (0, 47/47, 3/3)

2021: 20-21/10, Thyborøn (RK), 1K hun, *René Rørbæk, Asger Lykkegaard Møldrup, Allan Kjær Villesen m.fl. (Foto). – 20-21/10, Grønningen, Blåvand (RB), 1K han,



Isabellastenpikker, Blåvands Huk, 14. november 2021. Foto: David Manstrup

*Hans Ægidius, Martin Rheinheimer m.fl. (Foto). – 20/10, Skallingen (RB), 1K/hun, *Niels Bahl Andersen m.fl. (Foto).

Sjældenhedsudvalget er i gang med en genbehandling af fund af artskomplekset, sibirisk bynkefugl og japansk bynkefugl, på baggrund af et nyt studie af dragt karakterer (Hellström & Waern 2021). Undersøgelsen viste, at arterne har stor variation i dragten, men afslørede også, at visse individer af begge arter kan artsbestemmes i felten og ud fra gode foto. Det svenske sjældenhedsudvalg har på baggrund af den ny viden foretaget en genbehandling af de svenske fund i artskomplekset (BirdLife Sverige 2022). Dette resulterede i, at 28 fund blev bestemt til art: 24 sibiriske bynkefugle og fire japanske bynkefugle, mens yderligere 174 fund regnes som ubestemte. Indtil videre publiceres alle danske fund som ubestemte, hvis der ikke foreligger en DNA-undersøgelse, med undtagelse af hanner af sibirisk bynkefugl ssp. *hemprichii*, hvis haletegning udelukker andre underarter og arter inden for komplekset. Der blev i øvrigt indsamlet afføring til brug for DNA-undersøgelse, fra fuglene i Thyborøn og Grønningen i Blåvand, men resultatet foreligger ikke endnu. (Rusland & Østasien; overvintrer Mellemøsten, Østafrika & Sydøstasien)

Isabellastenpikker *Oenanthe isabellina* (0, 2/2, 1/1)

2021: 14-17/11, Blåvands Huk (RB), 1K, *Jonas Pedersen, David Manstrup, Hannelie Sidhu (Foto).

Det aktuelle fund er det første i november måned, da de to tidligere danske fund er fra oktober: 13/10 2005,

Nyeng, Skallingen (RB) (SU-rapport 2005) og 18-25/10 2016, 1K, Gilleleje Havn (S) (SU-rapport 2016). Fundet i 2021 er dermed også det andet fund i Varde Kommune, hvor landets første også blev gjort. Ud fra bl.a. billeder af vingen var det muligt at studere fuglens fældning og aldersbestemme den til en 1K. (Tyrkiet, centrale Asien; overvintrer Afrika, Arabiske halvø & nordvestlige Indien)

Nonnestenpikker *Oenanthe pleschanka* (0, 12/12, 1/1)

2021: 10/10, Ertholmene (B), 2K+ han, *Gunhild Justesen, Jens Lund Hansen, Anton Herrig Liebermann m.fl. (Foto).

Tredje fund på Ertholmene; de to tidligere fund hér er også fra oktober, 27/10-1/11 1991, 2K+ han (SU-rapport 1991) og 7/10 1992, hun (SU-rapport 1995-96). (Bulgarien, østlige Rumænien & videre østpå til Mongoliet; overvintrer Østafrika)

Tajgapiber *Anthus hodgsoni* (0, 23/24, 4/4)

2021: 17/10, Skallingen (RB), trk. fors., *Stephan Skaarup Båsen Lund, *Rune Sø Neergaard (Lyd). – 18/10, Skallingen (RB), trk. fors., *Henrik Kristensen, *Rasmus Strack (Lyd). – 18/10, Ho (RB), *Rune Sø Neergaard (Lyd). – 31/10, Roborghus, Esbjerg (RB), trk., *Ole Zoltan Göller (Lyd).

Fire typiske fund. Af de totalt 27 danske fund er de 21 fra oktober, og samtidig er 21 af fundene fra Sydvestjylland (RB). I Norge blev der set ni tajgapibere i 2021, hvilket var et ringe år for arten (Tor A. Olsen pr. mail), mens der var fire fund i Sverige (Niklas Andersson pr. mail) og otte fund i Tyskland (Christopher König pr. mail). (Sibirien mod vest til Ural; overvintrer Indien & Sydøstasien)

Krognæb *Pinicola enucleator* (-, 43/72 ekskl. invasionen i Skagen i november 1998, fund i NJ nord for Limfjorden i 2012 og fund uden for Vendsyssel, samt nordkysten af Vestsjælland og Nordsjælland i 2019, 0)

Tre fund: 12/10 1975, 2K+ han, Skagen (NJ) (SU-rapport 1977-78), 12/10 1991, 1K han, Solrød Strand (S) (SU-rapport 1991) og 5/10 1997, 2K+ han, Skagen (NJ) (SU-rapport 1997) anerkendes efter genbehandling ikke længere. (Skandinavien, Finland & Rusland)

Gråsiken *Acanthis flammea*

Med karakterer svarende til grønlandsk gråsiken, ssp. *rostrata* (0, 1/1, 0)

2018: 14/10, Reservatet, Skagen (NJ), 2K+ aflæst, Michael Ancher, Molly Brown, Simon S. Christiansen m.fl. (Foto).

Første fund i Danmark. Fuglen var ringmærket ved Akuereyri, centralt på nordkysten i Island, 2/1 2018. I Sverige er der godkendt ét fund; 1K han ringmærket på Landsort, Södermanland, 30/12 2006 (Björn Malmhagen pr. mail), mens underarten regnes som en regelmæssig efterårsgæst i Norge på kysten mellem Trondheim og Lofoten, hvor flokke på op til 50 individer af "rostrata-typen" er registreret. Disse fugle optræder ofte på samme tidspunkt som grønlandsk hvidsiken ssp. *hornemanni* (Tor A. Olsen pr. mail). Formen ssp. *islandica*



Nonnestenpikker, Ertholmene, 10. oktober 2021. Foto: Anton Herrig Liebermann

anerkendes ikke længere og er nu inkluderet under ssp. *rostrata* (Gill et al. 2022). (ssp. *rostrata*: Grønland & Island; overvintrer Grønland, Island & De Britiske Øer)

Hvidkindet værling *Emberiza leucocephalos* (0, 5/5, 1/1)

2021: 14-28/3, Rødhus, Pandrup (NJ), 3K+ hun, *Karsten Bach, Kari Geneser m.fl. (Foto).

Første fund af en hun og andet år i træk med fund af arten i Danmark. Fuglen blev observeret og fotograferet på nært hold, hvilket viste, at fuglen ikke havde gult i dragten, inklusiv undervinge. På den baggrund kan det siges med stor sikkerhed, at fuglen ikke er en hybrid mellem hvidkindet værling og gulspurv (*E. citrinella*). Arten har optrådt med stigende hyppighed i Danmark de senere år, hvor fire ud af seks fund er fra 2010 og frem. Tilsvarende udvikling er registreret i Norge, som skiller sig ud som Nordens absolutte topscorer, hvad antal fund angår. Af i alt 51 norske fund til og med 2021 er de 36 (70 %) fra 2013 og frem; flest i 2016 (18), 2017 (9) og 2021 (8). Forekomsten i Norge fluktuerer kraftigt fra år til år, men der er også observeret tilbagevendende individer (Tor A. Olsen pr. mail). (Nord- & Centralasien; overvintrer Sydøstasien)



Pileværling, Saltholm, 10. oktober 2021. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Pileværling *Emberiza rustica* (0, 54/54, 1/1)

2021: 10/10, Saltholm (S), 1K han, *Anders Odd Wulff Nielsen, Joakim Matthiesen, Michael Fink Jørgensen m.fl. (Foto & Lyd).

Første fund på Saltholm og det næstseneste danske fund; det seneste fund er 11/10 2016 han Mandø (RB). Seneste fund i region Sjælland er fra 2014. (Nordlige Skandinavien, Finland & Rusland; overvintrer Kina & Sydøstasien)



Hætteværling, Christiansø, 3. juni 2021. Foto: Anton Herrig Liebermann

Hætteværling *Emberiza melanocephala* (0, 30/31, 3/3)

2021: 25/5, Grenen, Skagen (NJ), han rst., derefter trk., *Jakob Engelhard, Anders Wiig Nielsen, Sakari Kauppinen m.fl. (Foto). – 3/6, Christiansø (B), han ringm., *Alexandra Rose Buxton, Anton Herrig Liebermann m.fl. (Foto). – 6/6, Grenen, Skagen (NJ), han syng., *Lars Grøn, *Rasmus Matthiesen-Juhl, *Anders Rasmussen m.fl. (Foto).

Hermed sjette og syvende fund i Skagen og ottende fund på Ertholmene. Det er andet år med tre fund, mens der er fem år med to fund: 1970 (1), 1973 (1), 1987 (2), 1988 (3), 1989 (1), 1992 (2), 1993 (1), 1994 (2), 1995 (1), 1997 (1), 1999 (1), 2000 (1), 2001 (1), 2002 (1), 2003 (1), 2005 (1), 2007 (1), 2009 (1), 2012 (1), 2014 (2), 2015 (1), 2016 (1), 2017 (2), 2020 (1) og 2021 (3). Bemærk, at der var en fejl i opsummeringen i SU-rapport 2020 (se rettelser sidst i indeværende rapport). (Sydøsteuropa & Lilleasien; overvintrer Pakistan & vestlige Indien)

Kategori D: Mulige undslupne fangenskabsfugle

Category D: Possible escapes

Hvid pelikan *Pelecanus onocrotalus* (0, 3/3, 0)

2009: 29/7, Vangså Strand, Thy (NJ), ilanddrevet, *Anders Åkjær Sørensen (Foto).

Det drejer sig om en ilanddrevet fugl. Det kan ikke siges med sikkerhed, at fuglen var i Danmark på døds-



Gulnæbbet glente,
Grenen, Skagen, 3. maj 2021.
Foto: Jørgen Kabel

tidspunktet. Men grundet kadaverets tilstand og udformningen af Danmarks eksklusive økonomiske zone ud for den jyske vestkyst, har Sjældenhedsudvalget vurderet det som overvejende sandsynligt og godkendt fundet i Kategori D.

Det er tredje danske fund, der placeres i kategori D. De to øvrige fund i kategori D er: 18-19/7 2007 ved Hegnede Bugt (M) og samme fugl 19/7 2007 ved Marie-lyst Strand (LF) og 1/8 2007 ved Hyllekrog (LF) (SU-rapport 2007), og 22-23/6 2019 ved Mellemsø, Filsø (RB) og samme fugl 23-24/6 2019 i Arup Vejle, Vejlerne (NJ) og 1/7 2019 i Margrethe Kog (SJ) (SU-rapport 2019). Derudover foreligger der seks fund i kategori E: 10/5 1967 i Ulvedybet (NJ) (SU-rapport 1965-69, SU-rapport 2010), 31/10 1977 i Ulvedybet (NJ) (SU-rapport 1977-78, SU-rapport 2007, SU-rapport 2010), 23/9-1/10 1986 i Ulvedybet (NJ) (SU-rapport 1986-87, SU-rapport 2007, SU-rapport 2010), 27/10 1987 ved Dovns Klint, Langeland (F) (SU-rapport 1986-87, SU-rapport 2007, SU-rapport 2010), 18-25/9 2010 ved Bløden, Læsø (NJ) (SU-rapport 2010), og 24-31/12 2013 på flere

lokaliteter ved Aabenraa og ved Arup Hartsø, Als (SJ) (SU-rapport 2013). (Sydøsteuropa & Lilleasien; overvintrer Mellemøsten & Afrika)

Gulnæbbet glente *Milvus aegyptius* (0, 0, 1/1)

Med karakterer svarende til afrikansk sort glente, ssp. *parasitus* (0, 0, 1/1)

2021: 2-3/5, Storsig og Grenen, Skagen (NJ), 3K+, *Michaela Berdugo, Jonas Pedersen, Jørgen Kabel m.fl. (Foto).

Første danske fund. Fundet drejer sig om en ældre (3K+) fugl af underarten ssp. *parasitus*, som er almindeligt forekommende i Afrika syd for Sahara. Ud fra specifikke kendetegn i dragtens slidmønstre kunne det med sikkerhed siges, at samme fugl var fotograferet kort forinden 11/4 ved Lauwersmeer i det nordlige Holland (CDNA 2022) og 15-16/4 på østfrisiske Wangerooze i Tyskland. Arten er registreret spontant i Israel, men der foreligger ingen fund i kategori A fra det kontinentale Europa. Ifølge statistikkerne over fugle i fangenskab opdrættes arten kun i et begrænset omfang. Ud over en slidt fjerdragten viste individet i Skagen ikke nogen synlige tegn på at den skulle være undsluppet fra fangenskab såsom ringe, stropper, blegede fjer eller lignende. Dertil foretager arten længere trækbevægelser i Afrika, hvorfor Sjældenhedsudvalget har vurderet, at det ikke kan udelukkes, at arten kan forville sig til Europa på spontan vis. Derfor har udvalget valgt at publicere fundet i kategori D med henblik på at afvente yderligere viden, der kan afgøre, om fundet hører hjemme i kategori A eller kategori E. (ssp. *parasitus*: Nordøstafrika & sydvestlige Arabiske Halvø)

Kategori E: Formodede eller sikre undslupne fangenskabsfugle

Category E: Presumed or certain escapes

Dværgcanadagås *Branta hutchinsii*

Med karakterer svarende til mørk dværgcanadagås, ssp. *minima* (0, 7/7, 2/2)

2012: 19/4, Ballum Sluse (SJ), *Ole Zoltan Göller (Foto). – 27-28/4, Mandø Sluse (RB), *Sigrid Kistrup Ilsøe, Tim Hesselballe Hansen (Foto). – 13/5, Nyord (M), Lars Nørgaard Andersen, Ingrid Hartz m.fl. (Foto). – 25/12, Knudshoved Odde (S), 2K+, Frank Abrahamson, Lars Adler Krogh (Foto).

2019: 13/11, Lillevade, Højer (SJ), 2K+, *Rasmus Due Nielsen (Foto).

2020: 25-28/3, Selsø Sø, Skibby (S), *Jakob Engelhard (Foto).

2021: 30/4, Værnengene (RK), Søren Peter Pinnerup, Tommy Kaae (Foto). – 20-23/8, Bøjden Nor (F), 2K+, Søren G. Nielsen m.fl. (Foto).

Sjældenhedsudvalget er i gang med at behandle alle hidtidige fund af dværgcanadagås med henblik på at danne et overblik over artens forekomst i Danmark, idet fund af dværgcanadagås, ssp. *hutchinsii* kandidater til at blive placeret i kategori A, mens mørk dværgcanadagås, ssp. *minima* er under evaluering i forhold til en placering i kategori C og ikke som nu i kategori E. (Kategori C-bestand: Holland)

Dværagsnegås *Anser rossii* (0, 5/6, 0)

2020: 16/7, Saltholm (S), 2 3K+ hvid form, *Rasmus Strack, *Sebastian Klein (Foto). – 18-20/7, Klydesøen, Kalvebod Fælled (S), 2 3K+ hvid form, Lars Paaby, Finn Olofsen m.fl. (Foto).

Fundet på Saltholm og Klydesøen vurderes at omhandle samme individer. Der foreligger fire tidligere fund i kategori E: 7/2-7/3 1997, Vejlerne (NJ), 3K+ (SU-rapport 1997), 3-13/10 1998, Ballum Enge og Forland (SJ), 2K+ (SU-rapport 1998), 15/10 2000, Margrethe Kog (SJ), 2K+ rst. og dernæst trk. (SU-rapport 2000) og 27/3-14/11 2013, Vitsø og Stokkeby Nor, Ærø (F), 2K+ (SU-rapport 2014). Sjældenhedsudvalget opfordrer alle til at indsende alle hidtidige fund af dværagsnegås med henblik på at udvalget kan danne et overblik over artens forekomst i Danmark, idet arten er under evaluering i forhold til en mulig placering i kategori A og ikke som nu kun i kategori E. Baggrunden er, at arten er en langdistance-trækker i Nordamerika, og der er meget præcedens for, at nearktiske andefugle, herunder gæs, krydser Atlanterhavet naturligt og forekommer i Europa. Ydermere har arten oplevet en meget betydelig fremgang og tilvæksten siden 1950'erne har øget sandsynligheden for transatlantiske forekomster. Arten er indgået på den britiske liste i kategori A på baggrund af et fund i 1970 og siden er nye fund kommet til (BOURC 2022). (Nordamerika)

Hvidøjet and *Aythya nyroca* (0, 2/2, 1/1)

2021: 10-11/9, Utterslev Mose, København (S), 1K hun, *Kim Duus m.fl. (Foto).

Fuglen var ringmærket med gul plastikring, der viste, at fuglen stammede fra et avls- og udsætningsprogram i den tyske delstat Niedersachsen, hvor bestanden ikke anses for at være selvsupplerende. Det er anden gang, at en fugl fra dette program er konstateret i Danmark, da en, ligeledes 1K-fugl med gul ring, opholdt sig i Vognsbølsparken i Esbjerg (RB), 15/9-4/10 2015 (SU-rapport 2015). Eneste anden SU-godkendte hvidøjet and i kategori E var en tam og ringmærket fugl fra Hvilsom, Hobro (NJ), 13-15/3 2008 3K+ han (SU-rapport 2019) (Øst- & Sydøsteuropa; overvintrer Middelhavet, Sortehavet & Nordafrika)

Japansk trane *Grus japonensis* (0, 1/1, 0)

2021: 12/1, Vådområdet Skærup Å (VE), Lars Kro-mann-Larsen. – 21-24/2, Tiufkær Mark (VE), Ronni Røjgaard m.fl. (Foto). – 31/3, Ryslinge (F), trk., Lars Westermann (Foto). – 18/4, Fredericia (VE), trk., Bo Levesen. – 20/4, Vådområdet Skærup Å (VE), Lars Fenger Nielsen, Michael Larsen Hansen (Foto). – 4/8, Bjørndrup, Christiansfeldt (SJ), Aleks Lund (Foto). – 30/11, Ørsted Mark, Haderslev (SJ), Morten Bentzon Hansen (Foto).

Fuglen er set i området siden august 2020 og er undsluppet fra Skærup Zoo (SU-rapport 2020). (Sydøstlige Sibirien, Nordøstkina, Nordkorea & Japan)

Munkegrib *Aegypius monachus* (0, 4/4, 0)

2020: 10/4, Aarsdale (B), 3K+ ilanddrevet, *Jimmi Falk m.fl. (Foto & Død).

Det kan ikke siges, hvor fuglen var på dødstidspunktet, men Sjældenhedsudvalget har valgt at publicere fundet, så det tæller med i fundoversigten over danske fund. Kadaveret af den ilanddrevne fugl ligger på Statens Naturhistoriske Museum i København. Det er oplagt, at der er tale om samme individ, som opholdt sig på Rügen ud mod Østersøen i det nordlige Tyskland i perioden 20/3 2019-11/3 2020 (Christopher König pr. mail). I Tyskland er fundet godkendt i kategori E, og set i lyset af at fuglen overvintrede og opholdt sig på samme sted ud til Østersøen i et helt år har Sjældenhedsudvalget valgt at følge den tyske kategorisering. Det er fjerde danske fund, der placeres i kategori E, hvor de tre tidligere fund er: 17/8-13/9 1974, egnen omkring Skjern, især Dejbjerg (RK) (SU-rapport 1977-78), 3-5/4 2010, Harboøre Tange (RK) og Agger Tange (NJ) og samme fugl 15-16/9 2010, Nørre Elkær, Bindslev (NJ) og 3-10/10 2010, Tvørup Klitplantage, Vilsbøl Klitplantage, Vandet Sø og Hanstholm Vildtreservat (NJ) (SU-rapport 2010), og 13-14/5 2019, Falster (LF) og Sjælland (S), bl.a. 14/5 2019 Hellebæk Avlsgård (S) (SU-rapport 2019). (Syd- & Østeuropa, Centralasien, Mellemøsten, Mongoliet & Kina).

Slagugle *Strix uralensis* (0, 1/1, 0)

2003: 17/3, Silkeborg (ÅH), via Rolf Christensen (Foto).

Fuglen blev påkørt af en lastbil i Sverige og havde kilet sig fast i forenden af køretøjet. Da lastbilen stoppede i Silkeborg, kunne chaufføren konstatere, at fuglen stadig var i live, men den døde kort efter. Fuglen vurderes som indslæbt og er derfor godkendt i kategori E, hvilket også er tilfældet med en sorthovedet sanger (*Curruca melanocephala*), der blev indfanget i Biscayen på et skib og holdt i bur, indtil skibet anløb Esbjerg i oktober 2015 (SU-rapport 2016). (Fennoskandinavien, Østeuropa & nordlige Asien)

Alexanderparakit *Psittacula krameri* (0, 5/5, 1/1)

2021: 30/1, Merkur Allé, Kastrop, Amager (S), hun, Henrik Michelsen via Facebook (Foto).

Sjældenhedsudvalget opfordrer til at fund indsendes med henblik på at danne et overblik over artens forekomst i Danmark, idet arten har selvsupplerende bestande flere steder i Europa, inklusive Tyskland, hvor Bauer et al. (2016) angiver, at arten lever op til kriterier for en C-art. (Kategori C-bestand: Tyskland, Holland, Storbritannien, Belgien, Frankrig, Portugal, Spanien, Italien, Grækenland, Tyrkiet, Egypten, Jordan & Israel)

Rocky mountain-rævespurv *Passerella schistacea* (0, 1/1, 0)

2010: 5-9/1, Elkær Plantage, Bindslev (NJ), Carlo Pedersen, Frank Simonsen, Rolf Christensen (Foto).

Fuglen var ringmærket på begge ben med bl.a. en lilla ring og manglede desuden fjer i panden lige over næbbet. Det peger på, at fuglen har haft en fortid bag tremmer, hvorfor Sjældenhedsudvalget har godkendt iagttagelsen i kategori E. Fundet har tidligere været publiceret som tilhørende artskomplekset bestående af rævespurv (*P. iliaca*) (SU-rapport 2010), men grundet taksonomisk ændringer, hvor rævespurv er blevet

delt i de fire selvstændige arter: unalaska-rævespurv (*P. unalaschcensis*), rocky mountain-rævespurv (*P. schistacea*), tyknæbbet rævespurv (*P. megarhyncha*), og rævespurv (*P. iliaca*), er fundet blevet genbehandlet og godkendt som tilhørende rocky mountain-rævespurv. (Nordamerika)

Formodede eller sikre hybrider

Records involving presumed or certain hybrids

Hvidøjet and x taffeland *Aythya nyroca* x *Aythya ferina* (0, 20/20, 1/1)

2021: 3/11, Sundet, Faaborg (F), 2K+ han, *Rune Sø Neergaard (Foto & Video).

Hvidøjet and x trolldand *Aythya nyroca* x *Aythya fuligula* (0, 1/1, 0)

2021: 1/1-14/1, Store Kattinge Sø, Roskilde Fjord, 3K+ han, *Jakob Engelhard, Rasmus Strack m.fl. (Foto & Video). – 17/1, Kattinge Vig, Roskilde Fjord, 3K+ han, Anders Wiig Nielsen m.fl. – 16/2, Roskilde Fjord ved Eskilsø (S), 3K+ han, *Jakob Engelhard m.fl. (Foto). – 10-18/3, Bjørnebæk Sø, Bissrup (S), 3K+ han, *Rasmus Strack m.fl. (Foto).

Alle fund anses for at omhandle ét individ, som blev opdaget i Store Kattinge Sø, 20/12 2020 (SU-rapport 2020). Der blev ikke konstateret individspecifikke karakteristika, såsom skader på fjer, men fuglen havde et særegent udseende hvad angår mængden af mørkt i undergumpen og længden af toppen, som ellers er variabelt.

Halsbåndstroland x trolldand *Aythya collaris* x *Aythya fuligula* (0, 9/9, 0)

2021: 4+6/2, Nibe Bredning (NJ), 3K+ han, *Rune Sø Neergaard (Foto & Video). – 28/2 + 8-9/3, Halkær Sø (NJ), 3K+ han, *Rune Sø Neergaard, Henrik Møller Thomsen (Foto & Video).

Fuglen blev opdaget i 2020, hvor den lå i Halkær Sø 4+7/4. Halkær Sø ligger 5 km syd for Nibe Bredning.

Grønland – Kategori A

Greenland – Category A

Dværgsnegås *Anser rossii* (0, 1/1, 0)

2008: 22/7, Booth Sound, Steensby Land, Avanersuaq, Nordgrønland, 2K+ ringm., John Baroch, David Sinnett m.fl. (Foto).

Første fund af dværgsnegås i Grønland. Fuglen blev indfanget og fotograferet af et hold amerikanske forskere, der undersøgte snegæs (*A. caerulescens*) i Grønland for fugleinfluenza. (Nordamerika)

Gravand *Tadorna tadorna* (0, 3/4, 0)

2020: 1/1, Angissunguaq, Nuuk, Vestgrønland, 2 (én skudt), via Lars Witting (Foto). – 11/5, Narsaq, Vestgrønland, hun, via Martin Kviesgaard (Foto).

Henholdsvis andet og tredje fund i Grønland. Første fund i Grønland blev gjort i 2019 (SU-rapport 2019). (Europa)



Halsbåndstroland, Søndersø, 15. april 2021. Foto: Sakari Kauppinen

Atlingand *Spatula querquedula* (0, 0, 1/1)

2021: 1/7, Satsisunnguit, Nuuk, Vestgrønland, 2K+ hun, *Lars Maltha Rasmussen (Video).

Første fund i Grønland. Fundet blev forelagt Sjældenhedsudvalget som blåvinget and (*S. discors*), men fuglens udseende bedømt ud fra det indsendte videomateriale samt kald analyseret på baggrund af et spektrogram lavet ud fra en lydoptagelse fra en af videooptagelserne afgjorde at fundet drejede sig om atlingand. (Europa; overvintrere Afrika)

Skeand *Spatula clypeata* (0, 5/7, 2/3)

2021: 31/5, Nuuk, Vestgrønland, 2 (han + hun), Lasse Trolle (Foto). – 18/12, Nuuk, Vestgrønland, han, Martin Kviesgaard, Max Nøraa Nielsen (Foto).

Henholdsvis syvende og ottende fund for Grønland. (Europa, Asien & Nordamerika; overvintrer Vest- og Sydeuropa, Tropisk Afrika, sydlige USA, Mexico & Mellemamerika)

Halsbåndstroidand *Aythya collaris* (0, 1/1, 1/1)

2021: 31/5, Nuuk, Vestgrønland, han, Per Jansen, Lasse Trolle (Foto).

Andet fund af denne nordamerikanske art i Grønland. Første fund er 23/5 1977, han, ved Isortoq i Sydøstgrønland (Boertmann 1994). (Nordamerika)

Dværgmåge *Hydrocoloeus minutus* (2/2, 5/5, 1/1)

2020: 4/10, Tuussaaq i Sydøstbugt, syd for Qasigiannnguit, Vestgrønland, 3K+ vdr. skudt, via Lars Witting (Foto).

2021: 27/8-3/9, Nuuk, Vestgrønland, 2K, Martin Kviesgaard (Foto).

Der er seks tidligere fund af arten i Grønland fra hhv. 1929 (1), 1932 (1), 2007 (1), 2010 (2) og 2017 (1). Bortset fra ét fund 16/8 2010 fra Liverpool Land i Nordøstgrønland (SU-rapport 2020) er alle øvrige fund fra Vestgrønland. (Nordøsteuropa; overvintrer Atlanterhavet & Nordsøen)

Hornlunde *Fratercula corniculata* (0, 1/1, 0)

2002-2006, 2008 og 2013-2019: 7/7-10/8, Dalrymple Rock, Nordgrønland, sdr., Kurt K. Burnham, Jennifer L. Burnham, Jeff A. Johnson m.fl. (Foto).

Første fund i Grønland. Der er ikke angivet datoer for hvornår den er iagttaget de enkelte år 2002-2006 ud over at det er i første halvdel af august. Til gengæld er den i 2008 og 2013-2019 registreret med følgende fund: 13/7 2008, 19+29/7 2013, 8-28/7 2014, 15/7-10/8 2015, 13+16/7 2016, 18/7 2017, 7/7 2018 og 15/7-6/8 2019. Sjældenhedsudvalget har vurderet, at det skal regnes som ét fund af én fugl. Læs mere om fundet i Nordgrønland i Burnham *et al.* (2020). Fra Vestpalæarktis kendes blot ét fund; en fugl i sommerdragt fotograferet fra skib 10/8 2009 ud for øen Hornøya i Norge (Norgeslisten 2022). (Stillehavet)

Toplunde *Fratercula cirrhata* (0, 2/2, 0)

2019: 15/7-6/8, Dalrymple Rock, Nordgrønland, sdr., Kurt K. Burnham, Jennifer L. Burnham, Jeff A. Johnson m.fl. (Foto).

Andet fund i Grønland, hvor første fund omhandlede en fugl i sommerdragt, der blev fotograferet fra skib

19/8 2009 i Davisstrædet vest for Disko i Vestgrønland (SU-rapport 2009). Fra Vestpalæarktis kendes blot fire tidligere fund; en fugl i sommerdragt sås 1+8/6 1994 i Laholmsbugten, Halland, Sverige (BirdLife Sverige 2022), en fugl i sommerdragt blev fotograferet 16/9 2009 i munden af Swale Estuary, Kent, England (Wright 2011), en fugl i sommerdragt blev fotograferet 13/7 2019 og igen 28/5 2020 på Bjørneøen i Barentshavet syd for Svalbard (Norgeslisten 2022), og en 3K+ i vinterdragt blev skudt og fotograferet 17/1 2020 ud for Slættanes i Vestmannasund mellem Vágar og Streymoy på Færøerne. En gammel angivelse af toplunde fra Vestgrønland (1846) blev afvist af Winge (1898) som fejlagtig. Læs mere om fundet i Nordgrønland i 2019 i Burnham *et al.* (2020). Toplunde yngler i det nordlige Stillehav og overvintrer mod syd til det sydlige Japan og Californien. Det er muligt, at mindre is i arktisk Canada betyder, at arter fra det nordlige Stillehav lettere når Atlanterhavet og Europa, hvilket også kan være årsag til europæiske fund inden for de sidste årtier af stillehavslom (*Gavia pacifica*), langnæbbet dværgalk (*Brachyramphus perdix*) og gråvinget måge (*Larus glaucescens*). (Stillehavet)

Fjeldvåge *Buteo lagopus*

Med karakterer svarende til amerikansk fjeldvåge, ssp. *sanctijohannis* (0, 6/6, 0)

2017: 10/10, Sisimiut, Vestgrønland, 1K lys form, Nuka Kristiansen (Foto).

Der er fem tidligere fund af amerikansk fjeldvåge i Grønland, hvilke alle ligesom fundet i 2017 omhandler fotodokumenterede 1K-fugle truffet i Vestgrønland: sommer/efterår 1970 i Ilulissat (SU-rapport 2001), 30/9 1999 i Davisstrædet (SU-rapport 1999), 27/9 2002 i Ilulissat (SU-rapport 2002), 26/9 2008, havet ud for Diskobugten (SU-rapport 2008) og oktober 2008 i Niaqornat (SU-rapport 2008). Bemærk, at opsummeringen er ændret i forhold til SU-rapport 2002, hvor der var en fejl (se rettelser sidst i indeværende rapport). (ssp. *sanctijohannis*: Alaska & Canada).

Rosenstær *Pastor roseus* (0, 1/1, 0)

2021: 12/8-2/9, Aasiaat, Vestgrønland, 2K+, *Jákúnguaq Skade, Nivikka Rosing (Foto).

Første fund i Grønland. Fuglen kan meget vel være ankommet til Grønland ifm. forårstrækket, som bragte et større influx til NV Europa. I Island har der været influx i 2018 (6 fund), 2020 (13 fund), 2021 (5 fund) og der er i alt 62 fund, der fordeler sig med: januar (1), marts (1), maj (1), juni (8), juli (24), august (22), september (3) og oktober (2) (Yann Kolbeinnsson pr. mail). (Sydøsteuropa, Tyrkiet & Lilleasien; overvintrer Indien)

Eremidrossel *Catharus guttatus* (3/3, 4/4, 0)

2003: 2-14/7, Grønne Ejland, Disko Bugt, Vestgrønland, *Carsten Egevang (Foto).

2004: 9/6, Nuuk, Vestgrønland, fløj mod vindue, overlevede, *Frank Wille, Carsten Egevang (Foto).

Sjette og syvende fund i Grønland. Seneste fund ligger tilbage i 1966 (Boertmann 1994). (Nordamerika; overvintrer sydlige USA & Mellemamerika)

Endnu ikke færdigbehandlede sager

Records still under consideration

- Dværghanadagås *Branta hutchinsii*, 2005: 21-22/3, Margrethe Kog (SJ), 3K+ (Foto). – 25/4-12/5, Margrethe Kog (SJ), 3K+ (Foto). – 2006: 11/3, Ribe Holme (RB) (Foto).
- Dværghanadagås *Branta hutchinsii*, ssp. *minima*, 1996: 31/3-10/4, Østerild Fjord, Vejlerne (NJ) (Foto).
- Dværghnegås *Anser rossii*, 2021: 17/11-1/12, Bygholm Vejle (NJ), 2K+ hvid form (Foto).
- Grågås *Anser anser*, 2020: 30/12, Troldkær, Ålbæk (NJ), 3K+ ssp. *sylvestris* (Foto).
- Ederfugl *Somateria mollissima*, ssp. *borealis*, 2012: 1-3/4, Hanstholm Havn (NJ), 3K+ han (Foto). – 2-29/11, Hanstholm Havn (NJ), 3K+ han (Foto).
- Stormmåge *Larus canus*, ssp. *heinei*, 2006: 18/11, Utterslev Mose (S), 1K (Foto).
- Polarlomvie *Uria lomvia*, 2021: 22/10, Asserbo Strand (S), vdr. trk. – 24/10, Fornæs (ÅH), vdr. trk. – 24/10, Frederikshavn (NJ), vdr. trk. – 24/10, Hassensør, Ebeltoft (ÅH), vdr. trk. (Foto). – 6/11, Øresund ud for Kronborg Slot (S), vdr. trk. – 13/11, Grenen, Skagen (NJ), vdr. trk. – 19/11, Gilleleje Flak og Tragten (S), vdr. trk. – 28/12, Fornæs (ÅH), vdr. trk.
- Slørugle *Tyto alba*, ssp. *alba*, 1997: 2/7-16/6, Hundslev, Midtals (SJ). – 2018: 4/10, Rågeleje (S), ilanddrevet (Foto & Død). – 2019: 29/4, Ramskov, Holstebro (RK) (Foto). – 2020: 12/10, Skallingen (RB) (Foto).
- Elle-empidonax *Empidonax alnorum*, 2019: 6-13/10, Asiarpak, Nuuk, Grønland, rst. (Foto).
- Allike *Coloeus monedula*, ssp. *soemmerringii*, 2021: 24/10-16/1, Hundested Havn (S) (Foto).

- Brun løvsanger *Phylloscopus fuscatus*, 2021: 2-3/11 Mandø (RB) (Lyd).
- Vindrossel *Turdus iliacus*, ssp. *coburni*, 2020: 17/4, Rimmevejmarkerne, Rømø (SJ), 3K+ (Foto).
- Alaskavipstjert *Motacilla tschutschensis*, 1994: 6-12/11, Køge Sydstrand (S), 1K (Foto & Lyd).

Forkastede sager

Records not accepted

- Dværghanadagås *Branta hutchinsii*, ssp. *minima*, 1990: 3/1, Ålebæk Strand (M). – 2004: 1/5, Borreby Mose (S) (Foto). – 2021: 12/10, Møllemade, Vejlbj (F) (Foto).
- Halsbåndstroland x troland *Aythya collaris* x *Aythya fuligula*, 2020: 17/1, Ove Sø, Thy (NJ) (Foto).
- Amerikansk sortand *Melanitta americana*, 2020: 14/10, Hvidbjerg Strand, Blåvand (RB), han. (der er godkendt ét fund af én fugl på den pågældende dato, mens dokumentationen ikke tillod en sikker artsbestemmelse af den anden fugl det godkendt fund sås sammen med).
- Gråsejler *Apus pallidus*, 2020: 24/10, Gjerrild Nordstrand Øst (ÅH), 2 trk. (Foto) (der er godkendt ét fund af én fugl på den pågældende dato, mens dokumentationen ikke tillod en sikker artsbestemmelse af den anden fugl det godkendt fund sås sammen med). – 26/10, Vest Stadil Fjord (RK), 1K trk. (Foto).
- Prærietrane *Antigone canadensis*, 2021: 5/1, Sydvestpynten, Amager (S), trk.
- Ørkenpræstekrave *Charadrius leschenaultii*, 2021: 13/6, Korshage, Rørvig (S), sdr. trk.
- Polarlomvie *Uria lomvia*, 2016: 23/11, havet ud for Melby Overdrev (S), vdr. rst. (Foto). – 2021: 19/11,



Prærietrane, Vust Holme, 14. april 2021. Foto: Henrik Haaning Nielsen



Rosenterne, Grenen, Skagen, 26. juni 2021.
Foto: Knud Pedersen

- Øresund ud for Helsingør Nordhavn (S), vdr. rst.
- Hvidbrynet dværgalk *Synthliboramphus antiquus*, 2021: 29/7, Kikhavn (S), trk.
- Eremittibis *Geronticus eremita*, 2019: 25/9, Bjerringbro (NJ) (Foto).
- Gåsegrib *Gyps fulvus*, 2021: 8/6, Esby, Helgenæs (ÅH), trk.
- Dværgørn *Hieraaetus pennatus*, 2021: 15/4, Femsølyng, Rude Skove (S), lys fase.
- Ørnevåge *Buteo rufinus*, 2020: 31/7, Nørre Nisum (RK), trk.
- Musvåge *Buteo buteo*, ssp. *vulpinus*, 2021: 19/4, Skagen (NJ), 3K+ trk. (Foto). Fund, som efter genbehandling ikke længere er godkendt: 1912: 10/9, Helsingør (S), død (Foto & Død). – 1996: 7+10/6, Skagen (NJ), 3K+ trk. fors. – 2004: 19/4, Skagen (NJ), 3K+ trk. (Foto).
- Eleonorafalk *Falco eleonora*, 2017: 18/8, Margrethe Kog (SJ), 2K trk. (Foto).
- Iberisk gransanger *Phylloscopus ibericus*, 2021: 8/5, Magisterkøgen (SJ), han syng. (Lyd).
- Gærdesanger *Curruca curruca*, ssp. *blythi* / *halimodendri*, 2021: 17/10, Mosen, Blåvands Huk (RB), rst. (Foto). – 18-19/10, Mosen, Blåvands Huk (RB), rst. (Foto).
- Iberisk sanger *Curruca iberiae*, 2019: 22/10, Mandø (RB), 2K.
- Iberisk sanger / rødstrubet sanger *Curruca iberiae* / *Curruca cantillans*, 2019: 29/9, Mindelunden og Kalvekrog, Sønderho, Fanø (RB), 2K.
- Alaskavipstjert *Motacilla tschutschensis*, 2021: 20/10, Skallingen (RB), trk. (Foto & Lyd).
- Eremittrossel *Catharus guttatus*, 2021: 5/11, Christiansø (B).
- Sibirisk bynkefugl *Saxicola maurus*, 2020: 1/6, Skagen (NJ), han (Foto).
- Krognæb *Pinicola enucleator*, 1975: 12/10, Skagen (NJ), 2K+ han. – 1991: 12/10, Solrød Strand (S), 1K han. – 1997: 5/10, Skagen (NJ), 2K+ han. – 2019: 30/10, Guldhøj, Muldbjerger, øst for Lille Vildmose (NJ), 4 trk. – 31/10, Ishøj Strand (S), hunfarvet trk. Fundene i 1975, 1991 og 1997 er blevet genbehandlet og er ikke længere er godkendt.
- Mørkøjet junco *Junco hyemalis*, 2021: 16/6, Esbjerg Havn (RB).

English summary: Rare birds in Denmark and Greenland in 2021

In 2021, the Danish Rarities Committee processed 271 Danish records (including three records on behalf of the regional reports) of which about 87 % were accepted. From Greenland 27 records were processed and all were accepted. The main section of the report, Accepted records, includes species on the Danish list belonging to category A and category B in accordance with the AERC guidelines as well as species considered for the regional reports. Species belonging to category C, D and E and records of hybrids are treated after the main section, followed by sections concerning records from Greenland, records still under consideration, and records not accepted. For each record, the following details are included: (1) year and date, (2) location (see map for regions), (3) number of individuals, if more than one, (4) other details, if known: sdr. = summer plumage, vdr. = winter plumage, odr. = transitional plumage, K = calendar year, ringm. = ringed, and (5) name of observer(s), with finders marked by asterisk(s). Documentation by photo (Foto), video (Video), sound recording (Lyd), telemetry tracking (GPS), DNA analysis (DNA) or corpse (Død) is indicated, if applicable. The numbers in brackets after the species name refer to the total number of records and individuals (separated by a slash) in Denmark (1) before 1950, (2) during the period from 1950 to 2020, and (3) in 2021, respectively. One new species recorded in 2021 was added to the Danish list: Hermit Thrush (*Catharus guttatus*). Other notable sightings included second records of Sandhill Crane (*Antigone canadensis*) and Oriental Pratincole (*Glareola maldivarum*), respectively, the third record of Green Warbler (*Phylloscopus nitidus*), White-throated Needletail (*Hirundapus caudacutus*), Siberian Rubythroat (*Luscinia calliope*) and Isabelline Wheatear (*Oenanthe isabellina*). Two new subspecies were also added to the Danish list: Red-rumped Swallow (*Cepcopis daurica*) of the asian subspecies *daurica/japonica* and Common Redpoll (*Acanthis flammea*) of the subspecies *rostrata*. Blyth's Reed Warbler (*Acrocephalus dumetorum*) is from 2022 no longer considered by the Danish Rarity Committee.

Bedes citeret

Please quote

Olsen, K., H. Böhmer, M.B. Hansen, A.B. Kristensen, R.S. Neergaard, A.O.W. Nielsen, S.H. Nielsen, O. Nilsson & T.E. Ortvad 2022: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2021. – Fugleåret 2021: 117-157 (in Danish with English summary).

Referencer

References

- Alström P., T. Saitoh, D. Williams, I. Nishiumi, Y. Shigeta, K. Ueda, M. Irestedt, M. Björklund & U. Olsson 2011: The Arctic Warbler *Phylloscopus borealis* – three anciently separated cryptic species revealed. – Ibis 153: 395-410.
- AERC 2022: Guidelines for Rarities Committees: <http://www.aerc.eu/guidelines.html>
- Aigle de Bonelli 2021: Plan National d'Action pour l'Aigle de Bonelli (*Aquila bonelli*): <http://www.aigledebonelli.fr/>

- Artsobservasjoner 2022: www.artsobservasjoner.no
- Artportalen 2022: www.artportalen.se
- Burnham, K.K., J.L. Burnham, J.A. Johnson, B. W. Konkel, J. Stephens & H. Badgett 2020: First record of horned puffin in the North Atlantic and tufted puffin in High Arctic Greenland. – *Polar Research* 39: 4458: <https://doi.org/10.33265/polar.v39.4458>
- Bauer H.-G., O. Geiter, S. Homma & F. Woog 2016: Non-native bird species in Germany – revision of national status categories. – *Vogelwarte* 54: 165-179.
- BBRC 2002: British Birds Rarities Committee. BBRC Statistics to 2018. <https://www.bbrc.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/Statistics-2018.xlsx>
- Birdguides 2021: British Roseate Tern population hits new high: <https://www.birdguides.com/news/british-roseate-tern-population-hits-new-high/>
- Birding Iceland 2021: <https://www.facebook.com/page/333123320133434/search/?q=needletail>
- BirdLife Sverige 2022: Sverige Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige. Raritetskommittén (Rk). Raritetskatalogen: <http://birdlife.se/rk/raritetskatalogen>
- Boertmann, D. 1994: An annotated checklist to the birds of Greenland. – *Meddr. Greenland, Bioscience* 38: 64 s.
- Boesman, P. 2016: Notes on the vocalizations of Western Bonelli's Warbler (*Phylloscopus bonelli*) and Eastern Bonelli's Warbler (*Phylloscopus orientalis*). – *HBW Alive Ornithological Note* 246. – *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona. <http://www.hbw.com/node/932243>
- BOURC 2022: British Ornithologists' Union Records Committee (BOURC): 54th Report: <https://doi.org/10.1111/ibi.13064>
- CDNA 2022: Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna: <https://www.dutchavifauna.nl/>
- Christensen, J.S. & P.A.F. Rasmussen 2015: Revideret status for sjældne fugle i Danmark før 1965. – *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 109: 41-112.
- Christensen, J.S., T.H. Hansen, P.A.F. Rasmussen, T. Nyegaard, D.P. Eskildsen, P. Clausen, R.D. Nielsen & T. Bregnballe 2022: Systematisk oversigt over Danmarks fugle 1800-2019. – *Dansk Ornitologisk Forening*.
- Christopher König pr. mail: Deutsche Avifaunistische Kommission (DAK).
- David Boertmann pr. mail: Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
- Fisher, E.A. & R.L. Flood 2010: Scopoli's Shearwater off Scilly: new to Britain. – *British Birds* 103: 712-717.
- Flood, R.L. & E.A. Fisher 2020: North Atlantic seabirds: shearwaters, Jouanin's & White-chinned Petrels. Scilly Pelagics – Scilly.
- Gill F., D. Donsker & P. Rasmussen (eds) 2022: IOC World Bird List (v 12.1): <http://www.worldbirdnames.org>
- Groenendijk, D. & T.J.C. Luijendijk 2011: Variation and difference in song between Western Bonelli's Warbler and Eastern Bonelli's Warbler. – *Dutch Birding* 33: 1-9.
- Hansen, T.H. & S.K. Ilseø 2021: To høgeørne i Danmark i 2020. – *Fugleåret* 2020: 162-164.
- Hellström, M. & M. Waern 2021: Vitgumpad buskskvätta och amurbuskskvätta – Raritetskommitténs granskning av de svenska fynden. – *Vår Fågelvärld* 2: 2021.
- IUCN/SSC 2013. Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations. Version 1.0. Gland, Switzerland: IUCN Species Survival Commission. <https://www.iucn.org/content/guidelines-reintroductions-and-other-conservation-translocations>
- J. Martin Collinson pr. mail: School of Medicine, Medical Sciences and Nutrition, University of Aberdeen, Institute of Medical Sciences, Foresterhill, Aberdeen, UK.
- Komisja Faunistyczna 2022: Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2021/Rare birds recorded in Poland in 2021. – *Ornis Polonica* 63: 130-159.
- Könönen, J. 2022: White-winged scoters. Identification of adult males from nordic view and possible hybrids (*deglandi*, *fusca*, *stejnegeri*). The 5th Nordic Rarities Committee Conference, 19–21 August 2022, Haeska, Matsalu National Park, Läänemaa, Estonia.
- Lehtikoinen, P. & S. Viles 2021: Kamchatka Leaf Warbler in Finland – a new Western Palearctic species: <https://www.birdguides.com/articles/western-palearctic/kamchatka-leaf-warbler-in-finland-a-new-western-palearctic-species/>
- McInerny, C.J, P.A. Crochet & S. Dudley 2022: Assessing vagrants from translocated populations and defining self-sustaining populations of non-native, naturalized and translocated avian species. – *Ibis* 164: 924-928.
- Netfugl 2022: <http://www.netfugl.dk/>
- Nielsen, H.H., A.B. Kristensen, S.S. Christiansen & S. Kauppinen 2021: Hvidskægget sanger-komplekset er blevet mere komplekst: Genbehandling af fund i Danmark: <https://beta.netfugl.dk/artikler/2015/hvidskaegget-sanger-komplekset-er-blevet-mere-komplekst>
- Nielsen, H.H. 2021: Nordsanger ringmærket på Blåvand Fuglestation. <https://www.netfugl.dk/artikler/2261/danmarks-tidligste-nordsanger-ringmaerket-paa-blaavand-fuglestation>
- Nielsen, C.B. & S.S. Christiansen 2022: 'Asiatisk rødrygget sval' *Cecropis daurica daurica/japonica* i Skagen – første fund i Danmark – *Fugleåret* 2021: 158-160.
- Niklas Andersson pr. mail: Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige. Raritetskommittén (Rk).
- Norgeslisten 2022: <https://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php>
- Olsen, K., R.L. Flood, T. Senfeld, T.J. Shannon & J.M. Collinson 2020: Scopoli's Shearwater collected in Faroes in August 1877. – *Dutch Birding* 42: 335-340.
- Olsen, K., A.H. Liebermann & M.B. Hansen 2022: Eremitdrossel (*Catharus guttatus*) ringmærket på Christiansø – ny art for landet. – *Fugleåret* 2021: 161-164.
- Olsen, T. 2022. Sjældne fugler i Norge i 2021. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). – *Fugleåret* 10: 4-67. <https://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/rapporter.php>
- Ortqvad, T.E., J.H. Christensen, T.H. Hansen, A.B. Kristensen, K. Olsen, K. Pedersen, P.A.F. Rasmussen & M. Schwalbe 2015: Revision af den danske fugleliste pr. 2013. – *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 109: 24-35.
- Paul French pr. mail: British Birds Rarities Committee (BBRC).



Buskrørsanger, Broksø, Fensmark, 14. juni 2021. Foto: Bo Tureby

- Roni Väisänen pr. mail: Finnish National Rarities Committee. BirdLife Suomen rareteettikomitea (BSR).
- Round, P.D., A.J. Pierce, T. Saitoh, & Y. Shigeta 2016: Addition of Kamchatka Leaf Warbler *Phylloscopus examinandus* and Sakhalin Leaf Warbler *P. borealoides* to Thailand's Avifauna. – Bulletin of the Japanese Bird Banding Association 28: 921.
- Shirihai, H. & L. Svensson 2018: Handbook of Western Palearctic Birds, Vol. 1+2. – Christopher Helm.
- Slaterus, R. 2019: Song and call identification of the first Green Warbler for the Netherlands. – The Sound Approach: <https://soundapproach.co.uk/song-and-call-identification-of-the-first-green-warbler-for-the-netherlands/>
- Svensson, L. 1992: Identification guide to European passerines. 4. udg. – Stockholm.
- Tadeusz Stawarczyk pr. mail: Polska Komisja Faunistyczna.
- Tarsiger 2022: www.tarsiger.com
- Thomas, M. 2021: Green Warbler in East Yorkshire: <https://www.birdguides.com/articles/britain-ireland/rarity-finders-green-warbler-in-east-yorkshire/>
- Tor A. Olsen pr. mail: Norsk Sjeldenhetskomite for fugl (NSKF).
- Vincent van der Spek pr. mail: Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA).
- Waarneming 2022: <https://waarneming.nl/observation/199386426/>
- Wright, M. 2011: Tufted Puffin in Kent: new to Britain – British Birds 104: 261–265: https://britishbirds.co.uk/sites/default/files/2011_V104_N05_261-265_TuftedPuffin.pdf
- Yann Kolbeinsson pr. mail: Icelandic Rarities Committee.
- SU-rapport 1965-1969: Dyck, J., J. Ramsøe Jacobsen, E. Kramshøj & J. Rabøl 1970: Rapport fra sjældenhedsudvalget med oversigt over godkendte forekomster 1965-1969. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 64: 126-151.
- SU-rapport 1970: Ramsøe Jacobsen, J., B.P. Nielsen & J. Rabøl 1971: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1970. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 65: 133-139.
- SU-rapport 1971: Bruun, J.B., J. Ramsøe Jacobsen, E. Kramshøj & B.P. Nielsen 1972: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1971. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 66: 123-131.
- SU-rapport 1972: Andersen, T., J.B. Bruun & B.P. Nielsen 1973: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1972. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 67: 139-144.
- SU-rapport 1973: Hansen, E., P.S. Hansen & B.P. Nielsen 1974: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1973. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 68: 138-144.
- SU-rapport 1974: Hansen, E. & B.P. Nielsen 1975: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1974. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 69: 135-139.
- SU-rapport 1975: Hansen, P.S. 1976: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1975. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 70: 131-138.

- SU-rapport 1976: Hansen, P.S. 1977: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1976. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 71: 139-144.
- SU-rapport 1977-1978: Pedersen, B.B. 1980: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1977 og 1978. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 74: 127-140.
- SU-rapport 1979-1980: Pedersen, B.B. 1982: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1979 og 1988. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 76: 111-122.
- SU-rapport 1981: Pedersen, B.B. 1984: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1981. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 78: 81-92.
- SU-rapport 1982-1984: Boertmann, D., K.M. Olsen & B.B. Pedersen 1986: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i årene 1982, 1983 og 1984. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 80: 35-57.
- SU-rapport 1985: Olsen, K.M. 1987: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1985. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 81: 109-120.
- SU-rapport 1986-1987: Olsen, K.M. 1988: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1986 og 1987. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: 81-100.
- SU-rapport 1988: Olsen, K.M. 1989: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1988. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: 131-149.
- SU-rapport 1989: Olsen, K.M. 1991: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1989. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 85: 20-34.
- SU-rapport 1990: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1992: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1990. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: 107-122.
- SU-rapport 1991: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1993: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1991. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 87: 231-241.
- SU-rapport 1992: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1994: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1992. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 88: 99-110.
- SU-rapport 1993: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1995: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1993. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 89: 101-110.
- SU-rapport 1994: Rasmussen, P.A.F. 1996: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1994. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 90: 141-152.
- SU-rapport 1995-1996: Rasmussen, P.A.F. 1997: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og 1996. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 133-150.
- SU-rapport 1997: Rasmussen, P.A.F. 1998: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1997. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: 253-267.
- SU-rapport 1998: Rasmussen, P.A.F. 1999: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1998. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: 127-140.
- SU-rapport 1999: Thorup, K. & H.H. Nielsen 2000: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: 157-170.
- SU-rapport 2000: Nielsen, H.H. & K. Thorup 2001: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: 153-166.
- SU-rapport 2001: Ortvaad, T.E., K. Pedersen & K. Thorup 2002: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2001. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 96: 147-160.
- SU-rapport 2002: Klein, S., K. Pedersen & K. Thorup 2003: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2002. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 97: 289-302.
- SU-rapport 2003: Amstrup, O., A.S. Frich, K. Pedersen & K. Thorup 2004: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2003. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: 174-188.
- SU-rapport 2004: Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, K. Pedersen, & K. Thorup 2005: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 99: 169-181.
- SU-rapport 2005: Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, H.H. Nielsen, K. Pedersen & K. Thorup 2006: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 100: 359-371.
- SU-rapport 2006: Kristensen, A.B., O. Amstrup & T.E. Ortvaad 2007: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2006. – Fugleåret 2006: 99-113.
- SU-rapport 2007: Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvaad & M. Schwalbe 2008: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2007. – Fugleåret 2007: 117-135.
- SU-rapport 2008: Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvaad & M. Schwalbe 2009: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2008. – Fugleåret 2008: 123-143.
- SU-rapport 2009: Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvaad & M. Schwalbe 2010: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2009. – Fugleåret 2009: 131-151.
- SU-rapport 2010: Neergaard, R.S., A.S. Frich, A.B. Kristensen, K. Pedersen, T.E. Ortvaad, M. Schwalbe & R. Strack 2011: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2010. – Fugleåret 2010: 125-144.
- SU-rapport 2011: Neergaard, R.S., A.S. Frich, A.B. Kristensen, K. Pedersen, T.E. Ortvaad, M. Schwalbe & R. Strack 2012: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2011. – Fugleåret 2011: 97-122.
- SU-rapport 2012: Neergaard, R.S. 2013: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2012. – Fugleåret 2012: 103-130.
- SU-rapport 2013: Ortvaad, T.E., S.S. Christiansen, S. Klein, A.B. Kristensen, K. Pedersen & R. Strack 2014: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2013. – Fugleåret 2013: 114-139.
- SU-rapport 2014: Ortvaad, T.E., S.S. Christiansen, O.Z. Göller, A.B. Kristensen, R.S. Neergaard, K. Olsen, K. Pedersen & R. Strack 2015: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2014. – Fugleåret 2014: 111-137.
- SU-rapport 2015: Olsen, K., S.S. Christiansen, M.B. Hansen, O.Z. Göller, R.S. Neergaard, R.D. Nielsen, K. Pedersen & R. Strack 2016: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2015. – Fugleåret 2015: 111-135.
- SU-rapport 2016: Olsen, K., S.S. Christiansen, O.Z. Göller, M.B. Hansen, S. Kauppinen, R.S. Neergaard, H.H. Nielsen, R.D. Nielsen & K. Pedersen 2017: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2016. – Fugleåret 2016: 119-148.
- SU-rapport 2017: Olsen, K., O.Z. Göller, M.B. Hansen, S. Kauppinen, A.B. Kristensen, H.H. Nielsen, R.D. Nielsen & K. Pedersen 2018: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2017. – Fugleåret 2017: 119-148.
- SU-rapport 2018: Olsen, K., O.Z. Göller, M.B. Hansen, S. Kauppinen, A.B. Kristensen, H.H. Nielsen, R.D. Nielsen & K. Pedersen 2019: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2018. – Fugleåret 2018: 140-167.
- SU-rapport 2019: Olsen, K., M.B. Hansen, S. Kauppi-

nen, A.B. Kristensen, A.O.W. Nielsen, H.H. Nielsen, R.D. Nielsen & T.E. Ortvad 2020: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2019. – Fugleåret 2019: 138-176.

- SU-rapport 2020: Olsen, K., S. Kauppinen, A.B. Kristensen, A.O.W. Nielsen, H.H. Nielsen, O. Nilsson & T.E. Ortvad 2021: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2020. – Fugleåret 2020: 117-161.

Rettelser og tilføjelser til tidligere publicerede fund

Corrections and additions to previously published records

- SU-rapport 1986-87: s. 85: Gåsegrib *Gyps fulvus* (1/1, 1/1, 1/1) 1986: 2/10, Dovns Klint, Langeland (F), Morten Müller via Esben Eriksen. Datoer, lokaliteter, adfærd og observatører skal være: 1/10, Hennemved (F), trk., *Ole Goldschmidt, Morten Müller, Oluf Lou. – 1-2/10, Gulstav og Keldsnor, Langeland (F), rst. og dernæst trk., Søren Bøgelund, Torbjørn Eriksen, Morten Müller (Foto). – 2/10, Dovns Klint, Langeland (F), trk.fors., Esben Eriksen, Henrik Knudsen m.fl.
- SU-rapport 1989: s. 31: Hvidvinget vidafinke *Euplectes procne*, 1989: 3/9, Skagen (NJ), han, Knud Pedersen m.fl. Bemærk, at videnskabeligt artsnavn er forkert, forekomstperiode er ændret og at fuglen i øvrigt blev ringmærket og kunne bestemmes til at være en kanelskuldret vidafinke, ssp. *eques*. Derfor skal fundoplysninger være: Hvidvinget vidafinke *Euplectes albonotatus*, ssp. *eques* (kanelskuldret vidafinke): 1989: 23/8-5/9, Skagen (NJ), han ringm., Knud Pedersen m.fl.
- SU-rapport 2003: s. 183: Østlig Bleg Gulbug *Hippolais pallida*, ssp. *elaieca* 2003: 1-2/6 (ringm. 1/6), Gedser Fyr (LF), 2K+, *Anders Zuschlag, *Jens Walsted Christoffersen m.fl. (Foto). Arts- og racebestemmelse er nu bekræftet ud fra en DNA-analyse. Derfor skal fundoplysninger være: Egyptisk Bleg Gulbug *Hippolais pallida*, ssp. *elaieca* 2003: 1-2/6 (ringm. 1/6), Gedser Fyr (LF), 2K+, *Anders Zuschlag, *Jens Walsted Christoffersen m.fl. (Foto & DNA).
- SU-rapport 2003: s. 183: Himalayasanger *Phylloscopus humei*, 2003: 24/11-2/12 (ringm. 29/11), Christiansø (B), 1K, *Mikkel Lausten m.fl. (Foto). Forekomstperiode skal være 24/11-3/12.
- SU-rapport 2008: s. 133: Rosenterne *Sterna dougallii*, 2008: 26/9, havet ud for Vestgrønland, N69.227744 & W57.80993, 1K, Marijke de Boer (Foto). – oktober, Niaqornat, 1K, Katrine Kruse (Foto). Opsummeringen er angivet som (0, 4/4, 2/2). Den skulle retteligt have været (0, 3/3, 2/2).
- SU-rapport 2018: s. 153: Kohejre *Bubulcus ibis*, 2018: 11-13/10, Skjern Enge (RK), 1K, Erik Enevoldsen, Alex Sand Frich, Ulf Eschou Møller m.fl. (Foto). – 23/11-31/12, Filsø (RB), 1K, *Steen Jørgensen, Jens Ballegård, Hanne Albertsen m.fl. (Foto). Alder er fejlagtigt angivet som 1K, men fundene skal være uden aldersangivelse: 11-13/10, Skjern Enge (RK), Erik Enevoldsen, Alex Sand Frich, Ulf Eschou Møller m.fl. (Foto). – 23/11-31/12, Filsø (RB), *Steen Jørgensen, Jens Ballegård, Hanne Albertsen m.fl. (Foto).
- SU-rapport 2019: s. 147: Brilleand *Melanitta perspicillata*, 2019: 6/1-17/3, Lumsås Nordstrand, 3K+ han,

*Kristian Bruus-Jensen m.fl. (Foto). Region skal være: 6/1-17/3, Lumsås Nordstrand (S), 3K+ han, *Kristian Bruus-Jensen m.fl. (Foto).

- SU-rapport 2019: s. 152: Rødvinget braksvalle *Glareola pratincola*, 2019: 13/6, Margrethe Kog (SJ), *Morten Bentzon Hansen m.fl. (Foto). Opsummeringen er angivet som (3/3, 15/15, 1/1). Den korrekte opsummering skal være (1/1, 15/15, 1/1).
- SU-rapport 2019: s. 160: Rødhovedet tornskade *Lanius senator*, 2019: 14-16/7, Tornby Klitplantage (NJ), 3K+ hun, *Svend Erik Frandsen m.fl. (Foto). – 27/7, Spidsbjerg Hede, Rømø (SJ), *Orla Hugger Jakobsen, Eigil Larsen (Foto). Opsummeringen er angivet som (2/2, 47/47, 2/2). Den korrekte opsummering skal være (2/2, 45/45, 2/2).
- SU-rapport 2020: s. 127: Amerikansk sortand *Melanitta americana*, 2020: 18-30/12, Asserbo Strand og Melby Strand (S), 2K+ han, *Jakob Engelhard (Foto og Video). Forekomstperiode skal være: 18-31/12.
- SU-rapport 2020: s. 127: Amerikansk sortand *Melanitta americana*, 2020: 19-21/12, Asserbo Strand og Melby Strand (S), 2K+ han, *Jakob Engelhard (Foto og Video). Forekomstperiode skal være: 19-31/12.
- SU-rapport 2020: s. 135: Dværghejre *Ixobrychus minutus*, 2020: 10-12/6, Hejresøen, Kalvebod Fælled (S), 2K han, syng., *John Larsen m.fl. (Foto & Lyd). Forekomstperiode skal være: 10-13/6.
- SU-rapport 2020: s. 137: Slangeørn *Circaetus gallicus*, 2020: 8/8, Trehøje & Fuglsø, Mols Bjerger (ÅH), 2K rst., senere trk., *Kent Olsen, *Niels Christian Bech Jensen, Morten D. D. Hansen m.fl. (Foto). Dato og observatører skal være: 2020: 8/7, Trehøje & Fuglsø, Mols Bjerger (ÅH), 2K rst., senere trk., *Kent Olsen, *Niels Kristian Bech Jensen, Morten D. D. Hansen m.fl. (Foto).
- SU-rapport 2020: s. 147: Iberisk sanger *Curruca iberiae*, 2011: 15-17/5, Bækbygaard Strand, Husby Klit (RK), 2K han, *Erik Enevoldsen, Jens Ballegård, Peter Lefrenz m.fl. (Foto & Video). Observatører skal være: 15-17/5, Bækbygaard Strand, Husby Klit (RK), 2K han, *Erik Enevoldsen, Jens Ballegård, Peter Lefrenz m.fl. (Foto & Video).
- SU-rapport 2020: s. 153: Hætteværling *Emberiza melanocephala*, 2020: 7/6, Hanstholm Fyrhave (NJ), han, Karl Kristensen m.fl. (Foto). Opsummeringen er angivet som (0, 29/30, 1/1). Den korrekte opsummering skal være (0, 30/30, 1/1).
- SU-rapport 2020: s. 154: Halsbåndstrolch x strolch *Aythya collaris* x *Aythya fusca*, 2020: 4+7/4, Halkær Sø (NJ), *Rune Sø Neergaard, Henrik Møller Thomsen (Foto og Video). Alder og køn skal være: 4+7/4, Halkær Sø (NJ), 3K+ han, *Rune Sø Neergaard, Henrik Møller Thomsen (Foto og Video).
- SU-rapport 2020: s. 156: Dværgfalk *Falco columbarius*, 2011: 18/7, Julianehåb, Vestgrønland, 2K+ hun, *Jari Helstola (Foto). Lokalitet skal være: 18/7, Qaqortoq, Vestgrønland, 2K+ hun, *Jari Helstola (Foto).



Gåsegrib, Norby Bakker, Samsø, 19. juni 2021. Foto: Kent Olsen