


Sjældne fugle på Færøerne i 1993-1996

SØREN SØRENSEN og JENS-KJELD JENSEN



(With a summary in English: Rare birds in the Faeroe Islands in 1993-1996)

Rapport nr 27 fra Sjældenhedsudvalget

Indledning

Denne rapport indeholder de sager, som Sjældenhedsudvalget (SU) har færdigbehandlet i perioden 1993-96. I alt er der godkendt 91 fund. De omfatter bl.a. seks nye arter, Knopsvane, Stellersand, Lille Skallesluger, Musvåge, Græshoppesanger og Stillits, samt en ny ynglefugl, Mudderklire.

Antallet af sager er desværre svagt faldende, først og fremmest på grund af en relativt ringe feltaktivitet på øerne og en beskeden tilgang af unge fugleinteresserede. Men et klart fremskridt har været opstillingen af en såkaldt helgolandsfælde på Nólsoy i 1994, som har medført en mere effektiv registrering af en række arter, hvilket faktisk kan læses af rapporten. Det er også positivt, at mange naturinteresserede fortsat henvender sig f.eks. ved fund af døde fugle, som de ikke umiddelbart kender.

Ved hvert fund er nævnt: 1) årstal og dato; 2) lokalitet og ø; 3) antal, hvis der er flere end én; 4) evt. alder/dragt, køn og tilstand ved fundet; 5) observatørs/finders initialer, som er forklaret i en oversigt til sidst. Følgende forkortelser er anvendt: ad. = adult (udfarvet, kønsmoden); imm. = immatur (ungfugl som har fældet sin første fjerdragt); juv. = juvenil (ungfugl i sin første fjerdragt); ringm. = ringmærket.

Efter artsnavnet er som noget nyt for Færø-rapporten angivet tre tal: (1) antal fund før 1979 (da en mere systematisk registrering af sjældenheder startede); (2) antal fund fra 1979-1992; (3) antal fund 1993-96. Bemærk, at antal fund ikke er identisk med antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider

samme dag regnes som fem enkeltfund. Et individ regnes som ét fund, også selv om fuglen optræder over en længere periode eller regelmæssigt vender tilbage til samme lokalitet, eventuelt over flere år.

Sagsbehandlingen foretages fortsat af DOFs sjældenhedsudvalg efter aftale med Føroya Fuglaførødifelag (FFFF). Kontaktperson for SU angående Færøerne er Jens-Kjeld Jensen. Indberetning af en sjældenhed bør omfatte oplysninger om omstændighederne for fundet, en grundig beskrivelse af fuglen(e), samt eventuel anden dokumentation, f.eks. fotos eller båndoptagelser. Den seneste Færø-liste, som også anfører de arter, der skal forelægges SU, er udgivet i 1996 og kan købes ved henvendelse til FFFF eller Føroya Náttúrugripasavn (Naturhistorisk Museum i Tórshavn).

Sidst i rapporten er anført sager, der ikke er godkendt. Antallet af disse "forkastede" sager har i en række år været meget lavt. Det skyldes ikke mindst, at de fleste sager bliver forelagt SU gennem Jens-Kjeld Jensen, som foretager den første vurdering. Det skal dog understreges, at henvendelser også kan ske direkte til SU i DOF.

Der skal rettes en tak til Marita Gulkleit, Kaj Kamp, Ivan Olsen og Palle A. F. Rasmussen, som har gennemlæst og kommenteret rapporten. Desuden takker vi personalet ved de zoologiske museer i henholdsvis København og Tring for hjælp og adgang til skindsamlingerne. Først og fremmest skal der dog være en stor tak til observatører og indsendere, der har skabt det nødvendige grundlag for rapporten.

Systematisk gennemgang af de godkendte sager
Accepted records

Lille Lappedykker *Tachybaptus ruficollis* Smågjør (3,2,1)

1993: 29.11, nær Klaksvík, Bordoy, ♀ fundet afkræftet i vejkant, SN.

Alle fund er fra oktober/november på nær et fra marts.

Toppet Lappedykker *Podiceps cristatus* Kambsgjör (1,0,1)

1993: 12. og 19.12, Toftavatn, Eysturoy, NK.
Eneste tidligere fund er fra februar 1952.

Rørdrum *Botaurus stellaris* Mækjuglámur (2,1,1)

1996: 12. og 18.1, Fugloy, ♂ fundet død 19.1, JC.

Silkehejre *Egretta garzetta* Silkihegri (0,1,3)

1993: 2.-3.12, Nólsoy bygd, Nólsoy, ♀ død i pleje, HJ m.fl.

1995: 20.5, Bill Baily Banka, ad. ♀ taget på fiskeskib, HL. – 18.10, Vágur, Suduroy, ad. ♀ taget i pleje og død, AP.

Første forekomst var i april 1988.



Knopsvane *Cygnus olor* Knubbasvanur (0,0,2)

1995: ca 25.5-22.6, Trongisvágur, Suduroy, flok på 12, efter 22.6 én fugl i yderligere nogle dage, BS m.fl.

1996: ca 15.1-1.2, Tórshavn, Streymoy, 2 afkræftet og herefter taget i pleje, JKJ og FC.

Arten har tidligere været indført og holdt i fangenskab, og ældre forekomster af fritlevende Knopsvaner, senest i 1960'erne, har mest sandsynligt haft relation til disse parkfugle. De to nye fund er de første, der godkendes som spontane.

[Mandarinand *Aix galericulata* Seglont] (3,2,1)

1996: 23-25.4, ved Midvágur, Vágur, 2 ♂♂, JHH, AS m.fl.

Alle de seks dokumenterede fund har været i april/maj, en regelmæssighed i forekomsten, som man måske ikke ville forvente af fugle, der har en oprindelse i fangenskab (se også Sørensen & Jensen 1994).

Taffeland *Aythya ferina* Hövudreyd Ont (4,1,4)

1993: 19.11-6.4.1994, Tórshavn, Streymoy, ♂, DB, PM, m.fl. – 29.11-7.12, Toftavatn, Eysturoy, 8 ♂♂ og 4 ♀♀, NK.

1994: 9.-11.12, Toftavatn, Eysturoy, 3 ♂, NK.

1996: ca 1.2., Vidareidi, Vidoy, ♂ fundet død, NJA.

Der er tale om en markant stigning i forekomsten. Bemærk ikke mindst flokken i 1993, som er den første på Færøerne.

Kongeederfugl *Somateria spectabilis* Ædukongur (-,4,1)

1994: 1.1-1.5, Morskranes, Eysturoy, ad. ♂, SB og NK.

1995: ca 1.1-6.3, Morskranes, Eysturoy, ad. ♂, MJu. – 6.5-8.5, Oyrargjógv, Vágur, ad. ♂, NK.

Fuglen ved Morskranes er med stor sandsynlighed samme individ, som lige siden 1979 har optrådt i en flok Ederfugle på lokaliteten i januar-maj. Den indgår derfor kun i sammentællingen for 1979.

Stellersand *Polysticta stelleri* Hövudhvít Æda (0,0,2)

1994: 13.4-30.5, Klaksvík, Bordoy, ad. ♂, AM, MKJ og NK.

1995: 12.5, Klaksvík, Bordoy, ad. ♂, MJ m.fl.

1996: 29.6, Sandur, Sandoy, 2K ♂, SvV og UM.
Ny art for Færøerne. Det er givetvis en og samme fugl, der er dokumenteret for ved Klaksvík i både 1994 og 1995, og den skal desuden være set på stedet i perioder i såvel efteråret 1994 som foråret 1995. Fuglen ved Sandoy var tydeligvis et nyt individ og dermed forekomst nummer to på Færøerne. På Island er der syv forekomster t.o.m. 1994.

Strømand *Histrionicus histrionicus* Brimont (0,6,0)

1994: 23.-27.4, Kirkjuböur, Streymoy, ad. ♂, PM m.fl.

1995: 23.4-20.5, Kirkjuböur, Streymoy, ad. ♂, EM, DB mfl.

1996: 11.5, Kirkjuböur, ad. ♂, JKJ m.fl.

Det antages, at det er det samme individ, der har optrådt på lokaliteten i forårsmånederne lige siden 1990, og måske er det også denne fugl, der blev set ved Tórshavn i både 1990 og 1991; i så fald er det opregnede antal for højt. I alle tilfældene har en Strømand han vist stor interesse for hunederfugl.

Lille Skallesluger *Mergus albellus* Maront (0,0,1)

1994: 13.-14.5, Vágseidi, Suduroy, ad. ♂, PM og RJ.

Første forekomst. På Island er den fundet otte gange t.o.m. 1994.

Stor Skallesluger *Mergus merganser* Tannont (6,8,5)

1993: 6.4-13.6, Toftavatn, Eysturoy, ad. ♂, NK, EM og JKJ. – 9.12-1.4, omkring Toftir, Eysturoy, ad. ♂ og fra januar/februar 1994 yderligere 2 ♀♀, NK.

1995: 17.-18.2, Skálabotnur, Eysturoy, 2 ad. ♂♂, NK. – 12.5, Skálabotnur, Eysturoy, ad. ♂, JKJ m.fl.

1996: 6.2-10.3, Nólsoy, ♀, JKJ.

Det opregnede totale antal omfatter både dokumenterede og udokumenterede fund. Langt fra alle observationer er dog indberettet, og arten må anses for at være stort set årligt forekommende på Færøerne, fordelt over hele året.

Havørn *Haliaeetus albicilla* Havørn (-,0,1)

1995: 9.-11.3, Hvítanes, SJ, JMM m.fl. og 20.3, Saksunardalur, Streymoy, imm., NK.

Fleire angivelser tyder på, at fuglen opholdt sig på Streymoy og nærmeste øer i det meste af februar/marts. Bl.a. viste en formodet Musvåge fra perioden sig ved fotodokumentation at være Havørnen. Det seneste dokumenterede fund er helt tilbage fra 1916.

Spurvehøg *Accipiter nisus* Spurvehøg (1,4,2)

1995: 28.2, Trongisvágur, Suduroy, MS og BH.

1996: ca 10.11, Sörvágur, Vágar, fundet nylig død, AH.

Der er hermed to vinterfund, mens de øvrige er fra trækperioderne forår og efterår.

Musvåge *Buteo buteo* Músvákur (0,0,1)

1994: 19.12, Oyrareingir, Streymoy, ad. ♀ fundet død, HIJ.

Det første fund på Færøerne – og tydeligvis en virkelig sjældenhed så langt til havs. På Island er arten ligeledes kun fundet en enkelt gang.

Fiskeørn *Pandion haliaetus* Fiskiörn (6,3,1)

1994: 29.5, Öravík, Suduroy, 3K ♀ fundet nylig død, JM.

Fuglen var ringmærket som redeunge i juli 1992 i Sjaunja, Lule Lapmark i Sverige.

Vagtel *Coturnix coturnix* Vaktill (-,-,2)

1994: 16.5, Klaksvík, Bordoy, ♀ fundet skadet og taget i pleje, EH. – 21.5, Lítla Vatn, Sandoy, ♂ trafikdræbt, HW.

Omstændighederne ved fundet af disse to skadede fugle er ikke typiske. Fra andre år er der bl.a. flere rede- og ungefund, senest i 1988-89 (Jensen & Kampp 1990).

Vandrikse *Rallus aquaticus* Jardarkona (-,10,3)

1994: 5.11, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ. – 7.11, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ.

1995: 27.-28.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ.

Alle tre fugle blev fanget i den nye helgolandsfælde, som står i en have i bygden (se også kommentar i Sørensen 1988).

Trane *Grus grus* Trani (4,6,1)

1995: 10.-20.3, Nólsoy, ♀ fundet død 21.3, KT, JKJ m.fl.

Dette er langt det tidligste fund. De fleste andre har været i maj/juni.

Stor Kobbersneppe *Limosa limosa* Reydspógvi

1994 og 1995: Sandoy, 1-2 par fundet ynglende i juni-juli, WM og HVC.

Første ynglefund i nyere tid. Arten er tidligere er fundet ynglende tre gange, senest i 1952 og ligeledes på Sandoy. Fuglene havde karakterer svarende til ssp. *islandica*.

Svaleklire *Tringa ochropus* Skógstelkur (1,0,1)

1996: 15.9, Lopra, Suduroy, DJJ.

Andet fund på Færøerne; det første var 26.5 1970.

Mudderklire *Actitis hypoleucos* Fjørustelkur (2,?,1)

1996: 14.-28.7, Saksun, Streymoy, ad. med dununge, SK, JKJ m.fl.

Det første ynglefund på Færøerne og det eneste kendte fund i den aktuelle 4-årsperiode. Efter ca 10 fund i begyndelsen af 1980'erne har arten ikke været på SU-listen, så det er et åbent spørgsmål om den er så sjælden, som de manglende indberetninger tyder på.



Rosenmåge *Rhodostethia rosea* Brandmási (4,1,1)

1996: ca 1.-9.3, Vestmanna, Streymoy, ad., LO, BO m.fl.

Den sidste forekomst var i marts 1959.

Polarlomvie *Uria lomvia* Íslandslomvigi (-,4,2)

1994: 4.7, imm. ♂ fundet dræbt, Seydortva, Vidoy, JKJ. – 21.11, Nólsoy havn, 1K ♂ skudt, MSK.

Arten er typisk fundet i forbindelse med jagt. Hyppigheden på Færøerne, for ikke at tale om den tidsmæssige fordeling, er dårligt kendt.

Turteldue *Streptopelia turtur* Turtuldúgva

Med karakterer svarende til ssp. *rufescens* (også benævnt ssp. *isabellina*) (0,0,1):

1987: 3.11, Tjørnuvík, Streymoy, ♂ taget i pleje og derefter død, TM.

Fuglen/skindet svarer i detaljer til en særdeles afvigende form i Egypten og det nordlige Sudan – en lille og meget rødbrun Turteldue (undersøgelse af 16 skind på Zoologisk Museum i Tring, England). Det er det første fund i Europa og dermed en af de mærkeligste forekomster på Færøerne nogensinde, så det kan ikke afvises, at den er kommet til Færøerne med menneskelig assistance på en eller anden måde. Men omstændighederne ved fundet støtter en spontan forekomst, idet det blev gjort allernordligst på Færøerne i en periode med andre fjern-sydøstlige gæster i Nordeuropa og med mange andre østlige fugle på Færøerne. Fugle af denne race er trækfugle, i det mindste i den nordlige del af udbredelsesområdet. Racen bør relativt nemt kunne bestemmes i felten, men den er dårligt eller slet ikke beskrevet i felthåndbøgerne. En ganske god, men dog lidt for lys afbildning findes på tavle 33 i Cramp (1985). Turtelduer af nominatracen ses årligt på Færøerne, og på Island er der hele 72 fund fra 1979-1993. Den mystiske Turteldue fra Tjørnuvík er desuden den hidtil seneste om efteråret på Færøerne.

Gøg *Cuculus canorus* Geykur (10,1,2)

1992: august, Sumba, Suduroy, 1K ♂ fundet død, SV.

1995: 13.7, Tórshavn, Streymoy, ♂ fundet død, MWP.

De fleste fund er fra forår og sommer, men tre er ungfugle fra august/september.

Dværghornugle *Otus scops* Lítil kattúla (1,0,1)

1995: 11.8, Húsavík, Sandoy, ♂ trafikdræbt, KSØ.

Det andet fund på Færøerne, idet det første var i maj 1954. På Island er arten truffet fem gange.

Hærfugl *Upupa epops* Herfuglur (6,1,1)

1993: 9.11, Klaksvík, Bordoy, ♀ fundet afkræftet og senere død, MO.

Tre af de otte fund er fra efteråret, men denne er den hidtil seneste. Troværdige forlydender melder om endnu en fugl på Suduroy 1.11 samme år.

Vendehals *Jynx torquilla* Snúdurkriki (12,4,1)

1992: 26.9, Sumba, Suduroy, fundet død, SV.

Af otte daterede fund fra dette århundrede er de syv fra september, hvilket svarer til forekomstmønsteret på Island.

Digesvale *Riparia riparia* Áarsvala (8,2,2)

1993: 16.5, Mykines, 4-5, PHH. – 13.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, JKJ.

Bysvale *Delichon urbica* Lonasvala

1996: juni-august, Mykines bygd, yngleforsøg, OJ m.fl.

En regelmæssig gæst, der tidligere har ynglet to gange.

Gul Vipstjert *Motacilla flava* Gulerla

Med karakterer svarende til ssp. *thumbergi* (1,0,1):

1993: 24.5, havet vest for Suduroy, fundet død på fiskebåd, MSK.

Det andet fund af den nordskandinaviske race. Almindeligst forekommende er ssp. *flava*, men desuden er den britiske *flavissima* fundet fire gange. SU tager kun stilling til fugle, der er bestemt til race.

Gærdesmutte *Troglodytes troglodytes* Músabródir

Med karakterer svarende til ssp. *troglodytes* (0,2,1):

1995: 20.-31.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ.

Hermed er en givetvis skandinavisk Gærdesmutte for tredje gang fanget på Nólsoy. De to første var i november 1989 og november 1990.

Blåhals *Luscinia svecica* Blákriki (2,6,1)

1993: 14.6, Munkagrúnnur in syd for Suduroy, ♂ fundet død på fiskebåd, KS.

Det hidtil seneste fund fra foråret. I alt fem fund er fra maj/juni og fire fra september.

Græshoppesanger *Locustella naevia* Urniljómarí (0,0,1)

1994: 9.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ.

En ny art for Færøerne, og en "fornem premieregæst" i den nyopstillede helgolandsfælde.

Kærsanger *Acrocephalus palustris* Fenljómari (0,1,1)

1995: 30.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ.

Første fund var i juli 1991. Færøerne har en helt anden fordeling mellem Kærsanger og Rørsanger (nedenfor) end Island: Kærsanger 2 og Rørsanger 19, mod Islands Kærsanger 8 og Rørsanger 8 (alle efterår). På Island har man for nylig foretaget en vurdering af fundene af de to arter (G. Pétursson in.litt.).

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus* Royljómari (2,6,11)

1993: 1.10, Tórshavn, Streymoy, taget i pleje og død, JD. – 2.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, 4 ringm., JKJ. – 5.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ. – 9.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, 2 ringm., JKJ. – Primo okt., Skopun, Sandoy, fundet død, RS.

1995: 5.7, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ. – 11.7, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ.

De i alt ni fugle fra oktober 1993 udgør næsten halvdelen af totalen på 19. De syv er fra månederne maj-juli (nogle af dem bestemt på sangen), mens resten er ringmærket eller fundet døde relativt sent på efteråret, mellem 17.9 og 22.10. Derudover er der flere gange set ikke-artsbestemte "Rørsanger-typer" i denne efterårsperiode.

Gulbug *Hippolais icterina* Gulljómar (0,2,2)

1996: 24.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ. – 15.8, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ.

De to første fund var 19.6.81 og 1.9.88.

Hvidbrynet Løvsanger *Phylloscopus inornatus* Nilksljómari (4,16,4)

1993: 23.9, Sandoyarbanka, død på fiskebåd, OS. – 2.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ. – 3.10, Frodba, Suduroy, ringm., WM.

1996: 3.11, Midvágur, Vágur, taget af kat, ES. De i alt 24 fund er fra 20.9 til 3.11, så fuglen fra 1996 er den hidtil seneste. Til sammenligning er der kun fundet én Fuglekongesanger *Phylloscopus proregulus*. På Island er dette forhold endnu mere udtalt, i alt 49 Hvidbrynede Løvsangere og ingen Fuglekongesanger t.o.m. 1994.

Lille Fluesnapper *Ficedula parva* Smánápur (1,3,1)

1995: 28.6, Nólsoy bygd, Nólsoy, ♀ ringm., JKJ.

De fire tidligere fund er alle fra september/oktober.

Pirol *Oriolus oriolus* Gyllingur (2,4,1)

1992: 1.6, Sumba, Suduroy, imm. ♂ fundet død, DPD.

En typisk forekomst, idet alle 7 fund er fra ult. maj til pri. juli.

Allike *Corvus monedula* Rókur

Med karakterer svarende til ssp. *spermologus*:

1995: 15.11, Tórshavn, 1K ♂ fundet død, DJ. De fleste færøske Alliker ligner den mørke, britiske *spermologus* (se også Sørensen & Jensen 1991 og Sørensen 1988). Kun Alliker, der forsøges bestemt til underart, skal forelægges SU.

Grønirisk *Carduelis chloris* Grönigda (12,0,2)

1994: ca 1.5, Hoyvík, Streymoy, BS. – 4.11, Suduroyarbanka sydøst for Suduroy, imm. ♂ død på fiskebåd, HN.

Sidste forekomst var i 1949, så to nye fugle inden for samme år er overraskende. De fleste tidligere fund er fra ult. september til december, men der er også et enkelt fra ult. april. Et lignende forekomstmønster findes også på f.eks. Shetland, hvor arten er en meget fåtallig trækgæst, sandsynligvis fra Norge (Thom 1986). Arten er aldrig truffet på Island.

Stillits *Carduelis carduelis* Fagurígda (0,0,1)

1993: 27.10, 40-60 sømil VNV for Streymoy, ad. ♂ fundet afkræftet på skib og senere død, via DB.

Ny art for Færøerne. Det nærmeste yngleområde er i Storbritannien, men på de nordskotske ørgrupper er den kun en fåtallig og sporadisk gæst, og den er aldrig fundet på Island (Thom 1986).

Karmindompap *Carpodacus erythrurus* Rodaígda (1,3,5)

1993: 2.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K ringm., JKJ.

1994: 6.-14.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., PHH og JKJ. – 12.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, 2 heraf 1 ringm., JKJ.

1995: 4.6, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ.

1996: 24.8, Nólsoy bygd, 1K ringm., JKJ. Fuglen 2.10.93 var mærket på Fair Isle 14 dage tidligere, hvilket styrker teorien om, at færøske efterårsfugle er på omvendt træk mod nordvest. I alt er der nu set syv fugle i tiden 22.8-2.10, og fra forårstrækket desuden tre 12.5-4.6. Den tydelige stigning i antallet af forekomster skyldes artens ekspansion i Nordvesteuropa samt en mere effektiv ringmærkning på Nólsoy siden 1994.

Dompap *Pyrrhula pyrrhula* Prýdisígda (2,6,-)

1991: marts/april, Klaksvík, ♂, EH og TT.

1994 og 1995: 21.10.94-16.5.95, stort set hele Færøerne, invasionsagtig forekomst: i alt 80-100 individer indberettet af mange observatører. Invasionen 1994-95 er dokumenteret for SU med en række fotos, og bl.a. blev der ringmærket fire fugle på Nólsoy. De indberettede fugle er derfor godkendt samlet, og ved vurdering af antallet er der forsøgt korrigeret for gengangere i materialet. De første to fugle under den helt usædvanlige invasion blev set på Nólsoy 21.10, samtidig med de første på Island (Tráinsson et al. 1995), mens invasionens start på Shetland blev registreret 19.10 (Shetland Bird Club Newsletter 99). Efter midten af november var der færre Dompapper på Færøerne, men småflokke og enlige blev set langt hen på foråret, til sidst især ved Tórshavn og Klaksvík. De sidste tre sås 16.5 i Klaksvík.

Forkastede sager**Records not accepted**

Hætteværling *Emberiza melanocephala* 1994: 9.5, Fuglafjörður, Eysturoy, ad. ♂.

Observatører

AH Arnjohn Hvitklett, AM Abraham Mikladal, AP Aksal Poulsen, AS Alf Sørensen, BH Borghild Hentze, BO Bergur Olsen, BS Bergur Stórhamar, BSi Bernhard Simonsen, DB Dorete Bloch, DJ Dánjal Jespersen, DJJ David J. Jutson, DPD Daniel Peter Djurhus, EH Eskil Hansen, EM Erik Mortensen, ES Eyðbjört Simonsen, FC Finn Clemensen, HIJ Hans Ib Jacobsen, HJ Hergeir Jacobsen, HL Helgi Laksafoss, HN Hans Niqlasen, HVC Henrik Vang Christensen, HW Henrik Warming, JC Jóannes Christensen, JD John Danielsen, JHH Jógván Helgi Hansen, JKK Jens-Kjeld Jensen, JM Jórún Mortensen, JMM Johan Marius MacDonald, KS Kent Skyt, KSø Kári Sørensen, KT Kjeld Thomsen, LO Leivur Olsen, MJ Mikkjál Joensen, MJu Morten Justesen, MO Martin Olsen, MS Martin Strøm, MSK Marner á Skúr, MWP Morten Winther Poulsen, NJA Nils Jákup Absalonsen, NK Nils Kristensen, OJ Oskar Joensen, OS Otto Sjóstein, PHH Petur Hans Hansen, PM Poul Magnussen, RJ Rógvi Johannesen, RS Rósing Skorá, SB Svenn Berg, SJ Símon Joensen, SK Sven Krosstein, SN Sigmar Nysted, SV Snæbjørn Vestergård, SvV Sven Vikstrand, TM Thora Magnussen, TT Thorstein Thomsen, UM Ulf Munthe, WM Willy Mardal.

Summary**Rare birds in the Faeroe Islands in 1993-1996**

In 1993-1996 the Danish Rarities Committee (Sjældnehedsudvalget/SU) accepted 91 records from the Faeroes. Six species were new to the Faeroese list: Mute Swan *Cygnus olor*, Steller's Eider *Polysticta stelleri* (2 records), Smew *Mergus albellus*, Common Buzzard *Buteo buteo*, Grasshopper Warbler *Locustella naevia*, and Goldfinch *Carduelis carduelis*. Second-time records were Great Crested Grebe *Podiceps cristatus*, Green Sandpiper *Tringa ochropus*, Eurasian Scops Owl *Otus scops*, and Marsh Warbler *Acrocephalus palustris*. A new sub-species, even to Europe, was "Egyptian" Turtle Dove *Streptopelia turtur rufescens*, with date, locality and

other circumstances suggesting a vagrant rather than an escape. The bird is preserved as a skin. New as a breeding species was Common Sandpiper *Actitis hypoleucos*.

The details given are 1) year and date, 2) locality and island, 3) number of birds if more than one, 4) sex if known, 5) other details, e.g. død = dead, ringm = ringed, 6) initials of observer(s). – The three numbers in brackets following the species name refer to the total number of records (not individuals) in the Faeroes before 1979, from 1979-1992, and from 1993-1996, respectively.

Referencer

- Cramp, S. (red.) 1985: The birds of the western Palearctic. Vol. 4. – Oxford University Press.
 Jensen, J.-K. & K. Kampp 1990: Vagtlén på Færøerne. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 84: 71.
 Sørensen, S. 1988: Sjældne fugle på Færøerne i 1986 og 1987. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: 101-108.
 Sørensen, S. & J.-K. Jensen 1994: Sjældne fugle på Færøerne i 1990, 1991 og 1992. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 88: 33-38.
 Thom, V. M. 1986: Birds in Scotland. – T. & A. D. Poyser, Calton.
 Tráinsson, G., G. Pétursson & E. Ólafsson 1995: Sjaldgæfir fuglar á Íslandi 1994. – Bliki 16: 11-45.

Antaget 29. januar 1998

Søren Sørensen
 Bratskovvej 1B, 1. th
 DK-2720 Vanløse

Jens-Kjeld Jensen
 FR-270 Nólsoy
 Færøerne