


KONGELUNDEN

1-1978



INSK ORNITHOLOGISK FORENING®



Kongelunden 1, 1978.1. januar - 30. juni 1978.

Til nærværende rapport er medtaget iagttagelser fra et område bestående af selve den 144 ha. store skov, de omgivende marker, frugtplantager og villahaver samt af stranden beliggende på den ca. 5 km lange strækning fra Det inddæmmede Areal i nordvest til Søvang i sydøst.

Som tidligere i tilsvarende rapporter er medtaget sjældnere iagttagelser, tidligste observationer, større rast- og træktal, og derudover er mere almindelige arters forekomst på lokaliteten behandlet i den udstrækning, iagttagelsesmaterialet har gjort dette muligt.

I hele perioden har der været så godt som daglige observationer - normalt af længere varighed.

I sæsonen er truffet i alt 197 fuglearter i området. Visse arter har optrådt talrigere end sædvanligt. Dette gælder således bl. a. rødben og alm. ryle i vintermånederne. Desuden klyde, pirol, nattergal og skovsanger. Derimod har det direkte registrerede forårstræk for de fleste arters vedkommende været af ret beskedent omfang.

Om vejret kan følgende oplysninger gives:

Januar havde skiftende vinde; temperaturer døgnet rundt nær frysepunktet; hyppig nedbør i form af såvel regn som sne.

Februar havde hovedsagelig østlige vinde; temperaturer for det meste omkring eller lidt under frysepunktet, dog en periode med strengere frost midt på måneden; en del sne.

Marts havde skiftende vinde; dagtemperaturer oftest omkring eller noget over frysepunktet bortset fra en seksdages periode omkring d. 20. med relativ streng frost; en del sne og regn.

April domineredes af østlige vinde; temperaturer sædvanligvis kun lidt over frysepunktet; megen sol og kun lidt nedbør.

Maj havde næsten udelukkende østlige vinde; først ret køligt men senere ret varmt; megen sol og kun lidt nedbør.

Juni havde skiftende vinde; først solrigt og varmt dog med en del regnbyger, men mod månedens slutning køligere med mere regn.

Materiale til rapporten er leveret af følgende personer, som alle takkes for bidraget: Lars Nørgaard Andersen (LNA), Robert T. Andersen (RTA), Tim Andersen (TA), Michael Bastian (MB), Svend Christoffersen (SC), Frank Desting (FD), Henrik Dissing (HD), Kaj Freyberg (KaF), H. P. Jensen (HPJ), Frank Jensen-Hammer (FJH), John H. Linderstrøm (JHL), Svend Aage Linderstrøm (SAL), Eyvind Malchow-Møller (EMM), Lars Nordbjærg (LN), Klaus Malling Olsen (KMO), Michael Poulsen (MP), Bent Bøggild Pedersen (BBP), Johnny L. Pedersen (JLP), Stig Kjærgaard Rasmussen (SKR), Mogens Thornberg (MT), Peter Triantafillou (PT) og Vagn Valentinussen (VV).

I rapporten er følgende forkortelser benyttet: Afl.= Aflandshage, Kl.= Kongelunden, Kls.= Kongelundsstranden, M.= markerne, frugtplantagerne og villahaverne omkring Kongelunden.

SORTSTRUBET LOM (*Gavia arctica*). To observationer bestemt til denne art: 6/3 1 trk. Ø. (SC), 18/3 1 trk. V. (SC, JLP, VV).

LOM SP. (*Gavia sp.*). Iagttagelserne udgøres af følgende: 4/2 1 trk. SØ. (LN), 18/3 1 Kls. (FJH), 8/4 1 trk. NV. (EMM), 15/4 2 trk. NØ. (LN), 27/5 3 trk. V. (SKR, VV).

TOPPET LAPPEDYKKER (*Podiceps cristatus*). Blot tre observationer: 1/4 1 trk. V. (SC, LN), 15/5 2 trk. Ø. (LN), 18/5 1 Kls. (HD).

LILLE LAPPEDYKKER (Tachybaptus ruficollis). Jan. - med. febr. normalt 1-5 rst. Kls., dog 5/2 8 Kls. (SC), 9/2 11 Kls. (JHL), 11/2 9 Kls. (SKR); ult. febr. - apr. lejlighedsvis 1-3 rst. Afl. Kls. Derefter blot følgende: 15/5 1 Kls. (JLP), 21/6 1 Kls. (JHL, SAL), 29/6 1 Kls. (PT).

SKARV (Phalacrocorax carbo). Jan. - pr. febr. hyppigt 110-230 rst. Afl.Kls.; med. og ult. febr. regelmæssigt 20-80 og undtagelsesvis indtil 170; marts - apr. sædvanligvis 100-185, dog 5/4 222 (SC), 16/4 400 (PT); pr. og med. maj jævnlige 40-60, dog aftagende antal mod periodens slutning; ult. maj - juni lejlighedsvis 1-6. Kun få trækobservationer.

FISKEHEJRE (Ardea cinerea). Jan. - med. apr. regelmæssigt 1-5 og lejlighedsvis indtil 11 rst. Afl.Kls.; ult. apr. ingen; maj - juni enkelte gange 1-2 rst. Afl.Kls. I alt 13 trk. i perioden pr. marts - med. apr. Fra returtrækket: med. juni 1, ult. juni 2.

RØRDRUM (Botaurus stellaris). Enkelte observationer - utvivlsomt af samme fugl: 25/2 1 Afl. (JLP), 26/2 1 Afl. (SC), 1/3 1 Afl. (SC), 19/3 1 Afl. (SC), 21/3 1 Afl. (SC).

KNOPSVANE (Cygnus olor). Regelmæssigt rst. Afl.Kls. i hele perioden, men i vekslende antal: jan. 60-160, febr. 100-200, marts 100-270, pr. og med. apr. 80-320, ult. apr. - maj 20-200, juni 30-100. 1 par ynglende "Tanghjørnet" Kls. (4 pull.). Næsten ingen trækobservationer.

SANGSVANE (Cygnus cygnus). Jan. - marts regelmæssigt 1-7 rst. Afl.Kls., dog 16/1 10 Afl. (SC), 19/2 18 ad. 7 juv. Afl.Kls. (SC, LN). Trækiagttagelser: 2/1 2 ad. (SC), 5/1 2 ad. 2 juv. (SC), 6/1 7 ad. (SC), 13/1 2 (SC), 1/2 4 (SC), 21/2 2 ad. 2 juv. (SC), 22/2 2 ad. 2 juv. (SC), 28/2 7 (SC), 6/3 4 (SC), 10/3 4 (SC), 12/3 2 ad. (SKR), 9/4 3 ad. (LN,SKR), 10/4 1 (SC) - i alt 48. Trækket hidrørende fra de 7 første observationer gik i vestlig retning, medens det øvrige træk gik i østlig retning.

PIBESVANE (Cygnus bewickii). To observationer: 7/4 1 ad. 1 juv. Afl. (SC), 9/4 2 ad. 9 juv. trk. SØ. (LN,SKR,VV).

GRÅGÅS (Anser anser). Tidligste iagttagelser: 19/2 2 trk. V. (SC, LN), 21/2 4 Afl. (SC). Ult. febr. regelmæssigt 1-12 rst. Afl.Kls.; marts - med. apr. indtil 36; ult. apr. - med. maj sædvanligvis 1-6 lejlighedsvis indtil 45; ult. maj og pr. juni 1-2; ingen med. juni; ult. juni 1-6. Trækiagttagelser: med. febr. 2, pr. marts 79, med. marts 4, pr. apr. 12, med. apr. 18, ult. apr. 5, pr. maj 5, med. maj 56, ult. maj 14, med. juni 2, ult. juni 7 - i alt 204, hvoraf fuglene fra med. maj og perioden ud hovedsageligt hidrører fra vestgående træk (returtræk).

BLISGÅS (Anser albifrons). Halvårets observationer udgøres af: 15/1 1 Kls. (JLP), 20/1 - 25/1 1 juv. Afl. (RTA,SC), 29/1 6 Kls. (SKR).

SÆDGÅS (Anser fabalis). En del observationer: 13/1 3 trk. (FJH), 15/2 15 Afl. (SC), 16/2 117 trk. SV. (SC), 17/2 11 trk. V. (SC), 19/2 5 trk. SØ. 15 trk. SV. 22 trk. V. (SC, LN), 21/2 11 trk. NØ. (SC), 26/2 7 trk. Ø./SØ. (SC, LN), 6/3 36 trk. Ø. (SC, VV), 12/3 47 trk. Ø./NØ. (SC, LN, SKR), 18/3 3 trk. (SKR), 30/3 5 trk. (SKR), 5/4 16 trk. Ø. (SC).

KNORTEGÅS (Branta bernicla). Et par enkelte observationer: 5/4 575 trk. Ø. (SC), 28/5 150 trk. Ø. (BBP).

BRAMGÅS (Branta leucopsis). 3/5 108 trk. (HPJ) er sæsonens eneste.

KANADAGÅS (*Branta canadensis*). Atter en del: 29/1 - 24/2 11-16 Afl.Kls. (SC,JLP,SKR), dog 19/2 24 Afl.Kls. (SC,LN), 20/2 20 Afl. (SC). Endvidere: 26/2 20 Afl. 7 Kls. (SC,EMM,JLP,SKR). Fra pr. marts følgende: 2/3 2 Afl. (SC,VV), 6/3 2 Afl. (VV), 7/3 13 trk. N (LN).

GRAVAND (*Tadorna tadorna*). Jan.-iagttagelser: 3/1 1 Afl. (SC), 4/1 2 Afl. (SC), 6/1 1 Afl. (SC), 13/1 1 Afl. (SC), 26/1 2 Afl. (SC), 27/1 2 Afl. (SC), 28/1 2 Afl. (SC,VV), 29/1 6 Afl.Kls. (SC, LN), 30/1 6 Afl. (SC), 31/1 12 Afl. (SC). Febr. rst.-antallet stigende til 60 Afl.Kls.; pr. marts 80-115; med. marts 140-250; ult. marts 100-160; apr. - maj 60-135, dog 18/5 194 Kls. (HD); juni 30-80. Trækiagttagelser alene fra returtrækket, som indledtes 28/5 27 trk. V. (BBP).

GRÅAND (*Anas platyrhynchos*). Regelmæssigt rst. Afl.Kls. i hele perioden: jan. - pr. febr. indtil 60, dog 13/1 120 Kls. (FJH); med. og ult. febr. oftest 100-250, dog 18/2 430 Afl.Kls. (SKR), 19/2 355 Afl. (SC), 20/2 500 Afl. (SC), 22/2 600 Afl. (SC), marts 65-160 dog 21/3 230 Afl. (SC); apr. hyppigst 20-70; maj 5-30; juni antallet stigende til 175. Intet træk registreret.

KRIKAND (*Anas crecca*). Tidligste observationer: 6/3 4 Kls. (VV), 7/3 8 Afl. (SC). Med. marts - apr. regelmæssigt 15-140 rst. Afl. Kls.; maj - juni hyppigt 1-22. Trækiagttagelser: 1/4 15 (SC), 2/4 55 (SC,VV).

KNARAND (*Anas strepera*). 14/3 - 1/5 næsten daglige observationer af 1 par - fortrinsvis Afl. (RTA,MB,SC,JHL,SAL,LN,KMO,JLP,SKR,MT, VV). 10/4 - 12/4 yderligere 1 han iagttaget Afl. (SC). Endvidere følgende observationer: 3/6 1 hun Afl. (SC,VV), 5/6 1 han Afl. (SC).

PIBEAND (*Anas penelope*). Første iagttagelser: 15/2 1 han Afl. (SC), 16/2 11 Afl. (SC). Med. febr. - pr. marts jævnlgt 1-15 rst. Afl.Kls.; med. marts - apr. regelmæssigt 10-80, dog 18/4 365 Afl. (SC); maj - juni lejlighedsvis 2-8. Trækiagttagelser: 26/2 4 (SC), 5/3 40 (LN,SKR), 12/3 4 (SKR), 18/3 26 (SKR), 24/3 18 (LN), 25/3 20 (LN), 30/3 1 (SKR), 31/3 51 (SC), 1/4 19 (SC,VV), 2/4 21 (SC), 29/6 2 (PT).

SPIDSAND (*Anas acuta*). Første iagttagelser: 5/3 2 trk. (LN,SKR), 7/3 2 Afl.Kls. (SC,VV). Marts - pr. maj af og til 2-6 rst. Afl. Kls.; 18/5 1 han Kls. (MP), 30/5 1 par Kls. (BBP); ult. juni enkelte dage 2-5. Udover ovennævnte kun følgende trækiagttagelse: 2/4 8 (SC,VV).

SKEAND (*Anas clypeata*). Første iagttagelser ret sene: 1/4 4 Afl. (SC,LN,JLP,VV), 2/4 2 Afl.Kls. (SC,JHL,SAL,SKR). Apr. regelmæssigt 2-8 rst. Afl.Kls.; pr. og med. maj lejlighedsvis 2-4; ult. maj - juni af og til 1-11.

TAFFELAND (*Aythya ferina*). Sæsonens eneste observation: 20/5 4 Kls. (BBP).

TROLDAND (*Aythya fuligula*). Jan. - febr. hyppige iagttagelser af 1-15 rst. Afl.Kls., dog 19/2 530 Afl.Kls. (SC,LN); marts - pr. apr. normalt 15-70; med. apr. - med. maj jævnlgt 1-6, dog 21/4 23 Kls. (SAL), 28/4 22 Kls. (JHL), 1/5 30 Kls. (PT); med. og ult. juni 1-2. Enkelte trækobservationer: 7/3 60 (SC), 2/4 9 (SC).

BJERGAND (*Aythya marila*). Kun en enkelt observation: 25/3 1 hun Kls. (LN).

HVINAND (Bucephala clangula). Jan. - marts normalt 10-50 rst. Afl. Kls., dog 19/2 265 Afl. Kls. (SC, LN); pr. og med. apr. regelmæssigt 1-10, undtagelsesvis flere: 3/4 25 Afl. (SC). Fra med. maj - juni følgende: 11/5 2 Kls. (SKR), 27/6 6 Kls. 11 trk. V. (FJH), 28/6 1 Afl. (SC).

HAVLIT (Clangula hyemalis). Følgende observationer er indberettede: 27/1 1 hun Afl. (SC), 28/1 1 han 1 hun Kls. (JLP), 29/1 19 Kls. (LN, SKR), 5/2 15 Kls. (LN), 18/2 5 Kls. (JLP), 11/3 1 hun Kls. (LN), 1/4 12 Kls. (LN), 30/3 - 16/4 1 hun Kls. (SC, LN, JLP, SKR, MT, VV).

FLØJLSAND (Melanitta fusca). To observationer: 5/1 2 Afl. (SC), 7/3 1 trk. V. (SC).

SORTAND (Melanitta nigra). Kun én observation: 11/3 2 hanner Kls. (LN).

EDERFUGL (Somateria mollissima). Jan. - pr. apr. regelmæssigt indtil 50 rst. Afl. Kls.; med. apr. - pr. maj normalt 10-50, men lejlighedsvis 100-145; med. maj - juni 100-2100, heraf indtil 820 pull. Første pull. noteret 10/5. Samlede træktaal fra foråret: ult. febr. 15, pr. marts 113, med. marts 524, ult. marts 3976, pr. apr. 3258, med. apr. 256, ult. apr. 7 - i alt 8149 - flest 15/3 208 (SC), 24/3 299 (SC, LN), 25/3 2217 (SC, LN), 26/3 489 (LN), 30/3 913 (SC, SKR), 9/4 1225 (SC, LN, SKR, VV), 10/4 1502 (SC), i øvrigt under 200 pr. dag. Returtrækket indledtes 18/6 130 trk. (LN).

KONGEEDERFUGL (Somateria spectabilis). 23/4 1 ad. han Afl. (MB). Beskrivelse er tilsendt SU.

STOR SKALLESLUGER (Mergus merganser). Jan. - pr. apr. lejlighedsvis observationer af 1-2 rst. Afl. Kls., undtagelsesvis flere: 19/2 18 Afl. (SC), 25/2 7 Kls. (JLP), 4/3 16 Kls. (JLP), 5/3 25 Kls. (LN, JLP, SKR), 24/3 5 Kls. (HPJ). Desuden: 17/5 1 hun Kls. (BBP). En del trækobservationer: 15/1 1 V. (SC), 26/1 3 V. (FJH), 26/2 5 Ø. (SC, SKR), 5/3 7 Ø. (SKR), 6/3 3 Ø. (SC), 7/3 2 Ø. (SC), 18/3 9 V. (SKR), 19/3 15 V. (FJH), 22/3 2 (JHL, SAL), 2/4 6 Ø. (SC, SKR, VV), 3/4 2 Ø. (SC), 8/4 1 (SAL), 16/4 2 Ø. (SC, PT) - i alt 63 trk.

TOPPET SKALLESLUGER (Mergus serrator). Regelmæssigt rst. Afl. Kls. i hele perioden: jan. - pr. marts 1-40; med. og ult. marts 30-75; apr. oftest 100-330, dog 8/4 435 Kls. (LN); maj hyppigst 100-440, dog 15/5 695 Afl. Kls. (LN, BBP, SKR), 21/5 500 Kls. (LN); juni normalt 10-110, dog 28/6 235 Afl. (SC).

MUSVÅGE (Buteo buteo). Jan. - med. maj regelmæssigt 1-2 eventuelt 3-5 rst. Afl. Kl. Kls. M.; ult. maj - juni enkelte dage 1-2 rst. Kl. Kls. Trækiagttagelser: med. febr. 2, pr. marts 86, med. marts 402, ult. marts 32, pr. apr. 39, med. apr. 19, pr. maj 1 - i alt 581 - flest 6/3 63 (SC, VV), 12/3 88 (LN, SKR), 18/3 275 (SC, FJH, VV), 8/4 34 (LN, EMM), i øvrigt under 25 pr. dag.

FJELDVÅGE (Buteo lagopus). Jan. - med. apr. lejlighedsvis 1-2 rst. Afl. Kls. M., dog 18/3 4 Kls. (FJH). Desuden: 15/5 1 M. (BBP). Kun få trækobservationer: 7/3 3 (SC), 9/3 2 (SC), 18/3 3 (FJH), 27/3 18 (KaF), 17/4 1 (SC) - i alt 27.

RØD GLENTE (Milvus milvus). Dette halvår to iagttagelsesdage: 5/3 1 trk. Ø. Kls. (LN, SKR), 12/3 2 trk. Ø. Kls. (LN, SKR).

SORT GLENTE (Milvus migrans). 23/4 1 trk. Ø. (MB).

HAVØRN (Haliaeetus albicilla). 6/3 1 trk. S./Ø. Afl. (SC, VV), 7/3 1 subad. trk. Ø. efter rst. Kls. (LN). Vel samme fugl de to dage!

HVEPSEVÅGE (Pernis apivorus). Første iagttagelser: 13/5 2 trk. (PT), 18/5 7 trk. (HD,MP). Kun følgende rst.-iagttagelser: 29/5 2 Kl. (HPJ), 30/5 1 Kl. (SKR). Samlede træktaal: med. maj⁷⁸, ult. maj 17, pr. juni 2, ult. juni 2 - i alt 29 - flest 27/5 14 (LN).

RØRHØG (Circus aeruginosus). Få observationer: 11/3 1 han trk. NV. (LN), 2/4 1 hun trk. Ø. (SC), 3/4 1 hun trk. (SC), 8/4 1 hun trk. (VV), 21/4 1 han trk. (HPJ), 24/4 1 han Afl. (MB), 25/4 1 hun Kls. (VV), 18/5 1 hun/juv. Kls. (HD), 27/5 1 ad. hun Kls. (SKR,VV), 1/6 1 hun trk. SV. (LN,SKR). Første iagttagelse er bemærkelsesværdig tidlig.

BLÅ KÆRHØG (Circus cyaneus). Jan. - pr. apr. regelmæssigt 1-4 (2 ad. hanner 2 hunner/juv.) rst. Afl.Kls., med. apr. - pr. maj enkelte dage 1 hun/juv. Få trækobservationer: 6/3 1 ad. han 2 hunner/juv. (SC,VV), 7/3 1 ad. han (SC), 11/3 2 ad. hanner 1 hun/juv. (SC,JLP), 18/3 1 ad. han 5 hunner/juv. (SC,SKR,VV), 9/4 1 ad. han 2 hunner/juv. (SKR,VV), 16/4 1 hun/juv. (VV), 17/4 1 hun/juv. (SC), 21/4 1 ad. han (VV) - i alt 19.

DUEHØG (Accipiter gentilis). Ult. jan. - pr. apr. af og til iagttagelser af 1 han og 1 hun, fortrinsvis Afl. Følgende trækobservationer foreligger: 11/3 1 (SAL), 18/3 5 (SC,FJH), 27/3 1 hun (LN), 19/4 1 (SC).

SPURVEHØG (Accipiter nisus). Gennem hele perioden jævnlige iagttagelser af 1-2 rst. Afl.Kls.Kl.M., dog 16/4 3 Kls. (PT). Trækiagttagelser: ult. febr. 1, pr. marts 3, med. marts 2, ult. marts 3, pr. apr. 10, med. apr. 30, ult. apr. 1, med. maj 1 - i alt 51 - flest 16/4 11 (SC, LN, PT, VV).

FISKEØRN (Pandion haliaetus). Ret få iagttagelser - alle af trk. fugle: 2/4 1 (SC), 8/4 4 (SAL,EMM, LN), 9/4 1 (SC), 12/4 1 (SC), 16/4 2 (SC, LN, PT, VV), 21/4 1 (SAL), 22/4 1 (JLP), 28/5 1 (KaF) - i alt 12.

LÆRKEFALK (Falco subbuteo). Enkelte observationer foreligger: 4/5 1 Kl. (MB), 7/5 1 Kl. (VV), 28/5 1 Kl. (JLP), 26/6 1 ad. Kl. (BBP). Sidstnævnte er uden for artens normale forekomstperiode.

DVERGFALK (Falco columbarius). Jan. - febr. lejlighedsvis 1 rst. Afl.Kls.; marts - pr. apr. regelmæssigt 1. Fra øvrige del af halvåret følgende: 22/4 1 Kls. (JLP), 4/5 1 M. (SKR,VV). En trækobservation: 7/3 1 (SC,VV).

TÅRNFALK (Falco tinnunculus). I hele perioden regelmæssigt 1-5 rst. Afl.Kls.Kl.M. Blot følgende trækobservationer: 31/3 1 (SC), 2/4 1 (VV), 10/4 2 (SC), 11/4 2 (SC).

AGERHØNE (Perdix perdix). Jan. - apr. regelmæssigt indtil 12 Afl. Kls., dog 15/1 16 Kls. (JHL,SAL), 11/2 20 Afl. (JLP), 18/2 22 Afl. (VV). Maj - juni 3 par Afl. 2 par Kls. 1 par M.

TRANE (Grus grus). 31/3 3 trk. NV. efter rst. Afl. i perioden 26/3 - 31/3 (RTA,SC,VV). Endvidere følgende observationer: 7/4 1 trk. V. (SC), 16/4 4 trk. NØ. (SC), 19/4 4 trk. Ø. (SC), 21/4 250 trk. NØ. (SAL), 1/5 26 trk. N. (JLP,PT,VV), 19/6 10 trk. SSV. (SC), 27/6 2 trk. SV. efter kortvarig rst. Afl. (SC).

VANDRIKSE (Rallus aquaticus). Enkelte iagttagelser delvis fra yngletiden: 1/5 1 Kls. (VV), 10/5 1 Kls. (VV), 12/5 1 Kls. (MB), 15/5 1 Kls. (LN), 20/6 2 Kls. (LN).

GRØNBENET RØRHØNE (Gallinula chloropus). Fra jan. - marts følgende registreret: 8/1 1 Kls. (LN), 26/1 1 Kls. (FJH), 28/1 1 Kls. (LN). Apr. - juni af og til 1-2 truffet 3-4 forskellige steder Afl.Kls.Kl.

BLISHØNE (Fulica atra). Mange overvintrende. Jan. - pr. apr. regelmæssigt 500-700 rst. Afl.Kls., dog 18/2 775 (SKR), 19/2 800 (LN), 19/3 1030 (SKR,VV), 30/3 900 (SKR); med. og ult. apr. normalt 300-400; maj - juni 50-70. Ynglepar: 2-4 Afl. 6-7 Kls.

STRANDSKADE (Haematopus ostralegus). Ingen iagttagelser af overvintrende fugle. De første på optrækket: 26/2 8 trk. Ø. (SC,FJH, JLP,SKR), 27/2 2 trk. Ø. (SC). I perioden herefter jævnt stigende antal til kulmination med. og ult. marts, således: 18/3 75 Afl. 230 Kls. (SC,JLP,SKR), 19/3 50 Afl. 200 Kls. (SC,SKR,VV), 22/3 240 Kls. (LN). Pr. apr. regelmæssigt 150-180 rst. Afl.Kls., dog 8/4 248 Kls. (SAL); med. apr. - juni regelmæssigt 50-100, dog 28/5 118 Kls. (BBP), 30/5 167 Kls. (BBP). Bortset fra 19/3 271 trk. V. (SC, FJH,JLP,SKR,VV) kun små traktal fra foråret. Returtrækket indledt pr. juni: 9/6 3 trk. (SC). Ynglepar: 5-10 Afl. 2-5 Kls.

VIBE (Vanellus vanellus). Første iagttagelser: 25/2 6 Afl. (SC), 26/2 1 Afl. 4 Kls. 1 trk. (SC,LN,SKR). I løbet af pr. marts hurtigt stigende rst.-antal; med. marts - apr. 50-80 Afl. 50-85 Kls.; maj - juni 50-60 Afl. 40-60 Kls. Lejlighedsvis flere: 18/3 100 Afl. 170 Kls. (SC,SKR), 1/4 150 Afl. (SKR), 27/5 100 Afl. (SKR). Ynglepar: 25-30 Afl. 22 Kls. Trækiagttagelser: ult. febr. 1, pr. marts 431, med. marts 662, ult. marts 45, pr. apr. 9, med. apr. 2, pr. maj 4 - i alt 1154 - flest 5/3 226 (LN,SKR), 9/3 125 (SC), 18/3 404 (FJH,SKR), 19/3 169 (FJH,SKR), i øvrigt under 100 pr. dag. Returtrækket påbegyndt med. juni: 11/6 27 trk. (BBP).

STOR PRÆSTEKRAVE (Charadrius hiaticula). Første iagttagelser: 25/2 3 Afl. (SC,VV) 16 Kls. (JLP), 26/2 4 Afl. (SC) 15 Kls. (EMM, SKR). Jævnt stigende rst.-antal i løbet af pr. marts. Med. marts - juni regelmæssigt rst. 30-60 Afl. 30-40 Kls. Ynglepar: 25-30 Afl. 16-20 Kls. Returtrækket indledt ult. juni: 27/6 2 (FJH).

LILLE PRÆSTEKRAVE (Charadrius dubius). Tre iagttagelser i indeværende halvår: 12/5 1 Kls. (MB), 20/5 1 Kls. (LN,BBP,VV), 27/5 1 Kls. (SKR).

HVIDBRYSTET PRÆSTEKRAVE (Charadrius alexandrinus). Apr. - maj følgende observationer: 23/4 1 han Afl. (MB), 12/5 1 Afl. (MB). Dernæst: 17/6 1 par Afl. (SC). Parret observeret måneden ud Afl. (SC, JLP,SKR) og ynglede her, idet 3 pull. sås pr. juli (SC), men såvel ungerne som de gamle fugle forsvandt få dage senere.

STRANDHJEJLE (Pluvialis squatarola). Følgende observationer - alle fra maj - juni: 1/5 2 ad. Kls. (SKR), 11/5 2 Kls. (MP), 15/5 2 ad. Kls. (LN,JLP,BBP,SKR,VV), 27/5 1 ad. Afl. (JLP,SKR), 2/6 2 Afl. (SC), 3/6 1 Afl. (SC,VV), 16/6 2 trk. SØ. (SC), 18/6 5 trk. SØ. (SC), 24/6 1 subad. Kls. (TA,SKR), 26/6 1 trk. (FJH).

HJEJLE (Pluvialis apricaria). Observationer spredt over en længere periode foreligger: 4/3 1 Afl. (JLP), 5/3 1 Afl. (JLP) 2 trk. (SKR), 12/3 1 Afl. (JLP), 18/3 40 trk. V. (SC,JLP,SKR,VV), 26/3 3 Afl. (RTA), 27/3 1 Afl. (SC), 28/3 5 Afl. (SC), 29/3 3 trk. Ø.(SC), 30/3 1 Afl. (VV), 8/5 1 trk. (JHL), 11/5 1 Kls. (MP,SKR), 15/5 1 ad. Kls. (BBP,JLP,SKR), 20/6 1 trk. (LN), 28/6 4 trk. (FJH).

STENVENDER (Arenaria interpres). Et par vinterobservationer foreligger: 14/2 2 Afl. (SC), 26/2 1 Afl. (SC). Dernæst: 23/4 1 Afl. (MB). 29/4 - 18/5 regelmæssigt 1-5 rst. Afl.Kls., dog 9/5 13 Kls. (HPJ), 12/5 8 Kls. (MB), 15/5 10 Kls. (LN,BBP,JLP,SKR). Derefter følgende: 28/5 1 Kls. (LN), 5/6 - 9/6 1 Afl. (SC).

ENKELTBEEKKASIN (Limnocryptes minimus). Blot tre observationer: 26/1 1 Afl. (SC), 8/2 1 Afl. (SC), 23/4 1 Kls. (MB).

DOBBELTBEEKKASIN (Gallinago gallinago). Jan. - febr. kun få observationer: 7/1 1 Afl. (JLP), 13/1 2 Afl. (SC), 14/1 1 Afl. 2 Kls. (SC, LN, JLP, VV), 15/1 1 Kls. (JLP), 5/2 2 Afl. (JLP), 6/2 2 Afl. (SC), 8/2 2 Afl. (SC), 9/2 1 Afl. (SC). I øvrigt meget ringe antal registreret. Ult. marts - med. maj regelmæssigt 1-4 rst. Afl.Kls. Ingen observationer i perioden ult. maj og pr. juni. Med. og ult. juni lejlighedsvis 1-5 rst. Afl.Kls.

SKOVSNEPPE (Scolopax rusticola). Følgende observationer rapporteret: 12/2 1 Kl. (SC), 18/3 1 Afl. (JLP, SKR), 22/3 1 M. (LN), 25/3 1 Kl. (LN), 26/3 1 Kl. (LN), 5/6 1 Kl. (BBP).

STOR REGNSPOVE (Numenius arquata). Første observationer: 18/3 2 Afl. (SC, VV), 24/3 1 trk. (LN). Ult. marts - pr. maj hyppigt 1-5 rst. Afl.Kls. Fra pr. juni følgende: 4/6 2 Afl. (SC), 6/6 1 Afl. (SC). Dernæst: 19/6 25 trk. (SC, FJH). I resten af juni mange trk., men blot et par rst.-iagttagelser: 28/6 7 Kls. (FJH), 29/6 1 Kls. (FJH). Fra perioden ult. marts - pr. maj i alt 88 trk., hvoraf 26/4 51 (SC, HPJ), 30/4 16 (SC).

LILLE REGNSPOVE (Numenius phaeopus). En del observationer fra forårstrækket: 22/4 85 trk. Ø. (JLP), 29/4 4 trk. (LN), 30/4 1 Kls. (LN), 2/5 2 trk. (HPJ), 4/5 1 Kls. 1 trk. (SKR, VV), 5/5 1 Afl. (JLP), 6/5 1 Kls. (SAL), 10/5 30 trk. (HPJ), 11/5 15 trk. (SKR), 12/5 2 Kls. 1 trk. (MB), 15/5 1 Afl.Kls. 10 trk. (LN, BBP, SKR), 18/5 7 Kls. (HD). Fra nedtrækket følgende: 27/6 1 trk. (FJH), 28/6 1 trk. (SKR), 29/6 8 trk. (SC, FJH), 30/6 7 trk. (FJH).

STOR KOBBERSNEPPE (Limosa limosa). 30/3 1 Kls. (SKR) udgør sæsonens eneste observation.

LILLE KOBBERSNEPPE (Limosa lapponica). Første iagttagelser tidlige: 9/3 1 Afl. (SC), 18/3 2 Afl. (SC, JLP, SKR). Ult. marts - med. maj jævnligt observationer af 1-4 rst. Afl.Kls. Hertil kommer: 15/5 12 Kls. (VV). Kun få trk.: 2/4 1 (JHL, SAL), 9/4 1 (LN, SKR), 22/4 1 (VV), 30/4 21 (SC). Fra returtrækket foreligger følgende: 27/6 1 trk. (FJH), 30/6 2 trk. (FJH).

SVALEKLIRE (Tringa ochropus). Forårstrækket er gået ret ubemærket hen over lokaliteten, idet kun følgende observationer er rapporteret: 6/4 1 Afl. (VV) 1 Kls. (SKR), 23/4 1 Kls. (MB), 27/4 1 Kls. (VV), 28/4 1 Kls. (VV), 12/5 1 Kls. (MB). Første iagttagelser fra returtrækket: 11/6 2-3 Afl. (RTA) 1 Kls. (BBP), 19/6 1 Afl. (SC). Ult. juni regelmæssigt 1-4 rst. Afl.Kls., undtagelsesvis flere: 25/6 7 Kls. (SKR).

TINKSMED (Tringa glareola). Et yderst beskedent antal observationer fra forårstrækket antagelig fordi Koføeds enge var næsten helt tørlagte i maj. 4/5 3 trk. N. (SKR), 6/5 4 Kls. (SKR, VV), 11/5 2 Kls. (SKR), 12/5 4 Kls. (MB). Første iagttagelse fra returtrækket: 23/6 1 Kls. (LN). I den resterende del af juni regelmæssigt rst. Afl.Kls., men i vekslende antal, flest 24/6 40 Afl.Kls. (FJH, LN, JLP, SKR), 25/6 54 Afl.Kls. (SC, LN, JLP, SKR).

RØDBEN (Tringa totanus). Mange overvintrende. Jan. hyppigst 10-30 rst. Afl.Kls., men lejlighedsvis indtil 90; febr. oftest 90-120, dog 9/2 160 Kls. (JHL), 14/2 135 Afl. (SC), 19/2 176 Afl. (SC), 20/2 215 Afl. (SC); pr. marts indtil 30 rst. Afl.Kls.; med. marts - med. apr. 80-120; ult. apr. - med. juni 125-160; ult. juni 200-250. Ynglepar: ca. 20 Afl. ca. 15 Kls. Returtrækket indledt ult. juni: 21/6 5 trk. (SC).

SORTKLIRE (Tringa erythropus). 14/5 2 ad. Kls. (BBP), 17/5 1 Kls. (BBP), 18/5 2 Kls. (HD, MP). I øvrigt alene iagttagelser fra med. og ult. juni, hvor jævnligt 1-3 rst. Afl.Kls., dog 28/6 6 Afl.(SC). Første iagttagelse fra nedtrækket: 11/6 1 trk. (RTA).

HVIDKLIRE (*Tringa nebularia*). Ret mange registreret om foråret: 22/4 1 Kls. (JLP), 23/4 1 Afl. (MB), 28/4 1 Kls. (JHL), 29/4 2 Kls. (SAL, LN), 1/5 6 Kls. (SKR, PT), 4/5 3 Kls. 4 trk. (HPJ, SKR, VV), 6/5 1 Afl. (VV), 8/5 2 Kls. (JHL), 10/5 2 Kls. (VV), 11/5 2 Kls. (SKR), 14/5 1 Kls. (BBP), 15/5 1 Kls. (VV), 18/5 1 Kls. (HD), 20/5 1 Afl. (VV), 21/5 1 Kls. (PT), 28/5 1 Kls. (LN). Ult. juni regelmæssigt 1-3 rst. Afl.Kls. med første observation: 24/6 2 Afl. (SC) 1 Kls. (SKR).

MUDDERKLIRE (*Tringa hypoleucos*). 10 observationer fra foråret: 23/4 1 Kls. (MB), 26/4 1 Kls. (HPJ), 30/4 1 Kls. (LN), 1/5 1 Kls. (SKR, PT), 4/5 4 Kls. (BBP), 11/5 1 Kls. (VV), 13/5 1 Afl. (JLP), 20/5 1 Kls. (LN, VV), 21/5 1 Kls. (LN), 28/5 1 Kls. (LN). Fra nedtrækket følgende observationer: 27/6 1 Afl. (SC) 1 Kls. (FJH), 28/6 2 Afl. (SC).

ISLANDSK RYLE (*Calidris canutus*). Tre iagttagelser, hvoraf den sidstnævnte på et utraditionelt tidspunkt: 23/4 2 Afl. (MB), 15/5 1 Afl. (VV), 16/6 1 trk. SØ. (SC).

SORTGRÅ RYLE (*Calidris maritima*). 8/2 2 Afl. (SC), 2/3 1 Afl. (SC), 23/4 1 Afl. (MB).

DVÆRGRYLE (*Calidris minuta*). En enkelt iagttagelse fra artens normale forekomstperiode: 20/5 1 Kls. (LN, VV).

TEMMINCKSRYLE (*Calidris temminckii*). Blot seks iagttagelser: 15/5 2 Kls. (LN, JLP, SKR), 17/5 9 Kls. (KMO, BBP), 18/5 1 Kls. (VV), 20/5 11 Kls. (LN, BBP, VV), 21/5 11 Kls. (PT, MP, VV), 23/5 4 Kls. (LN).

ALM. RYLE (*Calidris alpina*). Jan. jævnlgt 1-25 rst. Afl.Kls.; pr. og med. febr. oftest 50-125, dog lejlighedsvis indtil 200 og 19/2 228 Afl. (SC), 20/2 300 Afl. (SC). Ult. febr. og pr. marts kun 1-30; med. og ult. marts regelmæssigt 100-300; apr. tit 500-600. Maj normalt væsentligt flere, således 4/5 1100 Afl.Kls. (VV, SKR), 13/5 3500 Afl. (BBP, VV), 15/5 1800 Afl.Kls. (LN, BBP, SKR, VV), 18/5 1350 Kls. (HD), 20/5 1500 Afl. (VV), 21/5 1500 Afl. (VV), 28/5 2000 Kls. (LN). Juni 1-20 rst. Afl.Kls. 4-5 ynglepar Afl.Kls. Returtrækket indledt ult. juni: 26/6 2 trk. (FJH).

KRUMNÆBBET RYLE (*Calidris ferruginea*). En enkelt iagttagelse tilmed på et bemærkelsesværdigt tidspunkt: 23/6 2 trk. SV. (SC).

KÆRLØBER (*Limicola falcinellus*). 29/6 1 Afl. (SC). Tidspunktet er usædvanligt.

BRUSHANE (*Philomachus pugnax*). Første observationer lidt senere end normalt: 7/4 3 Afl. (SC), 8/4 3 Afl. (JLP, VV) 1 Kls. (SAL). Med. og ult. apr. 1-9 rst. Afl.Kls.; pr. maj 30-40; med. maj 10-25; ult. maj - med. juni jævnlgt 1-10, dog 11/6 18 Kls. (SAL); ult. juni atter 12-15. 2 hunner viste yngleadfærd Kls. Returtrækket indledt med. juni: 14/6 3 trk. (SC).

KLYDE (*Recurvirostra avosetta*). Første iagttagelser tidlige, specielt den første: 10/3 1 Afl. (SC), 16/3 1 Afl. (SC, VV). I løbet af anden halvdel af marts jævnt stigende antal til 40 rst. ved månedens udgang. Apr. - med. juni regelmæssigt 60-80 rst. Afl.Kls., dog 27/5 95 Afl.Kls. (SKR). Ult. juni 40-50 rst. Afl.Kls. Ynglepar: 30-35 Afl. 10-15 Kls. Returtrækket indledt med. juni: 13/6 7 trk. (SC).

ODINSHANE (*Phalaropus lobatus*). 17/6 1 han Afl. (SC), vel sagtens en fugl på forsinket forårstræk.

WILSONS SVØMMESNEPPE (*Phalaropus tricolor*). 24/6 1 Kls. (TA, SC, JLP, SKR), hvilket er 2. iagttagelse her fra landet. Arten er fra Nordamerika. Iagttagelsen er godkendt af SU.

- 9
PARASITIC
- ALM. KJOVE (Stercorarius pomarinus). Dette halvår følgende: 17/6 1 ad. (lys fase) trk. Ø. Afl. (SC, JLP), 30/6 1 ad. (lys fase) trk. Ø./NØ. Kls. (FJH).
- SVARTBAG (Larus marinus). Jan. - maj regelmæssigt 1-15 rst. Afl. Kls., undtagelsesvis flere: 3/1 26 Afl. (SC), 10/1 30 Kls. (FJH). Juni normalt 20-45 rst. Afl. Kls.
- SILDEMÅGE (Larus fuscus). Halvårets relativt pæne antal observationer udgøres af: 19/2 1 Afl. (SC), 18/3 1 ad. Kls. (FJH), 2/4 1 ad. Kls. (JHL, SAL), 21/4 1 Afl. (VV), 23/4 2 ad. Afl. (MB), 18/5 1 ad. Kls. (HD), 28/5 1 ad. Kls. (LN).
- DVÆRGMÅGE (Larus minutus). Første iagttagelse fra et usædvanligt tidspunkt: 1/1 1 ad. trk. V. (SC). Øvrige observationer: 26/3 2 ad. trk. N. (LN), 1/5 1 subad. Kls. (PT), 13/6 1 subad. Afl. (SC), 25/6 1 subad. Afl. (SC, SKR).
- RIDE (Rissa tridactyla). Tre observationer: 18/2 1 juv. Kls. (TA, LN, SKR), 24/3 1 juv. trk. Ø. (SC), 2/4 1 juv. trk. Ø. (SC, JLP).
- SORTTERNE (Chlidonias niger). Følgende observationer foreligger: 11/6 1 Afl. (RTA), 28/6 2 ad. trk. V. (FJH), 30/6 1 Afl. (SC).
- FJORDTERNE (Sterna hirundo). Eneste registreringer udgøres af: 23/4 4 Kls. (MB), 26/4 1 Kls. (HPJ), 11/5 1 Kls. (SKR).
- HAVTERNE (Sterna paradisaea). Normal ankomsttid: 14/4 2 Afl. (SC), 15/4 1 Afl. Kls. (SC, SKR). Antallet stigende i løbet af apr., således ult. apr. 20-45 rst. Afl. Kls. Maj - juni regelmæssigt 50-60 Afl. 30-40 Kls. Ynglepar: 30-40 Afl. 10-15 Kls.
- DVÆRGTERNE (Sterna albifrons). Normal ankomsttid: 22/4 2 Afl. (VV), 25/4 1 Afl. 2 Kls. (SC, VV). Ult. apr. - juni regelmæssigt 20-30 Afl. Kls. Ynglepar: 6-10 Afl. 5-7 Kls.
- SPLITTERNE (Sterna sandvicensis). Arten dukkede op ult. marts: 25/3 1 Afl. (SC), 28/3 1 Afl. (SC). Apr. - juni sædvanligvis 2-10 rst. Afl. Kls., dog 1/5 2 Afl. 20 Kls. (SKR). Et større trækantal: 30/4 114 trk. Ø. (SC).
- ALK (Alca torda). 7/3 1 fundet død Kls. (LN) skal nævnes.
- TEJST (Cepphus grylle). 10/1 1 trk. V. (SC) er eneste registrering.
- HULDUE (Columba oenas). Et forholdsvis beskedent antal observationer: 26/2 13 trk. Ø. (SC), 5/3 12 Kls. (JLP), 6/3 8 trk. (SC, VV), 7/3 1 trk. S. (VV), 11/3 7 trk. (SC, JLP, VV), 18/3 4 Kls. 5 trk. (FJH, SKR), 19/3 1 Kls. (FJH), 23/3 5 (HPJ), 24/3 1 (HPJ), 5/4 2 trk. (SC), 8/4 4 Kls. (SAL), 19/4 4 trk. (SC), 4/5 1 trk. (SKR, VV).
- RINGDUE (Columba palumbus). I hele perioden indtil 100 rst., dog 9/4 250 Kls. (SKR). En del trækiagttagelser: ult. febr. 90, pr. marts 20, med. marts 198, ult. marts 96, pr. apr. 35, med. apr. 28 - i alt 467 - flest 13/3 150 (SC).
- TURTELDUE (Streptopelia turtur). En af halvårets subrariteter: 29/5 1 Kl. (SKR).
- TYRKERDUE (Streptopelia decaocto). Maj - juni lejlighedsvis enkelte truffet forskellige steder i området.
- GØG (Cuculus canorus). Relativt sene førsteiagttagelser: 6/5 1 Kl. (VV), 7/5 1 Kl. (VV). Med. maj - juni regelmæssigt 10-15 i området.

SLØRUGLE (Tyto alba). En enkelt observation: 26/4 2 (SC).

SKOVHORNUGLE (Asio otus). 18/2 2 Afl. (SC, JLP, SKR), 19/2 2 Afl. (SC), 21/3 1 M. (HPJ), 22/3 1 Kl. (HPJ), 25/3 1 Kl. (JHL, SAL), 2/4 1 (JHL, SAL). Er arten blevet overset i år, eller er der tale om reel udeblivelse fra området? En sommerobservation: 20/6 1 M. (HPJ).

MOSEHORNUGLE (Asio flammeus). Kun få observationer: 13/1 1 Afl. (SC), 23/2 1 Afl. (SC), 11/3 1 indtrk. Afl. (SC, JLP, VV), 2/4 1 Afl. (SC), 16/4 1 Kls. (PT) 1 trk. Ø. (SC, LN, VV).

NATRAVN (Caprimulgus europæus). Også denne art er set: 3/6 1 Kl. (BBP).

MURSEJLER (Apus apus). Særdeles sene førsteiagttagelser: 11/5 1 Kls. 6 trk. (HPJ, VV), 13/5 3 Kls. (BBP) 20 trk. (PT). Med. maj - juni regelmæssigt rst., men i meget varierende antal, sædvanligvis under 100, dog lejlighedsvis betydeligt flere, således: 24/6 2000 Kls. (SKR), 25/6 1500 Afl. Kls. (LN, SKR), 27/6 700 Kls. (FJH). Endvidere enkelte større træktalet: 23/5 400 (LN), 24/6 1200 (FJH), 30/6 350 (FJH).

HÆRFUGL (Upupa epops). Set igen i år: 7/5 1 (HPJ).

STOR FLAGSPÆTTE (Dendrocopus major). Jan. - marts regelmæssigt 3-7 Kl. 9-12 ynglepar Kl.

LILLE FLAGSPÆTTE (Dendrocopus minor). 22/4 1 Kls. (VV), 28/4 1 Kl. (VV). De to iagttagelser drejer sig vel om samme fugl.

SORTSPÆTTE (Dryocopus martius). 21/3 1 Afl. (SC) er eneste observation.

VENDEHALS (Jynx torquilla). Kun få iagttagelser: 28/4 1 Afl. (SC). 6/5 1 Kl. (SAL, MP), 7/5 1 Kl. (VV), 12/5 1 Kl. (MB), 13/5 1 Afl. (JLP), 20/5 1 Kl. (LN).

HEDELØRKE (Lullula arborea). Blot to observationer: 11/3 1 trk. Kls. (LN), 18/3 1 Kls. (SKR).

SANGLØRKE (Alauda arvensis). Jan. uregelmæssigt indtil 20 rst. Afl. Kls.; febr. jævnlige indtil 35; pr. marts oftest 40-90; med. og ult. marts hyppigt 150-300 eventuelt flere: 18/3 150 Afl. 550 Kls. (FJH, SKR), 19/3 500 Afl. (JLP), 22/3 840 Kls. (LN), 24/3 455 Kls. (LN). Apr. - juni konstant 15-20 Afl. 25-40 Kls. Stort trækantal, hvoraf med. jan. 139 og med. febr. 80 hidrører fra kuldeflugt. Øvrige træktalet: ult. febr. 596, pr. marts 2590, med. marts 975, ult. marts 128, pr. apr. 38 - i alt 4327 - flest 2/3 1085 (SC), 3/3 348 (SC), 5/3 760 (SC, LN, SKR), 18/3 476 (FJH, SKR), i øvrigt under 300 pr. dag.

BJERGLØRKE (Eremophila alpestris). 21/4 5 Kls. (JLP).

LANDSVALE (Hirundo rustica). Første iagttagelser næsten 2 uger senere end normalt: 1/5 2 trk. (SKR), 2/5 3 Afl. (VV) 1 M. (HPJ). Maj - juni regelmæssigt 10-45 rst. Afl. Kls. Kun få trækobservationer (pr. og med. maj).

BYSVALE (Delichon urbica). Første iagttagelser en uges tid senere end normalt: 1/5 3 Afl. 2 trk. (SKR), 2/5 1 M. (HPJ). Maj - juni regelmæssigt 20-50 rst. Afl. Kls. Yderst få trækobservationer (pr. og med. maj).

DIGESVALE (Riparia riparia). Første iagttagelser til normal tid eller lidt senere: 1/5 3 trk. (SKR), 4/5 1 Kl. (VV). Maj - juni lejlighedsvis 1-5 rst. Afl. Kls. Enkelte trækobservationer.

PIROL (Oriolus oriolus). Helt usædvanlig forekomst. Første iagttagelser: 18/5 1 han 1 hun Kl. (MP), 20/5 2 hanner Kl. (VV). I tiden derefter masseforekomst Kl.: ult. maj min. 9 hanner, pr. juni min. 17 (14 hanner 2 hunner 1), med. juni min. 12 (7 hanner 5 hunner), ult. juni 9-11 hanner 5 hunner 1. Alt i alt har der været mindst 25 forskellige fugle (20 hanner 5 hunner) (LNA, SC, KaF, HPJ, JHL, SAL, LN, MP, BBP, JLP, SKR, MT, PT, VV). Mon noget lignende er oplevet herhjemme tidligere ?

RAVN (Corvus corax). 5/3 1 trk. SØ. (JLP).

SORTKRAGE (Corvus corone corone). Følgende observationer rapporteret: 2/3 2 trk. Ø. (SC), 7/3 1 trk. (LN), 28/3 1 Afl. (SC), 29/3 3 trk. Ø. (SC), 16/4 1 trk. (SC, VV), 20/5 1 trf. Kls. (BBP).

GRÅKRAGE (Corvus corone cornix). I hele perioden regelmæssigt 1-6 rst. Afl. Kl. Kls., jan. - febr. dog lejlighedsvis indtil 15. Formentlig 1-2 ynglepar i området. Samlede træktal: med. febr. 16, pr. marts 214, med. marts 139, ult. marts 4, pr. apr. 78, med. apr. 47 - i alt 498 - flest 6/3 114 (SC), i øvrigt under 100 pr. dag.

RÅGE (Corvus frugilegus). Jan. - apr. ved enkelte lejligheder 1-4 rst. Afl. Kls. En del trækobservationer: pr. marts 39, med. marts 181, ult. marts 7, pr. apr. 28, med. apr. 11, ult. apr. 2 - i alt 268 - flest 18/3 148 (SC, FJH, SKR, VV).

ALLIKE (Corvus monedula). Jan. - apr. undtagelsesvis 1-4 rst. Afl. Kls. Samlede træktal: med. febr. 8, pr. marts 219, med. marts 324, ult. marts 12, pr. apr. 97, med. apr. 49, pr. maj 1 - i alt 710 - flest 18/3 105 (SC, FJH, SKR, VV).

HUSSKADE (Pica pica). Jan. - marts oftest 1-5, dog lejlighedsvis indtil 13 rst. i området og to gange endnu flere: 13/1 20 Kls. M. (FJH), 28/1 30 Kls. (LN). Apr. - juni regelmæssigt 1-4.

NØDDEKRIGE (Nucifraga caryocatactes). Jan. - febr. 6 fortrinsvis Kl. Marts - juni konstant 5-6 ad. Kl. M., hvoraf 1 ynglepar (tyndnæbbet race), idet 29/6 2 ad. 5 juv. (nyligt udfløjne) Kl. (BBP). Såvel den tyknæbbede som den tyndnæbbede race set (SC, BBP).

SKOVSKADE (Garrulus glandarius). I periodens første del regelmæssigt indtil 10 rst. i området. Maj - juni 2 familier med henholdsvis 2 og 6 udfløjne unger Kl. (BBP) og derudover yderligere 8-10 ad.

MUSVIT (Parus major). Normale optællinger har givet 80-100 par Kl.

BLÅMEJSE (Parus caeruleus). Optællinger har givet 55-65 par Kl.

SORTMEJSE (Parus ater). Jan. - apr. 1-4 iagttaget lejlighedsvis Kl.

HALEMEJSE (Aegithalos caudatus). I periodens første del 10-25 truffet Kl., dog 15/1 28 Kl. (JHL, SAL). Med. maj - juni registreret 10 steder Kl., hvor 14 ad. blev racebestemt: 13 tilhørte nordlig race, medens 1 viste svage spor af den sydlige races kendetegn (BBP). *Kont. 28/4 11 Kl. JHL, SAL 20/5 11 Kl. BBP*

TRÆLØBER (Certhia familiaris). Jan. - marts kun få observeret. Ult. maj - juni registreret 17-21 steder Kl.

GÆRDESMUTTE (Troglodytes troglodytes). Jan. - febr. lejlighedsvis 1 truffet Kl. Kls. Stigende antal i løbet af perioden marts - apr. Juni 26-29 syngende Kl.

MISTELDROSSEL (Turdus viscivorus). Første iagttagelser: 6/3 1 Afl. 2 trk. (VV), 7/3 2 Afl. (VV). Marts - med. apr. i øvrigt regelmæssigt 1-4 rst. Afl. Kl. Kls., dog 18/3 6 Afl. (SC, JLP, SKR), 19/3 11

Afl. 1 Kls. (SC, JLP, SKR). Maj - juni 2 syngende Kl. Foruden ovennævnte følgende trækobservationer: 11/3 2 (LN), 18/3 4 (FJH, SKR).

SIJAGGER (Turdus pilaris). Jan. - med. febr. ofte 175-300 rst., fortrinsvis Afl.M., lejlighedsvis indtil 500 Afl. Ult. febr. - pr. maj sædvanligvis 5-20, dog 30/3 45 Kls. (SKR), 6/5 60 (HPJ), 7/5 60 (HPJ). Med. maj stadig 2 M.Kl.Kls. med seneste observation: 18/5 2 Kls. (HD). Enkelte trækiagttagelser: 18/3 31 (SKR), 30/3 90 (SKR), 9/4 4 (SKR).

SANGDROSSEL (Turdus philomelos). En vinterobservation: 4/2 1 Kl. (LN). Første iagttagelser i øvrigt: 4/3 1 Kl. (HPJ, SAL), 5/3 1 Kl. (JLP). Med. og ult. marts indtil 12 rst. Maj - juni 80-100 syngende Kl.

VINDROSSEL (Turdus iliacus). Jan. - apr. jævnlige iagttagelser af indtil 30 rst., fortrinsvis Kl., dog 9/1 100 (KMO). Pr. maj endnu 5 Kl. Seneste observationer: 15/5 1 syngende Kl. (VV), 29/5 1 syngende Kl. (SKR).

RINGDROSSEL (Turdus torquatus). To iagttagelser: 24/4 2 Afl. (SC), 26/4 1 Afl. (SC).

SOLSORT (Turdus merula). Et par bemærkelsesværdige observationer: 18/3 309 trk. V. og NV. Kls. (FJH, SKR), 19/3 70 trk. NV. og N. Kls. (FJH). Årsag: et pludseligt indtruffet, kraftigt temperaturfald ledsaget af betydeligt snefald.

STENPIKKER (Oenanthe oenanthe). Første iagttagelser: 7/4 1 Afl. (SC), 13/4 1 Afl. (VV), hvilket svarer til normalt ankomsttidspunkt. Med. apr. - maj regelmæssigt 1-7 rst. Afl.Kls., dog 17/5 15 Kls. (BBP). Sidste observation: 29/5 1 han Kls. (LN).

BYNKEFUGL (Saxicola rubetra). Lidt senere ankomst end normalt. Første iagttagelser: 29/4 1 han Afl. (SC, VV), 1/5 1 Kls. (SKR). Pr. og med. maj indtil 8 rst. Afl.Kls. Sidste på træk: 21/5 4 Kls. (VV). Ult. maj - juni 1 syngende Afl.

RØDSTJERT (Phoenicurus phoenicurus). Normalt ankomsttidspunkt. Første iagttagelser: 23/4 1 han Kls. (MB), 4/5 2 hanner 1 hun Kl. (HPJ, SKR, VV). Pr. og med. maj normalt 1-6, fortrinsvis Kl., dog 11/5 5 Afl. 7 Kl. (VV). Ult. maj - juni truffet syngende 4 steder Kl.M.

HUSRØDSTJERT (Phoenicurus ochruros). To observationer: 8/4 2 hanner/juv. Kls. (EMM, VV), 14/4 1 hun Afl. (SC).

NATTERGAL (Luscinia luscinia). Første iagttagelser nogle få dage senere end normalt: 7/5 2 Kl. (VV), 8/5 3 Kl. (JHL). Arten er truffet i betydeligt større antal end sædvanligt. Gennemtræk konstateret til med. juni. Optællinger ult. maj - pr. juni har hver gang givet 21-34 syngende Kl. Ynglepar: 1-2 Afl. 40-44 Kl.

BLÅHALS (Luscinia svecica). 17/5 1 hun (KMO).

RØDHALS (Erithacus rubecula). Jan. - marts 1-4 Afl.Kls. Gennemtræk konstateret apr. - pr. maj, således 9/4 45 Afl. 5 Kls. (SC, SKR, VV), 24/4 40 Afl. (SC), 4/5 104 Afl. 200 Kl. 5 Kls. (MB, SKR, VV). Ult. maj - juni 49-60 syngende Kl.

GRÆSHOPPESANGER (Locustella naevia). En observation: 13/5 1 syngende Kls. (PT).

DROSSELRØRSANGER (Acrocephalus arundinaceus). 29/5 1 syngende Kls. (LN, SKR). Er det en ny art for lokaliteten ?

RØRSANGER (Acrocephalus scirpaceus). Første iagttagelser lidt senere end normalt: 11/5 2 Afl. (VV), 13/5 2 Kls. (PT). Gennemtræk konstateret til pr. juni. Ult. maj - juni regelmæssigt 1-3 Afl. 8-12 Kls. syngende.

KÆRSANGER (Acrocephalus palustris). Første iagttagelser lidt senere end normalt: 21/5 1 Kls. (VV), 27/5 1 Afl. 1 Kls. (SKR). Gennemtræk konstateret til pr. juni. Juni regelmæssigt 2-6 Afl. 1-2 Kl. 4-5 Kls. 2 M. syngende, med. og ult. juni dog kun 2-3 Afl.

SIVSANGER (Acrocephalus schoenobaenus). Første iagttagelser til normal tid: 4/5 1 Kls. (SKR, VV), 6/5 1 Kls. (SKR, VV). Øvrige observationer: 7/5 1 Kls. (VV), 14/5 1 Afl. (BBP), 18/5 1 Kls. (VV), 19/5 1 Kls. (LN), 20/5 1 Kls. (BBP), 28/5 1 Afl. (HPJ, BBP), 11/6 1 Kls. (LN), 24/6 1 Kls. (SKR), 25/6 1 Kls. (SKR). Iagttagelserne drejer sig formentlig om 5-6 forskellige syngende fugle.

GULBUG (Hippolais icterina). Første iagttagelser nogle dage senere end normalt: 15/5 2 Kl. (VV), 18/5 1 Kl. (HPJ, SKR, VV). Gennemtræk konstateret til pr. juni. Juni 5 Afl. 2 Kls. 16 M. 52-55 Kl. syngende.

MUNK (Sylvia atricapilla). Første iagttagelser nogle dage senere end normalt: 30/4 1 han Kls. (LN), 1/5 3 Kl. (SKR, PT, VV). Gennemtræk konstateret til pr. juni. Med. og ult. juni 50-60 syngende Kl.

HAVESANGER (Sylvia borin). Første iagttagelser lidt senere end normalt: 11/5 1 Kl. (VV), 18/5 3 Kl. (SKR, VV). Gennemtræk konstateret til pr. juni. Med. og ult. juni 50-60 syngende Kl.

TORNSANGER (Sylvia communis). Første iagttagelser til normal tid: 6/5 1 Afl. (VV), 11/5 1 Afl. (VV) 1 Kls. (SKR). Ult. maj - juni 5-6 Afl. 9-10 Kls. 4 Kl. 4 M. syngende.

GÆRDESANGER (Sylvia curruca). Første iagttagelser nogle dage senere end normalt: 30/4 1 Kls. (LN), 1/5 1 (HPJ). Ult. maj - juni 1 Afl. 1 Kls. 8-9 Kl. 2 M. syngende.

LØVSANGER (Phylloscopus trochilus). Første iagttagelser til normal tid: 21/4 1 Kl. (SAL), 22/4 1 Afl. (VV). Ult. apr. indtil 6 Afl. 10 Kls. Maj - juni oftest 100-125 syngende Kl., dog 6/5 170 (SAL), 28/5 152 (LN), 3/6 299 (BBP), 5/6 340 (BBP). Juni 2 Afl. 0-4 Kls. syngende.

LUNDSANGER (Phylloscopus trochiloides). 18/6 1 syngende Kl. (FD). Arten er så godt som årlig på lokaliteten og er hyppigst truffet pr. juni. Den aktuelle iagttagelse bør dokumenteres med en detaljeret beskrivelse.

GRANSANGER (Phylloscopus collybita). Første iagttagelser ret senere: 24/4 1 Afl. (SC), 28/4 1 Kl. (VV). Ult. apr. - juni jævnligt 1-2 syngende forskellige steder Kl.

SKOVSANGER (Phylloscopus sibilatrix). Første iagttagelser til normal tid: 30/4 2 Kl. (LN), 1/5 1 Kl. (SKR). Gennemtræk konstateret til ult. maj. Juni 58-59 syngende Kl., 47-52 ynglepar.

FUGLEKONGE (Regulus regulus). Jan. - med. marts kun enkelte. Gennemtræk registreret ult. marts - med. maj, således 2/4 40 Kl. (HPJ, SKR). Ult. maj - juni 5 syngende Kl.

RØDTOPPET FUGLEKONGE (Regulus ignicapillus). Tre observationer: 2/4 2 Kl. (HPJ, LN, SKR), 4/5 1 Kl. (MB), 17/5 1 Kl. (KMO).

GRÅ FLUESNAPPER (Muscicapa striata). Første iagttagelser til sædvanlig tid: 6/5 5 Kl. (HPJ, SAL, SKR, VV), 7/5 2 Kl. (VV). Gennemtræk konstateret indtil ult. maj. Ult. juni 4-5 steder Kl. (ynglepar).

BROGET FLUESNAPPER (*Muscicapa hypoleuca*). Første iagttagelser over en uge senere end normalt: 4/5 4 Kl. (MB,SKR), 6/5 5 Kl. (HPJ, SAL,SKR,VV). Flest registreret med. maj, således 11/5 18 Kl. (VV). Regelmæssigt 3-6 hanner Kl. indtil udgangen af maj. Pr. juni 2 Kl. 2 M. syngende.

LILLE FLUESNAPPER (*Muscicapa parva*). Følgende iagttagelser foreligger: 13/5 1 hun/juv. Kl. (BBP), 21/5 1 hun/juv. Kl. (PT), 24/5 1 juv. han Kl. (SKR), 18/6 1 juv. han Kl. (SKR).

JERNSPURV (*Prunella modularis*). Jan. - pr. marts kun én iagttagelse rapporteret: 26/1 1 M. (FJH). Gennemtræk marts - pr. maj. Ult. maj - juni 88-96 syngende Kl., idet bemærkes, at de enkelte totaloptællinger gav indtil 32 syngende Kl.

ENGPIBER (*Anthus pratensis*). Jan. - febr. regelmæssigt 1-3 rst. Afl.Kls., dog 13/1 6 Afl. (SC), 22/1 6 Kls. (LN). Marts - juni oftest 10-20 Afl. 10-20 Kls. Kun få trækobservationer.

MARKPIBER (*Anthus campestris*). Følgende observationer foreligger: 13/5 1 Kls. (VV), 14/5 1 Kls. (BBP).

SKOVPIBER (*Anthus trivialis*). Første iagttagelser til normal tid: 22/4 1 trk. (HPJ), 23/4 2-3 Kl. (HPJ,VV). Allerede mange ult. apr., således: 25/4 35 Afl. (SC). Maj - juni truffet regelmæssigt syngende 5 forskellige steder Kl. Maj desuden truffet yderligere 3 steder Kl. Enkelte trækobservationer.

SKÆRPIBER (*Anthus spinoletta*). Jan. - febr. kun følgende iagttagelser: 11/2 1 Afl. (SKR), 12/2 1 Afl. (SC), 14/2 2 Afl. (SC). Med. marts hyppige observationer af 3-6 rst. Afl.Kls.: ult. marts - med. apr. jævnlige 1-4. Endvidere: 21/4 1 Afl. (JLP), 4/5 1 Kls. (HPJ). Følgende trækobservationer: 22/3 1 (JHL,SAL), 8/4 2 (SAL).

HVID VIPSTJERT (*Motacilla alba*). Første iagttagelser tidlige: 7/3 1 trk. (LN), 11/3 1 trk. (SC,VV). Næste observation: 18/3 2 Kls. (SKR). Først regelmæssig fra den sidste uge af marts. Apr. - juni regelmæssigt 1-5 Afl. 1-4 Kls. 1-6 Kl. Ynglepar: 3 Kl. 2 Kls. Kun få trækobservationer: pr. marts 1, med. marts 1, pr. apr. 40, med. apr. 2, ult. apr. 31 - i alt 75.

BJERGVIPSTJERT (*Motacilla cinerea*). En enkelt observation: 16/4 1 indtrk. Kls. (LN).

GUL VIPSTJERT (*Motacilla flava*). Første iagttagelser relativt senere: 28/4 2 Kls. (JHL), 2/5 1 Afl. (VV). Maj - juni 15-20 Kls. 10-15 Afl. Ynglepar: ca. 10 Afl. 8 Kls. Nordlige race observeret med. maj, flest 17/5 18 i flok Kls. (BBP). Kun få trk. registreret.

STOR TORNSKADE (*Lanius excubitor*). Kun fire observationer: 13/1 1 Afl. (SC), 31/1 1 Afl. (SC), 12/3 1 Kls. (LN), 18/3 1 M. (FJH).

RØDRYGGET TORNSKADE (*Lanius collurio*). Første iagttagelse nogle dage senere end normalt: 13/5 1 han Kls. (LN,VV), 14/5 1 han Kls. (BBP). Ult. maj - juni regelmæssigt 1 st. Afl. 1-3 st. Kl. 2-4 st. Kls.

STÆR (*Sturnus vulgaris*). Jan. - med. febr. kun følgende observationer: 1/1 2 Afl. (SC), 7/1 1 M. (LN), 9/1 2 Afl. (SC), 21/1 1 M. (LN). Ult. febr. 15-20 rst. Afl.Kl.Kls. Marts - apr. 50-300, dog 24/3 410 Kls. (LN), 27/3 500 Afl. (SC), 30/3 1000 Afl. (SC), 1/4 600 Afl. (LN,SKR). Maj 100-200. Juni meget talrig Kl. Trækiagttagelser: ult. febr. 37, pr. marts 861, med. marts 488, ult. marts 285, pr. apr. 931, med. apr. 20, pr. maj 6 - i alt 2728 - flest 2/3 698 (SC), 18/3 386 (FJH,SKR), 30/3 250 (SKR), 2/4 380 (LN,SKR), 9/4 465 (LN,SKR), i øvrigt under 200 pr. dag.

KÆRNEBIDER (Coccothraustes coccothraustes). Jan. - pr. apr. kun få observationer: 25/2 1 Kl. (SKR), 4/3 5 Kl. (SAL), 25/3 1 Kl. (JHL,SAL), 2/4 3 Kl. (JHL,SAL,SKR), 8/4 2 Kl. (SAL). Med. maj - juni 20-25 par Kl.

GRØNIRISK (Carduelis chloris). I hele perioden regelmæssigt indtil 20 rst. Afl.Kl.Kls. Maj - juni ca. 10 par Kl. Enkelte trækobservationer apr.

STILLITS (Carduelis carduelis). Jan. - febr. kun få observationer: 6/1 4 Afl. (SC), 8/1 5 Afl. (SC), 22/1 2 Kls. (SKR), 9/2 8 Afl. (SC), 26/2 1 Kls. (SKR). Marts - apr. jævnlige observationer af 1-4 rst. - mere uregelmæssigt indtil 12 rst. Pr. maj 8 syngende Kl., med. maj - juni 3 syngende Kl. Juni 9 syngende M.

GRØNSISKEN (Carduelis spinus). Jan. - febr. en enkelt observation: 18/1 6 Afl. (SC). Marts - med. maj spredte iagttagelser af 1-10, dog 22/3 35 Kl. (JHL,SAL,LN). Seneste observation: 15/5 1 syngende Kl. (BBP). Enkelte trækobservationer pr. maj.

TORNIRISK (Carduelis cannabina). Jan. - pr. marts ingen observationer. Første iagttagelser: 12/3 1 trk. (SKR), 18/3 10 Kls. 2 trk. (SKR). Med. marts - apr. regelmæssigt indtil 20 - undtagelsesvis indtil 50 - rst. Afl.Kls.; maj - juni sædvanligvis 30-55. Kun enkelte trækobservationer ult. marts - med. apr.

BJERGIRISK (Carduelis flavirostris). Kun følgende iagttagelser: 7/1 1 Kls. (SAL), 9/2 25 Afl. (SC), 18/3 15 Afl. (SC,VV), 22/3 7 trk. (JHL,SAL), 28/3 8 trk. (SC), 2/4 21 Kls. (JHL,SAL) 31 trk. (SC,JLP,VV), 9/4 1 Afl. (SKR), 17/5 1 Kls. (BBP). Hertil skal bemærkes, at sidstnævnte iagttagelse er sen.

GRÅSISKEN (Carduelis flammea). Følgende observationer er rapporteret: 1/1 1 M. (LN), 7/1 2 Kl. (SAL), 8/1 1 Kl. (LN), 17/2 27 Afl. (SC), 7/3 1 trk. (LN), 6/5 1 Kls. (SAL).

GULIRISK (Serinus serinus). For andet år i træk kun få observationer: 9/4 1 han M. (HPJ), 13/5 1 (HPJ), 17/5 2 hanner Kl. (KMO), 22/6 1 ad. Kl. (BBP).

DOMPAP (Pyrrhula pyrrhula). Jan. - med. apr. jævnligt 10-15 Afl. Kl.Kls. Med. maj - juni registreret 2 steder Kl.

LILLE KORSNÆB (Loxia curvirostra). Enkelte observationer: 7/1 1 Kl. (SAL), 22/3 1 han Kl. (JHL,SAL), 16/4 3 Kl. (KaF), 13/5 11 Kl. (LN), 20/5 11 Kl. (VV), 10/6 14 (3 ad. hanner 8 hunner/juv.) Kl. (SKR).

BOGFINKE (Fringilla coelebs). Jan. - febr. kun få. Beskedent træk marts - apr., flest 18/3 350 trk. (SKR).

KVÆKERFINKE (Fringilla montifringilla). Jan. - apr. af og til 1-6 rst., fortrinsvis Kl., dog 7/1 25 M.Kl. (SAL,LN). Pr. og med. maj 1-3 Kl. Sidste observation: 15/5 1 Kl. (VV).

GULSPURV (Emberiza citrinella). Jan. - marts lejlighedsvis 1-3 rst. Kls., dog 7/1 21 Kls. (SAL). Apr. stigende antal. Ult. maj - juni 24-28 Kl. 3 M. syngende.

HORTULAN (Emberiza hortulana). Blot følgende observationer: 4/5 1 M. (MB), 5/5 3 M. (KaF), 6/5 1 han (MP), 7/5 3 Afl. (JLP), 14/5 1 M. (BBP).

LAPLANDSVÆRLING (Calcarius lapponicus). Et pænt antal observationer: 24/3 1 trk. Kls. (LN), 15/4 3 hanner Afl. (SC,JLP,SKR), 16/4 1 han Afl. (VV), 18/4 1 han 1 hun Afl. (SC).

RØRSPURV (Emberiza schoeniclus). Jan. - febr. regelmæssigt 2-4 og undtagelsesvis 6-8 rst. Afl.Kls.; marts - pr. maj normalt 5-20 rst. Afl.Kls. Med. maj - juni 4 Afl. 9-10 Kls. syngende. Enkelte trækobservationer med. marts - pr. apr.

SNESPURV (Plectrophenax nivalis). Jan. - pr. apr. hyppige iagttagelser af 1-5 rst. Afl.Kls., undtagelsesvis flere, således: 23/2 35 Afl. (SC), 5/3 10 Afl. (SC) 7 Kls. (SKR,JLP,VV), 19/3 10 Kls. 1 trk. (FJH,SKR,VV). Sidste observation: 4/4 1 Afl. (SC).

Vedr. Kongelunden 2, 1977.

Beklageligvis har der i denne rapport været nogle trykfejl. Rettelser følger hermed:

GRÅAND.

5. linie: ... - flest 15/10 120 ...

PIBEAND.

7. linie: ... , ult. sept. 710, ...

8. linie: ... - i alt 3729 -...., 11/9 708 (SC,FJH,LN,BBP,SKR,VV)...

EDERFUGL.

4. linie: ... , med. okt. 6472, ...

5. linie: ... - i alt 17273 - ...

HULDUE.

4.og 5. linie:..., pr. nov. 204,...., ult. nov. 10 ... i alt 952 ...

GRØNSISKEN.

4. linie: ... i alt 3889 - ...

Stig Kjærgaard Rasmussen,
Hedebygade 32, 3. sal tv.,
1754 København V.