


Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og 1996

PALLE A. F. RASMUSSEN



Rapport nr 26 fra Sjældenhedsudvalget

(With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 1995 and 1996)

Indledning

I denne rapport for 1995 og 1996 er 363 sager for Danmark og Grønland færdigbehandlet, heraf 179 fra 1995 og 135 fra 1996. Begge år blev ca 80% af de behandlede sager godkendt.

Den systematiske gennemgang og den regionale inddeling er som i den foregående rapport (Rasmussen 1996). Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for henholdsvis første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen mindst er i sit andet (tredje) kalenderår, men kan være ældre. Ad. = adult (gammel, udfarvet fugl), imm. = immatur (dragter mellem juvenil og adult), juv. = juvenil (første fjerdragt efter pullusdragten), pull. = pullus (dununge), sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt, trk.fors. = trækforsøgende, trk. = trækkende, syng. = syngende og ringm. = ringmærket.

Efter artsnavnet er i parentes angivet fire tal: 1) antal fund før 1. januar 1965; 2) antal godkendte fund fra og med 1. januar 1965 (SU's oprettelse) til og med 1994; 3) antal godkendte fund i 1995; 4) antal godkendte fund i 1996. Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid er identisk med antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på én dag regnes som fem fund. Signaturerne efter observationerne er observatørernes initialer.

Bagest i rapporten findes en liste over forkastede fund, en observatørliste, samt rettelser til tidligere SU-rapporter.

Godkendte sager

Fra 1995 godkendtes Bøffeland og Sydlig Stor Tornskade som nye arter og Islandsk Stor Kobbersnepe som ny race for landet, mens der ikke blev godkendt nye arter eller racer fra 1996. Ligeledes som ny art for landet godkendtes Amerikansk Tundrahjgle fra 1991. Desuden er en Høgeørn fra 1957 godkendt, hvorved den bliver landets første; tilsvarende er fund af Grønlandsk Blisgås fra 1952 og Sorthovedet Gul Vipstjert fra 1988 godkendte og dermed de første for landet. Andre bemærkelsesværdige iagttagelser var andengangsfund af Bonapartemåge og Rubinnattergal i 1995 samt Amerikansk Tundrahjgle, Middelhavsstenpikker og Nordsanger i 1996. Derudover kan nævnes invasionsagtig optræden af Krognæb i efteråret 1995.

Taksonomiske ændringer

I AERC (Association of European Rarities Committees) er et af målene at nå frem til en fælles europæisk artsliste og dermed også en fælles holdning til de taksonomiske ændringer, der i et stadigt stigende tempo bliver foreslået. En afklaring er imidlertid ikke lige om hjørnet, idet AERC indtil nu kun har kunnet afholde et årligt møde, senest i Slovakiet i juli 1997, hvor også det danske SU var repræsenteret. Fra og med denne rapport har SU derfor truffet beslutning om indtil videre at følge anbefalingerne fra BOURC (British Ornithologists Union Records Committee) vedrørende tak-

sonomiske ændringer, som i øvrigt løbende publiceres i tidsskriftet *Ibis*. Hermed er Middelhavsskråpe *Puffinus yelkouan* (racen *mauretanicus*), Bjergpiber *Anthus spinoletta* (racen *spinoletta*), Vestlig Bjergløvsanger *Phylloscopus bonelli*, Humes Sanger *Phylloscopus humei* og Sydlig Stor Tornskade *Lanius meridionalis* (racen *pallidirostris*) optaget som nye arter på den danske liste. Samtidig udgår Middelhavssølvmåge *Larus cachinnans* (racen *cachinnans*) af artslisten, og ssp. *cachinnans* betragtes herefter som en race af Sølvmåge *Larus argentatus*.

Vedrørende tidligere ændringer henvises i øvrigt til Olsen (1992).


Henlagte sager

Fra tiden frem til udgangen af 1996 henligger der 18 sager, som af forskellige årsager endnu ikke er færdigbehandlet. Hertil kommer sager vedrørende Sølvmåge af formerne *Larus argentatus cachinnans/michahellis* samt Sildemåge af formen *Larus fuscus heuglini*. Det forventes ikke, at der bliver truffet afgørelser i disse sager i den nærmeste fremtid, da der er stor usikkerhed om systematik og feltbestemmelse af disse former. Udvalget modtager imidlertid gerne grundige beskrivelser og især fotos, der kan bidrage til afklaring af problematikken. Derimod er alle henlagte sager vedrørende Bjergpiber færdigbehandlet og alle tidligere godkendte fund genbehandlet; afgørelserne fremgår af nærværende rapport.

SU-listen

Fra og med 1998 skal Bjergpiber og Hvidhalset Fluesnapper *Ficedula albicollis* ikke forelægges SU. Bemærk i øvrigt, at fund af Jagtfalk *Falco rusticolus* stadig skal forelægges SU, selv om det modsatte fremgår af Rasmussen (1996). Endvidere bør nævnes, at landets eneste fund af Gærdeværling *Emberiza cirulus* efter genbehandling ikke længere anerkendes, og arten er hermed udgået af den danske liste.

Siden den seneste SU-liste blev publiceret i 1991 (*Fugle* 3/1991) er der sket adskillige ændringer, og det er derfor på tide med en revideret liste. Den aktuelle liste over de arter og racer, som skal godkendes af SU før de kan publiceres i DOFs publikationer, er gengivet herunder og gælder fra og med 1998. Derudover skal SU behandle 1) nye arter og racer for landet; 2) usædvanlige forekomster for Færøerne og Grønland; og 3) forekomster som fænologisk eller på anden måde er usædvan-



Regionsinddelingen anvendt i denne artikel.
Geographical regions of Denmark used in this report.

lige for landet som helhed, f.eks. vinterfund af Hvepsevåge eller forårsfund af Sabinemåge. Endvidere behandler SU fund på opfordring fra blandt andet lokalrapporternes redaktioner, f.eks. af arter som er udgået af SU-listen, men som skønnes at være sjældne lokalt. I nærværende rapport har det været tilfældet med Kongeederfugl, Stellersand, Thorshane og Korttået Træløber fra Nordjylland, Sandterne fra Nordjylland og Sjælland, Topmejs fra Sjælland samt Sabinemåge fra Bornholm. Fremover er det imidlertid meningen at godkendte fund af den karakter ikke skal publiceres i SU-rapporterne, men i stedet i den landsdækkende årsrapport i DOFT og i lokalrapporterne.

Sjældenhedsudvalgets medlemmer

SU bestod frem til udgangen af 1996 af følgende: Erik Christophersen (sekretær), Jan Hjort Christensen, Henrik Haaning Nielsen, Ivan Olsen, Klaus Malling Olsen, Knud Pedersen (sekretær), Lars Paaby, Brian Rasmussen, Palle A.F. Rasmussen og Ole Thorup. Lars Paaby udtrådte af udvalget ved udgangen af 1996 og Ivan Olsen i efteråret 1997. Begge takkes for godt arbejde og mange gode og seriøse diskussioner. Som nyt medlem er Henrik Knudsen tiltrådt fra og med 1997.

For kritik og kommentarer til denne rapport takkes Rolf Christensen, Klaus Malling Olsen, Knud Pedersen, Brian Rasmussen og Ole Thorup. Den største tak rettes dog til de mange, der rapporterede deres observationer til SU og dermed skabte grundlaget for denne rapport.

Sjældenhedsudvalgets adresse er: Sjældenhedsudvalget, DOF, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V.

Liste over arter og racer som skal bedømmes af Sjældenhedsudvalget (SU-listen)

Sortbrynet Albatros	Sortvinget Braksvale	Sydlig Nattergal	Nordsanger
Kuhls Skråpe	Mongolsk Præstekrave	Rubinnattergal	Humes Sanger
Storskråpe	Ørkenpræstekrave	Blåstjert	Schwarz Løvsanger
Middelhavsskråpe	Sibirisk Tundrahejle	Isabellastenpikker	Brun Løvsanger
Lille Skråpe	Amerikansk Tundrahejle	Ørkenstenpikker	Vestlig Bjergløvsanger
Wilson's Stormsvaler	Steppevibe	Middelhavstenpikker	Brun Fluesnapper
Topskarv	Tyknæbbet Dværgryle	Nonnestenpikker	Azurmejse
Almindelig Pelikan	Rødhalsed Ryle	Stendrossel	Isabellatornskade
Krøttopped Pelikan	Hvidrygget Ryle	Vandredrossel	Brun Tornskade
Amerikansk Fregatfugl	Stribet Ryle	Gulddrossel	Rosenbrystet Tornskade
Amerikansk Rørdrum	Spidshalet Ryle	Naumanns Drossel/ Brundrossel	Sydlig Stor Tornskade
Dværghejre	Prærieløber	Rødstrubet/ Sortstrubet Drossel	Rødhovedet Tornskade
Nathejre	Langnæbbet Sneppeklire	Stribet Græshoppesanger	Rosenstær
Tophejre	Canadisk Kobbersnepe	Stor Græshoppesanger	Ørkendompap
Kohejre	Bartramsklire	Tamarisksanger	Mørkøjet Junco
Purpurhejre	Damklire	Vandsanger	Hvidstrubet Spurv
Sort Ibis	Stor Gulbenet Klire	Lille Rørsanger	Hvidkindet Værbling
Rødhalsed Gås	Gulbenet Klire	Buskrørsanger	Pileværbling
Amerikansk Pibeand	Terekklire	Lille Gulbug	Dværgværbling
Sortbrun And	Wilson's Svømmesnepe	Spottesanger	Gulbrystet Værbling
Blåvinget And	Stor Sorthovedet Måge	Sortstrubet Sanger	Brunhovedet Værbling
Halsbåndstrolodand	Lattermåge	Hvidskægget Sanger	Hætteværbling
Hvidøjet And	Bonapartemåge	Sorthovedet Sanger	Sort Trupial
Lille Bjergand	Rosenmåge	Ørkensanger	Gulhovedet Trupial
Brilleand	Ismåge		
Bøffelend	Rosenterne		
Ådselgrib	Brilletterne		
Gåsegrib	Sodfarvet Terne	Racer	
Slangeørn	Hvidskægget Terne	Sortbuget Knortegås <i>Branta bernicla nigricans</i>	
Steppehøg	Hvidvinget Terne	Amerikansk Krikand <i>Anas crecca carolinensis</i>	
Ørnevåge	Polarlomvie	Russisk Duehøg <i>Accipiter gentilis buteoides</i>	
Lille Skrigeørn	Steppehøne	Steppevåge <i>Buteo buteo vulpinus</i>	
Stor Skrigeørn	Østlig Turteldue	Islandsk Stor Kobbersnepe <i>Limosa limosa islandica</i>	
Steppeørn	Skadegøg	Sølvmåge <i>Larus argentatus cachinnans</i>	
Kejserørn	Sortnæbbet Gøg	Kumliens Måge <i>Larus glaucoides kumlieni</i>	
Dværgørn	Gulnæbbet Gøg	Lomvie <i>Uria aalge hyperborea</i>	
Høgeørn	Dværghornugle	Hvidbrystet Slørugle <i>Tyto alba alba</i>	
Eleonorafalk	Sneugle	Sorthovedet Gul Vipstjert <i>Motacilla flava feldegg</i>	
Lille Tårnfalk	Høgeugle	Gærdesmutte <i>Troglodytes troglodytes fridariensis</i> og/eller <i>hirtensis</i> og/eller <i>borealis</i>	
Amerikansk Tårnfalk	Spurveugle	Sydlig Blåhals <i>Luscinia svecica cyanecula</i>	
Slagfalk	Rødhalsed Natrav	Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl <i>Saxicola torquata maura</i> og/eller <i>stejnegeri</i>	
Jagt falk	Ørkennatrav	Gærdesanger <i>Sylvia curruca blythi</i>	
Tjur	Alpesejler		
Lille Rørvagtel	Grøn Biæder		
Dværgrørvagtel	Ellekrage		
Lille Sultanhøne	Mellemflagspætte		
Jomfrutrane	Tretået Spætte		
Dværgtrappe	Korttået Lærke		
Kravetrappe	Klippesvale		
Stortrappe	Rødrygget Svale		
Stylteløber	Taigapiber		
Triel	Citronvipstjert		
Ørkenløber	Sibirisk Jernspur		
Rødvinget Braksvale	Alpejernspur		
		Iagttagelser af fugle, der ikke er bestemt til art, behandles sædvanligvis ikke, men i hvert fald følgende undtagelser gælder dog:	
		Braksvale	
		Tundrahejler	
		Sneppeklirer	

Systematisk gennemgang af de godkendte sager *Accepted records*

Islom *Gavia immer* (-,189,-,-)

1987: 15.5, Nordstrand, Skagen (NJ), ad. sdr. trk., AB.

Fund efter 1990 skal ikke forelægges SU.

Kuhls Skråpe *Calonectris diomedea* (0,21,2,1)

1995: 8.4, Gilleleje (S), trk., TEO,MH. – 30.9, Korshage, Rørvig (S), trk., JB,PCC,HVR.

1996: 1.9, Roshage, Hanstholm (NJ), trk., EHS, OGJ,HL.

Fundet fra april 1995 er usædvanligt, idet arten på dette tidspunkt normalt opholder sig ved ynglepladserne i Atlanterhavet og Middelhavet. Med de to fund fra 1995 er arten nu truffet 6 gange ved Sjællands nordkyst siden 1981, og antallet af Kattegat-fund er oppe på 38, idet arten i perioden 1976-1995 tillige er truffet hele 32 gange ved den svenske vestkyst (Risberg 1990, Cederroth 1996). Til sammenligning foreligger der kun 5 godkendte fund fra tre klassiske og velbesøgte havfuglelokaliteter ved den jyske vestkyst, Skagen (2), Hanstholm (2) og Blåvand (1).

Storskråpe *Puffinus gravis* (2,9,2,0)

1995: 14.1, Klintebjerg, Klint (S), SP,GeG. – 24.9, Blåvands Huk (RB), trk., FF,HKn m.fl.

Januarfundet er det fjerde danske vinterfund; de tre tidligere er ligeledes fra januar og fra de indre danske farvande. Fordelingen af de øvrige 9 fund, alle fra den jyske vestkyst mellem Skagen og Rømø, er september 4, oktober 4 og november 1.

Middelhavsskråpe *Puffinus yelkouan*

(1,11-12,4,2)

1988: 9.10, Blåvands Huk (RB), trk., FF,JG, JNS.

1995: 21.7, Blåvands Huk (RB), trk., LS,MB. – 22.8, Blåvands Huk (RB), trk., THH,MB. – 26.8, Roshage, Hanstholm (NJ), trk., RoC,OGJ,EHS,JP, MLu,FLu. – 16.9, Vejlbj Klit (RK), trk., OA, GM,JN,AKV,BD.

1996: 30.9, Grenen, Skagen (NJ), RoC. – 6.10, Hirtshals Fyr (NJ), 2 eks. trk., AØ.

Forekomsten ved Hirtshals Fyr 6.10 1996 regnes som ét fund. De to fugle kom trækkende sammen, og fundet er det første herhjemme med mere end ét individ involveret.

Arten træffes stadig hyppigere i landet, og inden for den seneste tiårsperiode er der nu fund fra 1987 (1), 1988 (4), 1990 (2-3), 1991 (2), 1995 (4) og 1996 (2).

De to eneste fund før 1987 er omtalt med fejlagtige data i Olsen (1989, 1992). De korrekte funddata er 3.9 1910 Febbersted Strand, Vigsø Bugt, Nordjylland (Salomonsen 1963) og 6.8 1979 Ølsemagle Revle, Sjælland (Pedersen 1982). Den tidsmæssige fordeling af de danske fund er herefter maj 1, juli 3, august 6-7, september 6 og oktober 2. Bortset fra fundet ved Ølsemagle Revle i 1979 er alle fund fra den jyske vestkyst mellem Skagen og Blåvand.

Alle danske fund må henføres til den vestlige middelhavsrace *mauretanicus* (Balearisk Skråpe).

Topskarv *Phalacrocorax aristotelis*

(-,24 f.o.m. 1984,1,3)

1995: 25.3, Gilleleje (S), 3K+, ARE,PBH.

1996: 16.1, Gilleleje Havn (S), 3K+, JC. – 17-18.2, Skagen Havn (NJ), 3K, RoC. – 16.12, Asaa Havn (NJ), 3K+, SØS.

Med tanke på, at arten overvintrer regelmæssigt langs den nordlige del af den svenske vestkyst, optræder den stadig forbavsende fåtalligt herhjemme.

Nathejre *Nycticorax nycticorax* (4,13,0,1)

1996: 17.8-7.10, Haslund Krat (RB), 1K, JLe, OT.



Kohejre, ad. i vinterdragt, Ove Sø november 1995. Foto: Karsten M. Andersen.

Kun det andet efterårsfund siden 1965; det første var Skallingen (RB) 9-11.11 1987 (Olsen 1988). Fordelingen af de øvrige fund siden 1965 er januar 1, april 3, maj 5 og juni 3.

Koehjre *Bubulcus ibis* (3,3,1,0)

1995: 28.10-28.11, Sydthy (NJ), ad. vdr., WM, HVC,LRT,JCS,KMA.

Det fjerde danske fund siden 1989; de tre øvrige er fra 1903 og 1934 (2) (Salomonsen 1963). Den aktuelle fugl blev under sit lange ophold set på flere lokaliteter omkring Ovesø i Sydthy, som beskrevet af Mardal (1996).

Purpurhøjre *Ardea purpurea* (8,8,1,0)

1994: 11.9, Nors Sø (NJ), ad., JJA,KaB.

1995: 29.5, Magisterkøgen (SJ), ad., HHA.

De første fund siden 1989.

Sort Ibis *Plegadis falcinellus* (13,13,0,0)

1940: 13.11, Frijsenvang, Søborg Sø (S), 1K, skudt, via JC.

Fuglen findes udstoppet på Gilleleje Museum i Nordsjælland.

Blisgås *Anser albifrons*

Med karakterer svarende til Grønlandsk Blisgås ssp. *flavirostris* (1,36,3,-):

1952: 15.10, Færgelandsgården, Nakskov (LF), ad., skudt, via PL.

1994: 14.1, Værmengene (RK), ad., HHN,HKn.

1995: 1.1, Bygholm Vejle (NJ), 2K, HHN,JRP. – 21.4, Margrethe Kog (SJ), 2 ad. og 9 2K+, PAFR. – 21.11-12.12, Yder Bjerrum, Vester Vedsted (RB), 4 ad., OT,LMR,TT.

Fundet fra 1952 er landets første; fuglen var ringmærket 22.7 1949 i Sarqaqdalen, Ilulissat i Vestgrønland (Peter Lyngs i brev).

Racen er udgået af SU-listen fra og med 1996. Den er gennem hele SU-perioden registreret med tiltagende hyppighed som træk- og vintergæst mellem medio oktober og medio maj. Før 1980 var der kun 6 fund, mens der med undtagelse af 1981, 1982 og 1987 har været 1-5 fund hvert år siden. Racen optræder dog næsten udelukkende i Nord- og Vestjylland, mens der fra det østlige Jylland blot er 3 fund og fra øerne 5 fund (Sjælland 3, Lolland 1, Møn 1). Ud over ovennævnte flok på 11 i Margrethe Kog i 1995 har de største flokke herhjemme været 7.1 1972 11 Bygholm Vejle (Andersen et al. 1973) og 20.3 1994 10 Bøvling Klit (Rasmussen 1996).

Racen er kun to gange registreret uden for perioden medio oktober – medio maj: 6.8 1980 Als, Sønderjylland (Pedersen 1984) og 11.8 1984 Ulvshale, Møn (Boertmann et al. 1986). I begge tilfælde kunne der være tale om undslupne fangensksfugle. Imidlertid er sommerfund af f.eks. Kortnæbbet Gås *Anser brachyrhynchus* og Almindelig Blisgås *Anser albifrons albifrons* ikke ualmindelige herhjemme, så spontan optræden i sommermånederne af Grønlandsk Blisgås kan ikke udelukkes.

Begge augustfund er derfor medtaget i opsummeringen, hvilket ikke tidligere var tilfældet med fundet fra 1980 (se Pedersen 1984).

Dværggås *Anser erythropus* (30,47,5,2)

1994: 18.11-1.12, Arup Vejle og Tovsig, Tømmerby Fjord (NJ), ad., halsbåndmærket, DN, MLu,HHN,FHN.

1995: 25-26.1 og 13-25.4, Arup Vejle (NJ), ad., halsbåndmærket, DN,MLu,HHN,FHN. – 22.4, Ballum Sluse (SJ), ad., MBH,MMH. – 8.5, Lund Fjord (NJ), ad., DN,TE. – 31.8-11.10, Vest Stadil Fjord (RK), ad., FH,OA. – 20.10, Filsø (RB), ad., TVN m.fl. – 17.10, 12.11 og 23.11, Sjørring Sø (NJ), ad., RoC,DN,ECB,HHN. – 18-19.11, 3.12, 10.12 og 14.12, Gunderslevholm, Sydvestsjælland (S), ad., TBR,MJB,TEO,MF,PeK,JHC.

1996: 20.1, Sjørring Sø (NJ), DN. – 11.2 og 25.2, Sallerup og Sværdborg, Sydsjælland (S), ad., farveringmærket, JHC m.fl. – 18.2, Avnøgård, Avnø (S), ad. KMO,JES. – 6-27.3, Læsvig og Arup Vejle (NJ), ad., HHN,ECB,DN.

Arten er udgået af SU-listen fra og med 1997. Den forekommer nu regelmæssigt i landet som træk- og vintergæst, hyppigst i Nord- og Vestjylland og i Sydvestsjælland, og siden 1980 har der årligt været 1-6 fund. Den hyppigere optræden skyldes givetvis udsætningsprojekter i Sverige og Finland (se endvidere Rasmussen 1996).

Den halsbåndmærkede fugl i Vejlerne i november 1994 var den samme, som sås der frem til april 1995, og denne fugl er også godkendt fra 1993 (Frich & Nordbjærg 1995). Det var også én og samme fugl, som i 1995 først sås ved Vest Stadil Fjord 31.8-11.10 og siden ved Filsø 20.10, og endelig var fuglen ved Sjørring Sø i Thy i oktober-november 1995 den samme, som sås samme sted i januar 1996 og senere i Vejlerne i marts 1996.

Knortegås *Branta bernicla*

Med karakterer svarende til Sortbuget Knortegås ssp. *nigricans* (0,3,1,0):

1995: 21-22.12, Yder Bjerrum, Vester Vedsted (RB), ad., OT,TT,LMR,KO,HKn,OA,JHj.

Fjerde danske forekomst af denne race fra arktisk Nordamerika og det østlige Sibirien. De tre tidligere fund er fra 1983 (2) og 1992. Alle fund er fra Sydvestjylland. Racen optræder regelmæssigt på de Britiske Øer og i Holland, hvor den til og med 1995 er truffet henholdsvis 69 og 67 gange (Rogers et al. 1996, Wiegant et al. 1997). I Sverige er den truffet 5 gange, senest i 1994 (Cederroth 1995).

Rødhalsset Gås *Branta ruficollis* (8,16,2,1)

1995: 22.4 og 4.5, Margrethe Kog (SJ), 2 eks., TA,TWJ,MBH. – 17.10, Filsø (RB), ad., MBH.

1996: 18.10, Dovnsklint, Langeland (F), trk., THH m.fl.

Amerikansk Pibeand *Anas americana* (0,2,3,1)

1995: 24.2, Fjand Grønne, Nissum Fjord (RK), ad. ♂, OA. – 27.3 og 7.4, Geddal Enge, Geddal (RK), ad. ♂, TF,JRa,KO. – 28-29.4, Bygholm Vejle (NJ), ad. ♂, HHN,MLu,DN,FHN.

1996: 15.4-12.5, Sønderland, Rømmø (SJ), ad. ♂, OT,TT,LMR,MBH,HHH.

Iagttagelserne fra 1995 kunne vedrøre den samme fugl, men de regnes dog her som tre fund. Fuglen i 1996 var i selskab med en hun. Der var divergerende opfattelser af farven på denne huns vingeunderside, men fuglens udseende i øvrigt afveg ikke fra en hun af Pibeand *Anas penelope*, så SU mener ikke, at den kan artsbestemmes med sikkerhed.

Krikand *Anas crecca*

Med karakterer svarende til Amerikansk Krikand ssp. *carolinensis* (0,7,1,2):

1995: 15-18.4, Hovvig, Rørvig (S), ad. ♂, HJ, PCC.

1996: 16-17.4, Hjortlund Hede, Grindsted (RB), KBC,SOC. – 23.4, Værnsande (RK), ad. ♂, OA, KO,JHj. – 27.4, Egensedybet, Odense Fjord (F), ad. ♂, SPE.

Sidstnævnte fugl var givetvis undsluppet fra et nærliggende fuglehold tidligere på året (Sten Pedersen i brev), så fundet er ikke med i opsummeringen. De 10 godkendte danske fund er fordelt med april 7, maj 2 og juni 1.

[Sibirisk Krikand *Anas formosa*]

1995: 10-11.4 og 13.4, Bygholm Vejle (NJ), ad. ♂, FHN,DN,MLu,EDJ,KP.

Første danske fund af denne art fra det østlige Sibirien, som er truffet adskillige gange i Europa. Arten er imidlertid almindelig i fangenskab, og ingen af de nyere europæiske fund betragtes som spontane. Den danske fugl var helt sikkert undsluppet fra fangenskab, idet den var mærket med farveringe på begge ben.

Blåvinget And *Anas discors* (1,7,1,0)

1972: 25.8, Årø, Lillebælt (SJ), 2K ♂, skudt, via PAFR.

1995: 7.5, Trillen, Høruphav, Als (SJ), ad. ♂, BN.

Fundet fra 1972 er omtalt af Olsen (1992), men er først nu blevet godkendt af SU. Den pågældende fugl var ringmærket som pull. 26.7 1971 ved Sackville, New Brunswick i Canada. Fundet fra 1995 er det første fra Sønderjylland.

Hvidøjet And *Aythya nyroca* (8,15,0,0)

1994: 29.10-7.11, Stege Sukkerfabrik (M), ad. ♀, NN m.fl.

Et godkendt fund af en hun fra samme lokalitet 5-17.9 1993 (Frich & Nordbjærg 1995) kunne være samme fugl som den ovennævnte, der dog her er regnet som et særskilt fund.

Kongeederfugl *Somateria spectabilis*

1995: 2.12-1.1 1996, Bulbjerg (NJ), ♀, HHN, ECB.

1996: 28.5-20.6, Hirsholmene (NJ), ad. ♂, LHM m.fl. – 24.10, Nordstrand, Skagen (NJ), ad. ♂ trk., EC.

Fund efter 1992 skal ikke forelægges SU. De ovennævnte fund er imidlertid behandlet på opfordring fra den nordjyske lokalrapports redaktion.

Stellersand *Polysticta stelleri*

1995: 3-13.6, Kringelrøn, Læsø (NJ), ad. ♂, EC, DW.

Fund efter 1990 skal ikke forelægges SU, men det pågældende fund er behandlet på opfordring fra den nordjyske lokalrapports redaktion.

Brilleand *Melanitta perspicillata* (0,12,1,1)

1995: 13.5, Bulbjerg (NJ), 2K ♂, HBJ m.fl.

1996: 7.6, Blåvands Huk (RB), 2K+ ♂, MJO.

De første danske fund fra henholdsvis maj og juni.

Bøffelend *Bucephala albeola* (0,0,1,0)

1995: 18.6, Bognæs, Roskilde Fjord (S), 2K+ ♀, JEr m.fl.

Første danske fund af denne art fra Nordamerika, som flere gange tidligere er truffet i Europa, bl.a. i Island, Frankrig, og på de Britiske Øer (Alström et al. 1991). Den er dog almindelig som fangenskabfugl, så flere af fundene kan sagtens vedrøre undslupne fugle. SU har imidlertid valgt at betragte det danske fund som spontant på lige fod med fund af de fleste andre nordamerikanske andefuglearter.

Slangeørn *Circaetus gallicus* (-,15,1,1)

1995: 12.6, Toreby, Lolland (LF), RR via UBN.

1996: 6.10, Risskov, Århus (ÅH), trk., FR.

Fuglen fra 1995 blev fundet afkræftet og indleveret til en plejecentral i Toreby på Lolland, hvor den kort efter døde; den indgår nu i samlingen på Zoologisk Museum i København. Fundet fra 1996 er det første fra oktober; de øvrige fire efterårsfund er fra perioden 20.8-21.9.

Steppehøg *Circus macrourus* (15,51,2,0)

1994: 30.8, Vestamager (S), ad. ♂, MLJ,HO.

1995: 26.4, Nordstrand, Skagen (NJ), 2K, trk.fors., EC m.fl. – 7.5, Pomlerende, Østmøn (M), 2K, PSH,PRa,HN,APR.

Musvåge *Buteo buteo*

Med karakterer svarende til Steppevåge ssp. *vulpinus* (1,2,0,1):

1996: 7.6 og 10.6, Skagen (NJ), ad., rød type, trk.fors., KP,HKn,RoC,HM m.fl.

De tre tidligere danske fund er kommenteret af Olsen (1992), det første dog med fejlagtige data. Korrekt er

10.9 1912, Helsingø, Nordsjælland (Salomonsen 1963). De andre to er fra Hesselø 16.4 1963 (Dyck et al. 1970) og Skagen 1-10.6 1972 (Andersen et al. 1973).

Ørnevåge *Buteo rufinus* (1,4,0,1)

1996: 12-15.8, Blåvands Huk (RB), 1K, PN,JTL m.fl.

Arten er tidligere truffet herhjemme i december 1892, august 1978 samt i maj 1985, 1986 og 1991 (Olsen 1992). Selv om arten er i tilbagegang i størstedelen af det europæiske udbredelsesområde (Tucker & Heath 1994), er den i fremgang i dele af Sydøsteuropa. Blandt andet har en mindre bestand etableret sig i Serbien siden 1990, og den spreder sig mod nordvest. Arten har endvidere optrådt regelmæssigt, og i stigende antal, i Østrig og Ungarn siden starten af 1980'erne, og i Ungarn har enkelte par tillige ynglet fast siden 1993. De nyere danske fund kan sikkert betragtes i denne sammenhæng.

Lille Skrigeørn *Aquila pomarina* (10,61-63,4,1)

1995: 19.5, Skagen (NJ), imm. trk.fors., EHS. – 27.8, Rosenvold, Vejle Fjord (VE), ad./imm. trk., HP m.fl. – 13.9, Dueodde (B), trk.fors., JCh,ToE. – 15.9, Hyllekrog, Lolland (LF), ad./imm. trk.fors., MFJ,MJø,APe,MBG,KNF.

1996: 26.9, Gedser Odde (LF), imm. trk., JHC, KNN,JR,GeG.

Bortset fra to fund fra juli og ét fra november er arten ikke tidligere truffet i Jylland i andet halvår.

Stor Skrigeørn *Aquila clanga* (4,33,2,0)

1995: 22.4, Hellebæk Avlsgård, Hellebæk (S), imm. (antagelig 4-5K) trk., JE,SS m.fl. – 21.10, Kongelunden, Amager (S), ad., PB. – 23.10, Roskilde (S), ad. trk., LR.

De to sidstnævnte iagttagelser vedrører sandsynligvis samme individ og er betragtet som ét fund i opsummeringen. Sidste gang der blev gjort to fund i samme år var i 1989.

Høgeørn *Hieraaetus fasciatus* (1,1,1,0)

1957: september, Høgholt, Sindal (NJ), 1K skudt, via PAFR,EC.

1995: 2.5, Skagen (NJ), 2K trk.fors., KMO,KP m.fl.

Det hidtil eneste fund herhjemme var ved Skagen i 1974, hvor en adult fugl sås på trækforsøg 17-18.5 (Hansen 1976). Fundet fra 1957 er således landets første. Den pågældende fugl findes udstoppet i en privat samling. Fundet er tidligere omtalt af Møller (1978), men fejlagtigt som en Stor Skrigeørn og fra august 1970.

De danske forekomster er ganske overraskende, idet der kun kendes få andre fund fra Nord- og Vesteuropa, flest fra Nordfrankrig. Størstedelen har været juvenile fugle i september-oktober. I Holland er arten truffet to gange, senest i 1995, hvor en juvenil fugl sås 17-20.9 (Wiegant et al. 1997). Nogle af de nordvesteuropæiske

fund kan have været undslupne fangenskabsfugle, og blandt de danske fund må især det fra 1974 betragtes med skepsis, da adulte Høgeørne normalt er udprægede standfugle.

Eleonorafalk *Falco eleonora* (0,3,1,2)

1995: 24.5, Tipperne (RK), ad. lys fase trk., OT, KO.

1996: 8.6, Aborrebjerget, Møn (M), ad. lys fase trk., RS,HeC. – 14.8, Christiansø (B), ad. lys fase, THi,ML.

Tidligere er arten truffet herhjemme i 1987, 1988 og 1989. Alle danske fund har været af den lyse fase. Fundet fra 1995 er det første fra Jylland. I 1995 var der tillige to fund i Sverige, begge i maj (Cederroth 1996).

Jagtfalk *Falco rusticolus* (41,47,3,1)

1995: 17.9, Norsminde Fjord (ÅH), ad., OGJ, HL. – 18.9, Århus Centrum (ÅH), ad., OLi. – 5.11, Hullegård, Pedersker (B), 1K, HPS,HT m.fl. – 26.11, Bogø (M), ad. ♀, fundet død, SM via PAFR. – 30.12, Vidå Sluse (SJ), 1K, HHA.

1996: 16.4, Nordstrand, Skagen (NJ), ad. trk.fors., EHS. – 23.8, Bygholm Vejle (NJ), 1K, HHN.

Fundene fra september 1995 og august 1996 er udeladt af opsummeringen, idet der helt sikkert var tale om undslupne fangenskabsfugle; begge var forsynet med læderstropper eller lignende om benene.

Fuglen fra Bogø i november 1995 var ringmærket som pull. 1.7 1988 på en ikke nærmere angivet lokalitet i Sør-Trøndelag Fylke i Norge. Den blev fundet som skelet, og en sikker datering af fundet er derfor ikke mulig. Adulte fugle er usædvanlige herhjemme, og de eneste tidligere SU-godkendte fund af spontant optrædende adulte er fra Københavnsområdet i vintrene 1985 og 1989 (se Olsen 1988, 1991). Fra vinteren 1989 omtaler Olsen (1991) yderligere et fund af en adult fugl i Nordjylland, men aldersbestemmelsen af denne anses ikke længere som sikker.

Vagtel *Coturnix coturnix*

1995: 25.1 og 27-28.1, Hvide Sande (RK), EE.

Første danske vinterforekomst. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at det var en undsluppen fangenskabsfugl.

Jomfrutrane *Anthropoides virgo* (3,3,0,0)

1972: 28-30.4, Skagen (NJ), SA via RoC.

Fuglen, der optrådte påfaldende tillidsfuldt, kan muligvis spores til Zoologisk Have i Ålborg (Rolf Christensen i brev). Fundet betragtes derfor ikke som spontant og er ikke med i opsummeringen.

Stylteløber *Himantopus himantopus* (13,14,4,0)

1995: 8.5, Remmerslund Grusgrav, Hedensted (VE), TK,KBi,RBi. – 9.5, Galtkær mellem Brande

og Thyregod (VE), 2 eks., JM. – 10.5, Råbjerg Mile (NJ), 2 ad., SHP,RoC m.fl. – 3.6, Ulvshale Løb, Møn (M), 2 trk., HJe. – 3.6, Rødvig, Stevns (S), 2 ad. trk., JMP.

Fjerde år i træk med fund af denne art, og første år med mere end to fund. Alle de fire angivne iagttagelser af to fugle drejer sig måske om de samme fugle, men de er her regnet som særskilte fund, de to fra 3.6 dog kun som ét. To fund i Sverige kunne gælde de samme fugle: 11.5 2 eks. Båtafjorden i Halland og 12.5 2 eks. Hjertasjön (Cederroth 1996).

Triel *Burhinus oediconemus* (22,10,1,0)

1995: 21.5, Ræhr, Hanstholm (NJ), JJA.

Bortset fra en forekomst på Als i 1993 er alle danske fund siden 1970 fra Nordjylland.

Rødvinget Braksvale *Glareola pratincola* (2,8,3,0)

1971: 12.6, Værnengene (RK), Olsen (1992).

1995: 25.5, Solbjerg Engsø, Kagerup (S), FJe, JN. – 27-28.5, Skagen (NJ), trk.fors., MH,KP,EC m.fl. – 10-19.8, Ølseagle Revle (S), ad. odr., AP, SKR,JBr,MBH,IO.

Fundet fra 1971 har ikke tidligere været publiceret med korrekte data i en SU-rapport. Det blev oprindelig omtalt som en ubestemt braksvale (Jacobsen et al. 1971), og senere ukorrekt rettet af Hansen (1977).

Med tre fund er 1995 det hidtil bedste år for arten herhjemme; tidligere har der været to fund i 1986 og i 1987.


Fuglen ved Ølseagle Revle voldte en del bestemmelsesproblemer, men flere afgørende dragt karakterer fjerner enhver tvivl om identifikationen.

Rødvinget/Sortvinget Braksvale

Glareola pratincola/nordmanni (0,1,1,0):

1995: 3.6, Nordstrand, Skagen (NJ), trk., PSH.

Fuglen er muligvis identisk med den Rødvingede Braksvale, der blev set i Skagensområdet 27-28.5.



Amerikansk Tundrahøjle *Pluvialis dominica* (0,1,0,1)

1991: 19.8, Bygholm Vejle (NJ), ad. sdr., TS, JFA.

1996: 24.8, Neksø Sydstrand (B), ad. odr., AB m.fl.

De første danske fund af denne nordamerikanske art. Fundet fra 1991 har tidligere været publiceret som en ubestemt tundrahøjle *P. dominica/fulva* (Frich & Nordbjærg 1993), men er nu efter genbehandling godkendt som Amerikansk Tundrahøjle. Fundet fra Bornholm er dokumenteret med en videooptagelse.

Arten er truffet adskillige gange i Europa, blandt andet 8 gange i Sverige (senest i september 1995, Cederroth 1996) og knap 200 gange på de Britiske Øer, hyppigst i september (Rogers et al. 1996). De danske fund var derfor ikke helt uventede.

Sibirisk Tundrahøjle *Pluvialis fulva* (0,4,1,1)

1994: 7.9, Amtoft Vig (NJ), 1K, BB.

1995: 3.10, Nyord, Møn (M), 1K, OA.

1996: 26.7, Bygholm Vejle (NJ), ad. sdr., HHN, JRH.

Fuglene fra 1994 og 1995 er de første ungfugle herhjemme.

Amerikansk/Sibirisk Tundrahøjle *Pluvialis dominica/fulva* (0,3,1,0)

1995: 31.7, Skallingen (RB), ad. sdr. trk., KO.

Dværgryle *Calidris minuta*

1996: 16-17.2, Klintholm Havn (M), PBo via KNF.

Første godkendte danske vinterfund. De mindre rylearter er meget vanskelige at bestemme i ren vinterdragt, men på baggrund af god fotodokumentation kunne andre arter udelukkes i dette tilfælde.

Stribet Ryle *Calidris melanotos* (3,18,1,1)

1995: 4.5, Tipperne (RK), ad. ♀, OT,OA,JHj, HKn,KO.

1996: 12-13.5, Østerådal, Ålborg (NJ), antagelig ad. ♂, NHC,HC,WS.

Spidshalet Ryle *Calidris acuminata* (0,2,0,1)


1996: 1.10, Storefenner, Kongeåslusen (RB), 1K, OG,TAJ.

Det tredje danske fund; de to tidligere er begge fra Bygholm Vejle i Nordjylland i 1989: 16.8 ad. og 25.8 1K (Olsen 1992).

Prærieløber *Tryngites subruficollis* (1,8,1,3)

1995: 15-28.8, Indvindingen, Vester Vedsted (RB), ad., OT,TT,MC,PEJ,LMR.

1996: 17-21.5, Bygholm Vejle (NJ), 2 eks., dog kun 1 eks. 17.5, JFA m.fl. – 25.8, Ny Frederikskog



(SJ), HHA.

Forekomsten i Bygholm Vejle regnes som to fund, idet der var et par kilometers afstand imellem de to fugle, og de på intet tidspunkt sås sammen.

Langnæbbet Sneppeklire

Limnodromus scolopaceus (4,1,1,1)

1995: 13.9, Tipperne (RK), vdr. eller 1K trk., KO.

1996: 5-6.5, Sneum Sluse (RB), ad. sdr., FF m.fl. – 18.5, Sønderland, Rømø (SJ), ad. sdr., JMP m.fl.

Iagttagelserne fra Sneum Sluse og Rømø i 1996 menes at dreje sig om samme fugl, og de er derfor kun opsummeret som ét fund.

Arten er nu truffet tre år i træk herhjemme, idet der også er et godkendt fund fra 1994 (Rasmussen 1996). Det er ret overraskende, idet alle tidligere fund er fra før SU-perioden (se Rasmussen 1996). Arten forekommer imidlertid regelmæssigt i Europa, hyppigst om efteråret (Alström et al. 1991). F.eks. var der til og med 1995 gjort 10 fund i Sverige (Cederroth 1996) og 190 fund på de Britiske Øer (Rogers et al. 1996).

Langnæbbet/Kortnæbbet Sneppeklire

Limnodromus scolopaceus/griseus (0,3,0,1)

1996: 23.4, Gilbjerg Hoved (S), ad. sdr. trk., JC, BR m.fl.

De tre tidligere fund af ubestemte sneppeklirer er fra 1981 (2) og 1983.

Stor Kobbersnepe *Limosa limosa*

Med karakterer svarende til Islandsk Stor Kobbersnepe ssp. *islandica* (0,0,1,0):

1995: 8.5, Sdr. Farup Klæggrav, Vester Vedsted (RB), 2 ♂♂ i sdr., OT.

Første danske fund af denne race, der yngler i Island og fåtalligt i Nordnorge, og som overvintrer på de Britiske Øer og langs Frankrigs og den Iberiske Halvøes atlantehavskyst (Cramp & Simmons 1983). I Holland optræder racen nu som en regelmæssig træk- og vintergæst, mens

der kun er én anerkendt forekomst fra før 1984 (Scheepen & Oreel 1995). Meltofte (1993) antyder, at racen kan være overset herhjemme, og udviklingen i Holland bestyrker denne opfattelse.

Damklire *Tringa stagnatilis* (0,28,4,4)

1995: 23-26.4, Vejlen, Tåsinge (F), ad. sdr., PVR, THH, TH. – 3-4.6, Geddal Enge, Geddal (RK), LN, HRS, KO, OA, JHj. – 28.6, Haldager Vejle (NJ), ad. sdr., PAFR. – 16.7, Aflandshage, Amager (S), SKR.

1996: 23.4, Vestamager (S), JBJ. – 24-25.4, Bøtø Nor (LF), ad. sdr., JeD, OJ, AS. – 11.6, Selsø Sø (S), PeK, JeP. – 9-11.8, Vorsø Vejle, Horsens Fjord (VE), 1K, JeG, MEN.

Hvidklire *Tringa nebularia*

1995: 18-19.2 og 23.2, Rettrup Kær, Rettrup (NJ), GM, HRS.

Første godkendte danske vinterforekomst.

Tereklire *Xenus cinereus* (2,19,0,1)

1996: 11.5, Sønderland, Rømø (SJ), OT, HO.

En ret tidlig forekomst, idet kun ét af 11 tidligere fund i første halvår er gjort før 25.5: 12-15.5 1967 Salthammer Rev på Bornholm (Dyck et al. 1970). I Sverige ses de fleste forårsfugle også efter medio maj (Cederroth 1995).

Thorshane *Phalaropus fulicarius*

1996: 21.5, Nordstrand, Skagen (NJ), ad. sdr. trk., MJB m.fl.

Arten er ikke på SU-listen. Forårsfund er imidlertid usædvanlige, og ovennævnte fund er behandlet på opfordring fra den nordjyske lokalrapports redaktion.

Lattermåge *Larus atricilla* (0,3,1,1)

1995: 1-18.7, Langli, Ho Bugt (RB), ad. sdr., JT, EDJ.

1996: 12.5 og 16.5, Nørreland, Rømø (SJ), ad. sdr., RC, MBH, HHA, MC, EK, BC.

Denne nordamerikanske mågeart er tidligere kun truffet i landet i 1985 (2 fund) og 1988 (Olsen 1987, 1989, 1991). De to aktuelle fund blev gjort i ynglekolonier af Hættemåge *Larus ridibundus* og kan evt. vedrøre det samme individ.

Sabinemåge *Larus sabini*

1995: 1.10, Galløkken, Rønne (B), ad. sdr., ESB, JCh.

Første fund fra Bornholm. Arten er ikke på SU-listen, men et fund på Bornholm er afgjort usædvanligt, og tilsvarende fund bør også fremover behandles af SU.

Bonapartemåge *Larus philadelphia* (0,1,1,0)

1995: 7.11-3.12, Hirtshals Havn (NJ), 2K, AØ m.fl.

Blot det andet danske fund; det første var ved Skagen 13-15.8 1988 (Olsen 1989, Frich & Nordbjærg 1992). Et par uger efter at fuglen i Hirtshals forsvandt, dukkede en fugl med en lignende dragt op på den anden side af Skagerak, 17.12 1995-20.4 1996 Lista, Vest Agder i Sydnorge (Gantlett 1996, 1997). Dermed fik også Norge sit andet fund.

Rosenmåge *Rhodostethia rosea* (1,5,1,0)

1995: 17.5-21.6, Nordstrand, Skagen (NJ), 3K+ vdr., TB, RoC m.fl.

Tredje år i træk med fund af denne højarktiske art. Fuglens kondition blev stadigt ringere under opholdet ved Skagen, og 11.7 blev den fundet død på Nordstrand.

Sandterne *Gelochelidon nilotica*

1994: 29.5, Korshage, Rørvig (S), ad., EVR.

1995: 24.4, 2 ad. trk., Spodsbjerg Fyr (S), MJ, ÅKM, FI, MT, MS. – 7.8, Hovvig, Rørvig (S), ad. sdr. trk., AF.

1996: 6.6, Østerild Fjord (NJ), ad. trk., HHN.

Arten er ikke på SU-listen, men de pågældende fund er behandlet på opfordring fra lokalredaktionerne.

Hvidskægget Terne *Chlidonias hybridus*

(0,11,1,0)

1995: 29.8, Lådden Mose, Broager, Als (SJ), ad. odr., PNG, JeC.

Første augustfund. Fordelingen af de øvrige fund er maj 6, juni 3 og oktober 2.

Hvidvinget Terne *Chlidonias leucopterus*

(3,46,3,4)

1995: 2.8, Ølseagle Revle (S), 1K, KT, CG. – 13.8, Margrethe Kog (SJ), ad. odr., FF, SOP, KBC. – 9-12.9, Selbjerg Vejle (NJ), 1K, HHN, ECB, DN.

1996: 24.6, Stege Sukkerfabrik (M), ad. odr., PeK, MF. – 1.8, Margrethe Kog (SJ), 2 ad. odr., MBH, HP. – 18-23.8, Glombak, Vejlerne (NJ), 1K, HHN, TVN. – 24.8, Præstø Fed (S), 1K trk., JHC

m.fl. – 26.8, Hanvejle og Lund Fjord (NJ), 1K, JB. Iagttagelserne fra Vejlerne i august 1996 drejer sig om samme fugl, så de er kun opsummeret som ét fund.

Polarlomvie *Uria lomvia* (5,3,1,0)

1995: 17-19.1, Hirtshals Havn (NJ), EC m.fl.

Det første nordjyske fund. Det eneste tilsvarende fund herhjemme gjaldt en rastende fugl i Hundested Havn på Sjælland 10.12 1989 (Olsen 1991). De to øvrige fund siden 1965 var henholdsvis en dødfunden fugl ved Blåvands Huk i 1974 (Pedersen 1980) og en fugl observeret fra skib mellem Hanstholm og Kristianssand i 1991 (Frich & Nordbjærg 1993). Fundene før 1965 drejer sig om indsamlede individer fra de indre danske farvande, og de er alle fra før 1926 (Salomonsen 1963).

I Sverige var der til og med 1995 23 fund, heraf 11 siden 1976; de seneste var 3 fund i 1995. Flere af de svenske fund er fra Nordsværiges indland, andre fra Østersøen (Risberg 1990, Cederroth 1996).

Skadegøg *Clamator glandarius* (3,1,1,0)

1995: 4.5, Sølsted Mose (SJ), ad., ML.

Første danske forekomst siden 1979 og det første forårsfund. Fundet fra 1979 er i øvrigt omtalt med forkert årstal af Olsen (1992); den korrekte angivelse er 30.8-2.9 1979 (Pedersen 1982, 1984).

Slørugle *Tyto alba*

Med karakterer svarende til nominatformen ssp. *alba* (0,1 ud over invasionen 1990/91,1,1,1):

1995: ca 10.5-23.6, Skagen (NJ), ♀, PM, PRA, PSH, RoC.

1996: 20.12, Bindslev (NJ), fundet død, TD via KP.

De to aktuelle forekomster af nominatformen kan, som de tidligere fra 1990 (3), 1991 og 1992, rimeligvis sættes i forbindelse med den invasionsagtige optræden af Slørugle fra efteråret 1990 til foråret 1991 (se Laursen 1997). Fra denne invasion har SU yderligere samlet fået forelagt i alt 14 forekomster af nominatformen, men det har ikke været muligt at tage stilling til disse fund enkeltvis på grund af dokumentationsformen. SU har imidlertid godtaget fundene *en bloc* som en del af den samlede invasion i 1990-1991. For overskuelighedens skyld er de fire tidligere godkendte forekomster fra 1990-1991 nu fjernet fra opsummeringen, så denne nu kun omfatter fund ud over invasionsårene.

Laursen (1997) omtalte et tilsyneladende overset fund af nominatformen fra Lolland i 1952, som ville være landets første. Salomonsen (1963) kendte imidlertid dette fund, men anerkendte det ikke.

Stor Hornugle *Bubo bubo*

1994: ynglefund, nordlige del af Ringkøbing Amt (RK), EØ.

1995: ynglefund, nordlige del af Ringkøbing Amt (RK), EØ. – ynglefund, sydlige del af Ringkøbing Amt (RK), EE. – ynglefund, Himmerland

(NJ), TS,TC,LBJ. – ynglefund, Østhimmerland (NJ), TC,BKn,PKn. – 11.7 og 25.7, Tårs, Vendssysel (NJ), LHM,TLA. – 27.11, Tofte Skov (NJ), ad. fundet trafikdræbt, TC,BKn,PKn.

Ynglefundene i 1994 og 1995 i den nordlige del af Ringkøbing Amt er fra den samme lokalitet, og det har givetvis drejet sig om samme par begge år. Tilsvarende er der fra lokaliteten i den sydlige del af Ringkøbing Amt tidligere godkendt et ynglefund fra 1994 (Rasmussen 1996). Fundene fra Nordjylland er de første herfra i forbindelse med genindvandringen.

Arten udgik af SU-listen for Sønderjyllands og Ribe Amter fra og med 1992 og for hele landet fra og med 1996. Stor Hornugle findes nu ynglende i praktisk taget hele Jylland syd for Limfjorden, mens den endnu ikke er rapporteret fra øerne. Siden 1984, hvor det første ynglefund blev gjort herhjemme i forbindelse med genindvandringen, er bestanden vokset til 25-30 par, heraf 10-12 par i Sønderjylland (Frikke & Tofft 1997). Kun en mindre del af disse ynglefund er behandlet af SU, men genindvandringen er dokumenteret i Frikke & Tofft (l.c.) og gennem upublicerede data fra projekt *Fuglenes Danmark*.

Sneugle *Nyctea scandiaca* (-,24,1,2)

1995: 28.5, Hammeren (B), antagelig ad. ♀, JCh,JK.

1996: 25.3, Ålbæk Klitplantage (NJ), 2K ♀, LC,EC,RoC,KP. – 7.4, Nordstrand, Skagen (NJ), 2K ♀, OA,PHK m.fl.

Fundet fra 1995, som er usædvanlig sent, er det første på Bornholm i SU-perioden. Det kan ikke udelukkes, at der kun var tale om ét individ på Skagen Odde i 1996, men iagttagelserne er her regnet som to fund.

Høgeugle *Surnia ulula*

(ca 30,31 ud over invasionen i 1983/84,1,0)

1995: 30.11 samt 2.2 og 8.3 1996, Mårum Station, Gribskov (S), MBH m.fl.

Fuglen var stationær gennem længere tid, men er kun dokumenteret for de ovennævnte datoer.

Alpesejler *Apus melba* (3,20,1,0)

1995: 27.7, Skagen (NJ), trk.fors, RoC m.fl.

Ellekrage *Coracias garrulus* (-,19,1,0)

1982: 18-26.5, Hajstrup, Bylderup-Bov (SJ), KF m.fl.

1988: 5.6, Østerlars (B), HT,HTM.

1995: 31.5-3.6, Kærgårdsmølle, Struer (RK), GM m.fl.

Fundet fra 1982 er Sønderjyllands første. Fundet fra 1995 er det første i landet siden 1990.

Korttået Lærke *Calandrella brachydactyla*

(1,14,2,3)

1995: 23.4, Korshage, Rørvig (S), trk., JB,JHC, HVR. – 17-18.10, Agger Tange (NJ), FF m.fl.

1996: 18-19.5, Christiansø (B), THi,HH,CH, JFR. – 6.10, Korshage, Rørvig (S), trk., EVR. – 31.12-21.1 1997, Gammelgab, Broagerland (SJ), MJe,OJe.

Fundet på Broagerland i 1996, som er fotodokumenteret, er det første danske vinterfund.

Rødrygget Svale *Hirundo daurica* (4,26,1,3)

1995: 23.4, Ræhr, Hanstholm (NJ), TA,TWJ.

1996: 25.4, Svstrup Bro, Gudenå (ÅH), ORK. – 8.5, Elling Å, Frederikshavn (NJ), trk., EHS. – 26.5, Busene, Møn (M), trk., TA,GeG,TWJ,TJ.

Et fund fra 1973 anerkendes efter genbehandling ikke længere, og opsummeringen er derfor ændret.

Bjergpiber *Anthus spinoletta* (0,4,6,5)

1989: 5.1, Køge Havn (S), vdr., TWJ,GeG.

1990: 25.3, Værnengene (RK), sdr., HKn,JPe.

1994: 22-24.2, Solbjerg Enge, Kagerup (S), vdr., JC,SN,NK,JMP. – 28.11, Bygholm Vejle (NJ), vdr., HHN.

1995: 9-10.3, Bygholm Vejle (NJ), sdr., HHN, MLu,EDJ,FHN,DN. – 4.12-30.3 1996, Skagen (NJ), ≥10 eks. i vdr., RoC m.fl. – 14.12 og 16.12, Nordmandshage, Hals (NJ), 3 eks. i vdr., PAFR. – 14.12-8.3 1996, Bygholm Vejle (NJ), ≥59, HHN,ECB,DN. – 22.12-28.1 1996, Gravlev Ådal (NJ), ≥8 eks. i vdr., RoC,MBH,HM,THH. – 23.12-7.1 1996, Norsminde Havn (ÅH), 2 eks. i vdr., indtil 6.1 dog kun ét eks. OGI. – 25.12, Pøleåens udløb, Arresø (S), vdr., KMO.

1996: 27.1-9.3, Arup Vejle (NJ), ≥4 eks. i vdr., HHN,ECB,DN. – 6.2, Ølsemagle Revle (S), vdr., BR m.fl. – 13-14.2, Ålbæk Havn (NJ), vdr., JP. – 17.11, Korshage, Rørvig (S), vdr., EVR. – 13.11-18.2 1997, Skagen (NJ), ≥11 eks. i vdr., RoC, EC,KP m.fl.

Efter genbehandling anerkendes ingen af de tidligere godkendte forekomster. Fundet fra 1989 er hermed landets første. De efterfølgende fund, og især forekomsterne i de to seneste vintre, kunne antyde, at arten tidligere har været en overset vintergæst herhjemme. Omvendt kan det ikke udelukkes, at arten har udvidet sit overvintringsområde mod nord som følge af de mange milde vintre i de seneste år. I det sydlige Sverige er Bjergpiberen siden 1994 tilsvarende registreret som overvintrende med op til 19 individer på en enkelt lokalitet (Cederroth 1995, 1996). Desuden har den overvintret ret almindeligt i Slesvig-Holsten i hvert fald siden 1982 (Paulien & Jeromin 1995).

Alle de danske fund må regnes til racen *spinoletta*, som nærmest yngler i bjergegne i Mellemeuropa.

Gul Vipstjert *Motacilla flava*

Med karakterer svarende til Sorthovedet Gul Vipstjert ssp. *feldegg* (0,3,0,0):

1988: 3.4, Udholm Mose (NJ), 2 ♂♂, KK.

Det pågældende fund, som er fotodokumenteret, bliver landets første. De to andre fund er begge fra Vejlerne i Nordjylland: 9-11.6 1989 og 2.6 1992 (Frich & Nordbjærg 1993, 1995). Iagttagelsen fra 1988 er usædvanlig tidlig, da de fleste vesteuropæiske fund er fra maj-juni. Fra de Britiske Øer kendes dog enkelte aprilfund, det tidligste 13.4 (Evans 1994), og i Frankrig er racen truffet allerede i marts (Dubois & Yésou 1992).

Citronvipstjert *Motacilla citreola* (0,8,1,1)

1995: 26.5, Grenen, Skagen (NJ), 2 ♀♀, TWJ, JMP,CCT,HM,RoC m.fl.

1996: 9-12.8, Østerild Fjord (NJ), ad. ♀, HHN, TVN m.fl.

De første danske fund siden 1989. I sammenligning med f.eks. Sverige og England, hvor der til og med 1995 var henholdsvis 99 og 86 fund (Cederroth 1996, Rogers et al. 1996), er de i alt 10 danske forekomster overraskende få.

Sydlig Nattergal *Luscinia megarhynchos* (2,45,0,5)

1996: 23.4, Spodsbjerg Fyr (S), syng. og iagttaget, MT,FL. – 23.4, Blåvands Huk (RB), ad., ringm., PK,BJ,HKn. – 23-24.4, Vester Vedsted (RB), syng. og ringm., OT. – 29.4, Christiansø (B), 2K ringm., THi,HH. – 1.5 og 3.5, Blåvands Huk (RB), sandsynligvis 2K, aflæst 1.5 med hollandsk ring, PK,BJ.

Rubinnattergal *Luscinia calliope* (0,1,1,0)

1995: 30.10-2.11, Christiansø (B), 1K ♂ ringm. (30.10), PK,JC,MJB m.fl.

Landets andet fund. Det første var også fra Christiansø, 20.10 1985 1K ♀ ringm. (Olsen 1987). Et fund af en adult ♂ ved København i november 1990 regnes ikke som spontant på grund af fundomstændighederne og fuglens alder (se Frich & Nordbjærg 1992). Feltbestemmelse af arten og dens opræden i Europa, herunder spørgsmålet om spontanitet, er blandt andet behandlet af Barthel (1996). I øvrigt fik Tyskland sit første fund i 1995, 5-12.11 Helgoland (Heiser 1996).

Blåstjert *Tarsiger cyanurus* (0,2,0,2)

1996: 2.10, Ballum Sluse (SJ), ad. ♂, AaM, JMø. – 19.10, Christiansø (B), hunfarvet, MB, TN,THi.

Med kun to tidligere forekomster herhjemme (1976 og 1994) er to fund fra samme år meget overraskende. Fuglen ved Ballum Sluse blev videofilm. En adult han om efteråret er usædvanligt.



Rubinnattergal, 1K ♂, Christiansø 30. oktober 1995. Foto: Jan Hjort Christensen.

Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquata*

Med karakterer svarende til Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl ssp. *maura/stejnegeri* (2,21,1,2):

1995: 15.10, Christiansø (B), antagelig 1K ♂, PK,JC.

1996: 24-26.9, Blåvands Huk (RB), hunfarvet, HKn,BJ,JRP. – 19.10, Lyngvig Fyr, Holmsland Klit (RK), 1K, EE,ASF.

Middelhavsstenpikker *Oenanthe hispanica* (0,1,0,1)

1996: 30.6-18.8, Stevns Kridtbrud (S), ad. ♂, JNJ,GÆ,KMO,TWJ m.fl.

Andet danske fund; det første er fra Klintholm Havn på Møn 18.10 1990 (Frich & Nordbjærg 1995). Forekomsten ved Stevns i 1996 afviger på mange måder fra størstedelen af fundene i Nordvesteuropa, der er fra april-maj og september-oktober (Alström et al. 1991, Cederroth 1994), og et fund af en oversomrende adult han falder klart uden for det sædvanlige fundmønster. I England tilhører de fleste af de i alt 54 fund racen *hispanica* fra Sydvesteuropa og Nordafrika, mens fuglen ved Stevns havde karakterer svarende til racen *melanoleuca* fra Sydøsteuropa og Mellemøsten. Fundet er i øvrigt nærmere beskrevet af Olsen (1996).

Ørkenstenpikker *Oenanthe deserti* (0,2,1,0)

1995: 25-26.11, Sønderho, Fanø (RK), ♀, MJB, HHA m.fl.

Blot tredje danske forekomst. De to tidligere er begge fra 1987, 24-26.10 Sidselbjerg, Vest Stadil Fjord og 1-2.11 Ishøj Strand (Olsen 1988).

Nonnestenpikker *Oenanthe pleschanka* (0,3,0,0)

1992: 7.10, Christiansø (B), ♀, OLo,KC,JS, MFJ,PK,LPe.

Landets tredje fund. De to tidligere er begge fra 1991, 13.6 Skagen og 27.10-1.11 Christiansø (Frich & Nordbjærg 1993).

Stendrossel *Monticola saxatilis* (0,5,0,1)

1996: 19.5, Sose Odde, Bornholm (B), ♀, ÅA.
Første danske fund siden 1984 og det første af en hun.

Vandsanger *Acrocephalus paludicola* (9,10,2,0)

1995: 5.8, Ørum Sø, Thy (NJ), 1K ringm., WM.
– 10.8, Store Darum (RB), 1K ringm., JLe.

Bortset fra et enkelt julifund er alle danske forekomster fra perioden 6.8-8.10 (august 12, september 4, oktober 4). Ti af fundene er gjort i forbindelse med ringmærkning, og 8 er fyrfaldne fugle fra før 1925 (Salomonsen 1963).

Buskrørsanger *Acrocephalus dumetorum*

(0,20,1,1)

1995: 30.5, Christiansø (B), syng. og ringm., JC,PK.

1996: 9.6, Ellekrattet, Skagen (NJ), ringm., AJ, RoC,JMP m.fl.

To typiske fund. Med undtagelse af et fund fra 7.7 er alle tidligere danske forekomster således fra perioden 26.5-18.6. Størstedelen af fundene er fra Christiansø (10) og Skagen (6).

Hvidskægget Sanger *Sylvia cantillans* (0,25,2,1)

1995: 3.6, Højsandet, Rørvig (S), syng., KBj. – 6.6, Christiansø (B), ♂, MH,PK,MJB,JC.

1996: 30.7, Klitmøller (NJ), ♂, JJA.

Fundet fra Rørvig er det første på Sjælland. Julifundet er ret usædvanligt, for bortset fra et fund i september har alle andre danske forekomster været fra perioden 20.4-17.6.

Nordsanger *Phylloscopus borealis* (0,1,0,1)

1996: 18-20.9, Tipperne (RK), 1K, ringm. 18.9, MD,CS,HKn,JRP.

Andet danske fund; det første var 27.5 1988 Amager Fæled (Olsen 1989). I Vesteuropa optræder arten overvejende om efteråret, især i september. Den er truffet ikke mindre end 215 gange på de Britiske Øer til og med 1995 (Rogers et al. 1996), så et efterårsfund i Danmark var ikke uventet.

Fuglekongesanger *Phylloscopus proregulus*

(0,ca 86,-,-)

1989: 9.10, Fyns Hoved (F), ringm., via PL.

Det første fund fra Fyn. – Fund efter 1990 skal ikke forelægges SU.

Humes Sanger *Phylloscopus humei* (0,6,1,0)

1995: 2.11, Ellekrattet, Skagen (NJ), ringm., MLu,RoC,KP.

De tidligere danske fund er fra Christiansø (1980 2, 1987, 1993) og Blåvands Huk (1973, 1989).

Schwarz Løvsanger *Phylloscopus schwarzi*

(0,12,0,2)

1996: 2.10, Christiansø (B), ringm., THi,MJo. – 13.10, Christiansø (B), 1K ringm., ML,MH.

I alt er arten nu truffet 10 gange på Christiansø. De øvrige fund er fra Nakkehoved Fyr på Sjælland (1986), Hanstholm (1991), Blåvand (1994) og Tipperne (1994). Alle danske fund er fra perioden 21.9-18.10.

Brun Løvsanger *Phylloscopus fuscatus* (0,26,0,2)

1996: 9.10, Søndervig, Holmsland Klit (RK), ringm., EE. – 15.10, Christiansø (B), 1K ringm., ML,THi.

De tidligere danske fund er fra 1980 (1), 1987 (12), 1990 (2), 1991 (10) og 1992 (1). Alle er fra perioden 2.10-9.11, heraf 10 efter medio oktober (jf. Schwarz Løvsanger). Hele 19 af fundene er fra Christiansø.

Hvidhalset Fluesnapper *Ficedula albicollis*

(18,115,9,20)

1995: 30.4, Hvidovre (S), ad. ♂, JSW. – 13.5, Bavnebjerg Skov, Røsnæs (S), ad. ♂, EL. – Christiansø (B): 18.5, 2K ♂ ringm., 19.5, 3 eks. (2K ♂, 2K ♀ aflæst med svensk ring, 2K ♀ iagtt.), 28.5, 2K ♀ ringm., 6.6 2K ♀ ringm. og 19.9, 2K+ ♂ ringm., PK,JC.

1996: 1.5, Christiansø (B), 2 ad. ♂♂ ringm., THi,HH. – 3.5, Ålebæk Strand (M), ad. ♂, APR. – 4.5, Christiansø (B), 4 eks. (ad. ♂ ringm., 2K ♀ ringm., 2K ♂ ringm., 2K ♂ aflæst med svensk ring), THi,HH. – 4.5, Hammeren (B), 2 ad. ♂♂, SNI. – 4-5.5, Christiansø (B), 2K+ ♀, THi,HH. – 4-6.5, Melsted, Gudhjem (B), ad. ♂, JK. – 5.5, Gråmyr, Rø Plantage (B), 2 ad. ♂♂ og 1 ♀, HPS m.fl. – 6.5, Slotslyngen (B), ♀, JCh. – 6-7.5, Holkadalen, Rø Plantage (B), ad. ♂, HPS,FJ. – 9-10.5 og 12.5, Neksø (B), ad. ♂, TKr. – 13.5, Skagen (NJ), ad. ♂, SD m.fl. – 21.5, Skansehage, Rørvig (S), ♀, LaB. – 25.5, Christiansø (B), ad. ♀ ringm., THi, HH.

Med 20 fund er 1996 det hidtil bedste år for arten herhjemme; andre gode år har været 1969, 1987 og 1991 med henholdsvis 10, 11 og 12 fund. De mange fund på Bornholm i 1996 er overraskende nok de første dokumenterede forekomster på øen siden 1981!

Topmejsje *Parus cristatus*

1972: sommer, Osted, Roskilde (S), PSHe.

Fund øst for Storebælt er usædvanlige og bør behandles af SU. Det aktuelle fund bliver Sjællands første, idet de kun to andre dokumenterede fund herfra er 6.8 1981 København (Pedersen 1984) og 12.5 1988 Regnemark (Olsen 1989). Fundet fra 1981 betragtes i øvrigt ikke som spontant, jf. Pedersen (l.c.).

Korttået Træløber *Certhia brachyactyla*

1996: 23-24.4, Ellekrattet, Skagen (NJ), syng., RoC, KP m.fl.

Arten er ikke på SU-listen. Det aktuelle fund, som blot er det andet, der er godkendt fra Nordjylland, er imidlertid behandlet på opfordring fra den nordjyske lokalrapports redaktion.

Rosenbrystet Tornskade *Lanius minor* (7,29,1,1)

1995: 26.6, Lund Fjord (NJ), ad. ♂, FHN, HHN, DN.

1996: 9.6, Tipperne (RK), ad. ♂, OT, OA m.fl.

De første fund herhjemme siden 1989. Bemærk, at to fund fra 1964 nu er overført til det første tal i opsummeringen.

Sydlig Stor Tornskade *Lanius meridionalis*

(0,0,2,0)

1995: 23.10, Fakkemose, Sydlangeland (F), antagelig 1K, JS, JMP. – 24.11, Vejlbj Klit (RK), antagelig ad., MJØ.

Ny art for landet. Begge individer havde karakterer svarende til Steppetornskade ssp. *pallidirostris*, som er truffet adskillige gange i Vesteuropa; blandt andet for første gang i Sverige i august-september 1995 (Cederroth 1996).

Feltbestemmelse af Steppetornskade og racens forekomst i Nordvesteuropa er behandlet af Clement (1995).

Rosenstær *Sturnus roseus* (20,25,4,2)

1995: 25.5, Grenen, Skagen (NJ), antagelig 2K trk.fors., OGJ, BT. – 25.5, Rørvig (S), ad., JHC m.fl. – 3.6, Byrum, Læsø (NJ), ad., FHK via KO. – 21.6, Kærup Holme, Vejlerne (NJ), ad., DN, EDJ, HHN, MLu, FHN.

1996: 31.5, Strandkær, Mols Bjerge (ÅH), ad., PLa. – 24.8, Christiansø (B), 1K trk., PL.

Gulirisk *Serinus serinus*

1995: 30.11-19.3 1996, Skagen, ♂, RoC m.fl.

Første fund af en overvintrende fugl herhjemme, og blot det andet danske vinterfund. Det første er fra Gedser Havn 10-11.2 1980 (Pedersen 1982).

Krognæb *Pinicola enucleator* (-,13,3-10,0)

1995: 2.11, Nordmandshage, Hals (NJ), 2 hunfarvede trk., PAFR. – 13-19.11, Skagen (NJ), 5-13 trk.fors. og rastende fordelt med 13.11 5-8 trk.fors. Ellekrattet, 14.11 2 trk.fors. Ellekrattet, 15-19.11 1 rastende Skagen Nordby og 18.11 2 trk.fors. Batterivej, RoC, MLu, KP.

Forekomsten ved Skagen omfattede en flok på 5 fugle (13.11), men ellers kun enkeltindivider. Bortset fra en adult ♂ (14.11) og en 1K ♂ (15-19.11) kunne de øvrige fugle ved Skagen ikke køns- eller aldersbestemmes med sikkerhed. Bemærk, at iagttagelserne ved Skagen kun



Krognæb, 1K ♂, Skagen 15.-19. november 1995. Foto: Knud Pedersen.

regnes som 2-9 fund. Tilsvarende regnes forekomsten ved Nordmandshage kun som ét fund, idet de to fugle trak sammen. Forekomsten i 1995 må betragtes som den hidtil største herhjemme i SU-perioden; i de to seneste invasionsår 1981 og 1990 var der henholdsvis 3 fund af 3 individer og 4 fund af 7 individer (Pedersen 1984, Olsen 1987, Frich & Nordbjærg 1992). Tidligere invasioner er omtalt af Olsen (1992).

Forekomsten i 1995 skal ses i sammenhæng med betydelige trækbevægelser i det sydlige Norge og det mellemste Sverige sidst i oktober. Blandt andet sås der ved Mølen i Sydnorge 650 trækkende 28.10 og ved Värmlandsnäs ved Vänern i Sverige 350 trækkende omkring månedsskiftet oktober-november (Gantlett 1996).

Gærdeværling *Emberiza cirulus* (0,0,0,0)

Det hidtil eneste danske fund (Christiansø (B) maj 1972) anerkendes efter genbehandling ikke længe, og arten er hermed udgået af listen over Danmarks Fugle. Fundet er nævnt i Dybbro (1978) og Olsen (1992).

Pileværling *Emberiza rustica* (1,30,2,2)

1987: 22.5, Bødkermosen, Møn (M), ♀, KKN, PSH, GeG, TWJ.

1995: 19.9, Christiansø (B), JC, JK, MH. – 22-26.9, Christiansø (B), 1K ♀ ringm. 22.9, PK, JC.

1996: 22.9, Kærup Holme, Vejlerne (NJ), hunfarvet, TVN. – 24.9, Nakkehoved Fyr (S), hunfarvet, JC.

Bortset fra 1988 har arten nu i den seneste tiårsperiode optrådt årligt herhjemme med 1-3 fund. Bortset fra to fund fra det tidlige forår 1987, 21-29.3 Skagen og 11-13.4 Christiansø (Olsen 1988, 1989), er alle danske forekomster fra maj-juni og september-oktober, især ultimo maj – primo juni (13) og medio-ultimo september (15). Næsten halvdelen (17) af de 35 danske fund er fra Christiansø.

Dværgværling *Emberiza pusilla* (0,44,4,2)

1995: 19-21.5, Christiansø (B), 2K ♀ (ringm. 19.5), PK, JC. – 9.9, Christiansø (B), PL. – 19.9,

Christiansø (B), JC,JKi,MH. – 15.10, Christiansø (B), EK,ML.

1996: 9.10, Christiansø (B), 2 eks., heraf en 1K ringm., THi,ML,MH.

Med disse iagttagelser er arten nu truffet 29 gange på Christiansø. Bemærk, at de to eksemplarer fra 9.10 1996 er betragtet som to fund i opsummeringen.

[Gulstrubet Værling *Emberiza elegans*]

1994: 18.10, Stigsnæs (S), ad. ♂ ringm., HBJ, MFu.

Første gang denne østsibiriske art registreres herhjemme. Den er truffet flere gange i andre europæiske lande, bl.a. Finland, Holland, Tyskland og Frankrig (Byers et al. 1995). Alle fundene er af nyere dato, men betragtes ikke som spontane, idet de falder sammen med import af arten til fuglehold i Europa. I det lys må også det danske fund regnes for en undsluppen fangenskabsfugl.

Gulbrystet Værling *Emberiza aureola* (0,4,1,1)

1995: 12.6, Nedermoste, Skagen (NJ), ad. ♂, VV.

1996: 19.8, Christiansø (B), 1K ringm., THi, ML.

De tidligere danske fund er ligeledes fra Christiansø (1984, 1990, 1991) og Skagen (1993).

Brunhovedet Værling/Hætteværling

Emberiza bruniceps/melanocephala (0,1,0,0)

1993: 8.10, Blåvands Huk (RB), 1K, KO m.fl. Feltbestemmelse af ungfugle (og hunner) af disse to arter er meget vanskelig og ofte umulig. Det ovennævnte fund er indsendt som Hætteværling, men selv om fundet er veldokumenteret har SU altså ikke fundet det forsvarligt at godkende artsbestemmelsen.

Hætteværling *Emberiza melanocephala*

(0,13,1,0)

1995: 6.6, Donnemose, Falster (LF), ♂, MP,SPo via UBN.

Grønland

Sortklire *Tringa erythropus*

1994: 27.4, ca 200 sømil ud for Sydøstgrønland, præderet af Dværgfalk *Falco columbarius* ombord på skib (Knief & Stein 1995 og pers. medd.).

Arten er ikke truffet i Grønland, men det pågældende fund er sandsynligvis det vestligste af arten hidtil.

Thayers Måge *Larus thayeri*

1995: 21.1, kolonihavnen, Nuuk/Godthåb, 2K, ASF.

Thayers Måge yngler i Avanersuaq (Thule), men er meget sjælden syd herfor, dog muligvis overset (Salomonson 1967).



Gulbrystet Værling, 1K, Christiansø 19. august 1996. Foto: Thomas Hilkjær.

Forkastede sager

Records not accepted

Middelhavsskråpe *Puffinus yelkouan yelkouan* 1979: 30.6, Korshage, Rørvig (S), trk.

Bulwers Petrel *Bulweria bulwerii* 1995: 28.10, Roshage, Hanstholm (NJ), trk.

Purpurhejre *Ardea purpurea* 1996: 19.4, Hov Vig, Rørvig (S). 19.12, Brabrand Sø (ÅH).

Dværggås *Anser erythropus* 1996: 26.4, Juvre Forland, Rømhø (SJ). 29.9-6.10, Hindemaj, Haderslev (SJ). 5.10, Nyord (M), 1K.

Amerikansk Pibeand *Anas americana* 1996: 19.5, Sønderland, Rømhø (SJ), ♀.

Hvidøjet And *Aythya nyroca* 1994: 29.1, Møllekrog, Esrum Sø (S), ♂ og ♀.

Stellersand *Polysticta stelleri* 1995: 22.10, Kysing Næs (ÅH), ad. ♀ trk.

Steppehøg *Circus macrourus* 1996: 21.5, Tipperne (RK), ad. ♀. 5.9, Margrethe Kog (SJ), 3K ♂.

Ørnevåge *Buteo rufinus* 1996: 14.4, Løver Odde, Kolding Fjord (VE).

Lille Skrigeørn *Aquila pomarina* 1984: 18.4, Gjerrild, Djursland (ÅH), imm. trk. – 1995: 29.4, Kongelunden, Amager (S), trk. 12.5, Barup Sø, Stubbekøbing (LF), trk.

Stor Skrigeørn *Aquila clanga* 1996: 23.7 og 27.7, Oks-holm Skov (NJ).

Steppeørn *Aquila nipalensis* 1984: 18.4, Gjerrild, Djursland (ÅH), imm. trk.

Dværgørn *Hieraaetus pennatus* 1989: 3.9, Fakkemosen, Langeland (F), mørk fase trk.

Jagtfalk *Falco rusticolus* 1995: 15.1, Jedsted Forland (RB). 19.2, Brøns Å, udløbet (SJ). 22.8 og 11.9, Rønne (B), ad. hvid fase. – 1996: 17.2, Skælskør Inderfjord (S).

28.3 og 2.4, Gavnø (S), 2-3K. 14.4, Ulvedybet (NJ). 16.4, Nystrup Klitplantage (NJ).

Sortvinget Braksvale *Glareola nordmanni* 1995: 13.8, Ølsemeagle Revle (S), ad.

Sibirisk Tundrahejle *Pluvialis fulva* 1994: 11-12.8, Pyt-odde, Limfjorden (NJ), ad. odr.

Tyknebbit Dværgryle *Caldris pusilla* 1996: 27.8, Byg-holm Vejle (NJ), ad. odr.

Temmincksryle *Caldris temminckii* 1995: 17.12, Flasketen, Reersø (S), 2 eks.

Stribet Ryle *Calidris melanotos* 1994: 16.8, Bygholm Vejle (NJ), 1K.
 Spidshalet Ryle *Calidris acuminata* 1989: 17.8, Bygholm Vejle (NJ), ad.
 Sibirisk Bekkasin *Gallinago stenura* 1996: 28.9, Borreby Mose (S).
 Damklire *Tringa stagnatilis* 1995: 26.7, Nørrestrand, Horsens (VE). 30.8, Bøjden Nor (F), ad. vdr. – 1996: 11.6, Christiansø (B), 2-3 eks. trk.
 Gulbenet Klire *Tringa flavipes* 1995: 27.7, Harboør Tange (RK).
 Rosenmåge *Rhodostethia rosea* 1995: 28.10, Vejlbj Klit (RK), ad. vdr. trk.
 Rosenterne *Sterna dougallii* 1996: 30.6, Raghhammer Odde (B).
 Hvidvinget Terne *Chlidonias leucopterus* 1995: 3.9, Vejlbj Klit (RK), 1K trk.
 Skadegøg *Clamator glandarius* 1995: 12.4, Bryrup (VE).
 Gråspætte *Picus canus* 1995: 9.12, Egeris, Skive (NJ), ♂.
 Kalanderlærke *Melanocorypha calandra* 1995: 30.10, Gilleleje (S), trk.
 Rødrygget Svale *Hirundo daurica* 1973: 16.6, Blåvands Huk (RB). – 1995: 30.4, Gilbjergshoved (S), trk.
 Pechorapiber *Anthus gustavi* 1994: 2.11, Ishøj Strand (S).
 Bjergpiber *Anthus spinoletta* 1984: 25.12 og 31.12, Køge Lystbådehavn (S), vdr. – 1989: 11.3, Harboør Tange (RK), sdr. 13-22.3, Vesløs Vejle (NJ), sdr. 27.3, Skagen Havn (NJ). – 1990: 25.3, Havnø, Mariager Fjord (NJ), sdr. – 1992: 31.10, Strandby Havn (NJ), sdr. – 1993: 15.3, Gilleleje Havn (S), sdr. – 1995: 1.4, Kongelunden, Amager (S), sdr. 30.12., Emmerlev Klev (SJ) vdr.
 Sorthovedet Gul Vipstjert *Motacilla flava feldegg* 1995: 30.4, Keldsnor Fyr (F), 2 ♂♂.
 Citronvipstjert *Motacilla citreola* 1996: 21.8, Korshage, Rørvig (S), ♀ trk.
 Sydlig Nattergal *Luscinia megarhynchos* 1994: 14.5, Nykøbing Sjælland (S), syng. – 1995: 5.6, Lyngby Åmose (S), syng. – 1996: 16.6, Fjellerup Strand, Djursland (ÅH), syng.
 Diademrødstjert *Phoenicurus moussieri* 1995: 18.5, Hornbæk (S), ♂.
 Middelhavsstenpikker *Oenanthe hispanica* 1996: 27.8, Margrethe Kog (SJ), 1K ♀.
 Sortstrubet Drossel *Turdus ruficollis atrogularis* 1996: 22.10, Rosenvold, Vejle Fjord (VE), hunfarvet trk.
 Cettisanger *Cettia cetti* 1981: 27.5, Vælddam, Trillen, Als (SJ).
 Vandsanger *Acrocephalus paludicola* 1995: 19.9, Harboør Tange (RK).
 Buskrørsanger *Acrocephalus dumetorum* 1996: 10.5, Harrestrup Mose (S).
 Bleg Gulbug *Hippolais pallida* 1995: 8.8, Moseby, Pandrup (NJ), ringm.
 Nordsanger *Phylloscopus borealis* 1995: 24.6, Nordskoven, Jægerspris (S), syng.
 Vestlig Bjergløvsanger *Phylloscopus bonelli* 1996: 25.9, Sønderho, Fanø (RB).

Sibirisk Gransanger *Phylloscopus collybita tristis* 1992: 26.10, Christiansø (B), 2 eks. ringm.
 Spansk Gransanger *Phylloscopus collybita brehmii* 1995: medio maj-30.5, Korselitse Østerskov, Falster (LF), syng.
 Hvidhalset Fluesnapper *Ficedula albicollis* 1996: 7.5, Ølene, Bornholm (B), ad. ♀.
 Isabellatornskade *Lanius isabellinus* 1995: 29.5, Gjerrild Nordstrand (ÅH).
 Citronsisken *Serinus citrinella* 1995: 12.8, Lyngby (S), syng.
 Dværgværling *Emberiza pusilla* 1995: 21.1, Nors Ø (NJ). 11.2, Hjarnø, Horsens Fjord (VE), 3 eks.
 Hætteværling *Emberiza melanocephala* 1996: 29.3, Tølløse (S), ♂.

Observatørliste

Ole Amstrup OA, Hans Harrestrup Andersen HHA, Jens Frimer Andersen JFA, Jens Jørgen Andersen JJA, Thomas Lillelund Andersen TLA, Karsten M. Andersen KMA, Tim Andersen TA, Åke Anderson ÅA, Jørgen Bech JB, Eilif S. Bendtsen ESB, Preben Berg PB, Toni Berglund TB, Bjarne Bertel BB, Kim Biledgaard KB, Renie Biledgaard RBI, Klaus Bjerre KBJ, Michael Bjerregaard MB, Karsten Bjørnskov KaB, Esben Colding Broe ECB, Peter Borg PBo, Jesper Brodersen JBr, Mads Jensen Bunch MJB, Lasse Braae LaB, Alex Bühring AB, Bo Christensen BC, Jens Christensen JCh, Jens Christensen JeC, Henrik Christensen HeC, Kurt B. Christensen KBC, Per Cilius Christensen PCC, Kim Christensen KC, Niels Hesselbjerg Christensen NHC, Jan Hjort Christensen JC, Henrik Vang Christensen HVC, René Christensen RC, Rolf Christensen RoC, Susanne Overgaard Christensen SOC, Jørgen Hulbæk Christiansen JHC, Erik Christophersen EC, Hans Christophersen HC, Lars Christophersen LC, Michael Clausen MC, Tscherning Clausen TC, Bo Daugård BD, Mark Desholm MD, Jens Dithmarsen JD, Thorkil Duch TD, Svend Dybkjær SD, André Riis Ebbesen ARE, Erik Enevoldsen EE, Torben Ehtelberg ToE, Jan Eriksen JEr, Jens Eriksen JE, Torbjørn Eriksen TE, Flemming Falk FF, Anders Fischer AF, Knud N. Flensted KNF, Tommy Fransen TF, Knud Fredsøe KF, Mogens Friis MF, Alex Sand Frich ASF, Michael Funch MFu, Christian Gade CG, Jes Graugård JG, Gert Green GeG, Jens Gregersen JeG, Per Nissen Grøn PNG, Michael B. Grell MBG, Ole Göller OG, Flemming Hansen FH, Morten Bentzon Hansen MBH, Per Bo Hansen PBH, Morten Møller Hansen MMH, Tim H. Hansen THH, Per Schiermacker-Hansen PSH, Henning Heldbjerg HH, Thomas Hellesen TH, Mogens Henriksen MH, Peter Steen Henriksen PSHe, Thomas Hilkjær THi, Jens Hjerrild JHj, Claus Horneman CH, Jonas Ralf Haaning JRH, Franck Ishøj FI, Martin Iversen MI, Bent Jacobsen BJ, Mikkel Jacobsen MJ, Jesper Bay Jacobsen JBJ, Lars Bo Jacobsen LBJ, Arve Jensen AJ, Frands Jensen FJe, Freddy Jensen FJ, Helge Jensen HJe, Thorkild Jensen TJ, Ejner Dahl Jensen EDJ, Ole Jensen OJ, Peter Emil Jensen PEJ, Jørgen Nørevang Jensen JNJ, Thomas Ankersen Jensen TAJ, Henrik Jepsen HJ, Martin Jessen MJe, Orla Jessen OJe, Hjalte B. Johansen HBJ, Michael Johansen MJo, Thomas W. Johansen TWJ, Michael Fink Jørgensen MFJ, Morten Jørgensen MJø, Ole Gylling Jørgensen OGJ, Mogens Lind Jørgensen MLJ, Ole R. Karlson ORK, Jan Kiel JKi, Nis Kiel NK, Per Kjær PK, Kurt Klarborg KK, Birgit Knudsen BKN, Peter Knudsen PKN, Peter Koch PeK, Jens Kofoed JK, Erik Kramshøj EK, Peter Hedegård Kristensen PHK, Folmer Hjort Kristensen FHK, Tommy Kruse TKr, Tommy Kaae TK, Peter Lange PLa, Eigil Larsen EL, Jens Tomas Larsen JTL, Mikkel Lausten ML, Jesper Leegaard

JLe, Ole Lilleør OLi, Oluf Lou OLo, Martin Lund MLu, Flemming Lundberg FLu, Peter Lyngs PL, Henrik Læssøe HL, Henrik Knudsen HKn, Henriette Tøttrup Madsen HTM, Jørgen Mahler JM, Gerner Majlandt GM, Willy Mardal WM, Aage K. Mikkelsen ÅKM, Lars Højmark Mortensen LHM, Henrik Mouritsen HM, Per Mouritzen PM, Stavanger Museum SM, Jørgen Møller JMø, Aase Møller AaM, Henny Niebuhr HN, Bjarne Nielsen BN, Dennis Nielsen DN, Klaus K. Nielsen KN, Uffe B. Nielsen UBN, Flemming Holmslykke Nielsen FHN, Henrik Haaning Nielsen HHN, Thomas Varto Nielsen TVN, Steffen Nielsen SNi, Stig Nielsen SN, Jan Nilsson JN, Max Ejvind Nitschke MEN, Niels-Erik Norsker NN, Leif Novrup LN, Palle Nygaard PN, Timme Nyegaard TN, Jørgen Nørgård JN, Henrik Olsen HO, Ivan Olsen IO, Kent Olsen KO, Klaus Malling Olsen KMO, Troels Eske Ortved TEO, Anita Pedersen APe, John Pedersen JP, Knud Pedersen KP, Lennart Pedersen LPe, Jørgen Munch Pedersen JMP, Sten Pedersen SPe, Stig Hedeager Pedersen SHP, Andreas Petersen AP, Jan Petersen JPe, Svend Petersen SP, Susanne O. Petersen SOP, Jens Ryge Petersen JRP, Hans Pinstrup HP, Susanne Poupplier SPo, Jeff Price JeP, Mogens Poupplier MP, Brian Rasmussen BR, Jan Rasmussen JR, Palle Rasmussen PRa, Palle A.F. Rasmussen PAFR, Thomas Bundgaard Rasmussen TBR, Jan Fischer Rasmussen JFR, Stig Kjærgaard Rasmussen SKR, Lars Maltha Rasmussen LMR, Anders Prehn Rasmussen APR, Poul V. Rasmussen PVR, Erik Vikkelsøe Rasmussen EVR, Henning Vikkelsøe Rasmussen HVR, Jan Ravnborg JRa, Rasmus Romme RR, Frits Rost FR, Lars Rudfeld LR, Morten Schwennessen MS, Terje Seidenfaden TS, Jan Nør Skriver JNS, Jan Speierman JS, Jan Eske Schmidt JES, Hans Peter Stange HPS, Ann Steffensen AS, Carsten Stengård CS, Rasmus Strack RC, Lasse Strandgaard LS, Søren Skov SøS, Steen Søgård SS, Jens Christian Søndergård JCS, Erik Holm Sørensen EHS, Henning R. Sørensen HRS, Willy Sørensen WS, Jens Thalund JT, Trine Theut TT, Kasper Thorup KT, Ole Thorup OT, Leo Raun Thøgersen LRT, Carl Christian Tofte CCT, Michael Trasborg MT, Bo Tureby BT, Hanne Tøttrup HT, Vagn Valentinussen VV, Allan Kjær Villesen AKV, Jørgen Søb Westergaard JSW, David Wileman DW, Gunni Ærtebjerg GÆ, Anders Østerby AØ, Egon Østergård EØ.

Summary

Rare birds in Denmark and Greenland in 1995 and 1996

In 1995 and 1996 the Danish Rareities Committee (Sjældnehedsudvalget, SU) processed 363 records of which about 80% were accepted.

For each record the following details are included: 1) year and date, 2) locality (see map for regions), 3) number of individuals if more than one, 4) other details if known: sdr. = summer plumage, vdr. = winter plumage, odr. = transition plumage, K = calendar year, fundet død = found dead, ringm. = ringed, and 5) initials of observer(s).

The four numbers in brackets after the species name refer to, respectively, the total number of records (not individuals) in Denmark (1) before the end of 1964, (2) from 1965 to and including the year prior to those covered by the current report (here: 1994 incl.), (3) in 1995, and (4) in 1996.

This report adds three new species to the Danish list: American Golden Plover *Pluvialis dominica* from 1991, and Bufflehead *Bucephala albeola* and Southern Grey Shrike *Lanius meridionalis* from 1995. A new subspe-

cies was Icelandic Black-tailed Godwit *Limosa limosa islandica* from 1995. Also accepted were second records of Bonaparte's Gull *Larus philadelphia* and Siberian Rubythroat *Luscinia calliope* from 1995, and American Golden Plover, Black-eared Wheatear *Oenanthe hispanica* and Arctic Warbler *Phylloscopus borealis* from 1996. At least 7 Pine Grosbeaks *Pinicola enucleator* were seen after a major irruption in Scandinavia in October-November 1995.

Referencer

- Alström, P., P. Colston & I. Lewington 1991: A Field Guide to the rare birds of Britain and Europe. – Domino Books Ltd.
- Andersen, T., J. B. Bruun & B. B. Pedersen 1973: Rapport fra Sjældnehedsudvalget for 1972. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 67: 139-144.
- Barthel, P. H. 1966: Die bestimmung des Rubinkehlchens *Luscinia calliope* und sein Auftreten in Europa. – *Limicola* 10: 180-189.
- Boertmann, D., K. M. Olsen & B. B. Pedersen 1986: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i årene 1982, 1983 og 1984. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 80: 35-57.
- Byers, C., U. Olsson & J. Curson 1995: Buntings and Sparrows - a guide to the buntings and North American Sparrows. – Pica Press, Mountfield, Sussex.
- Cederroth, C. 1994: Sällsynta fåglar i Sverige 1993. Pp 101-121 i: SOF - Fågelåret 1993. – Stockholm.
- Cederroth, C. 1995: Sällsynta fåglar i Sverige 1994. Pp 125-146 i: SOF - Fågelåret 1994. – Stockholm.
- Cederroth, C. 1996: Sällsynta fåglar i Sverige 1995. Pp 121-145 i: SOF - Fågelåret 1995. – Stockholm.
- Clement, P. 1995: Southern and eastern Great Grey Shrikes in northwest Europe. – *Birding World* 8: 300-309.
- Cramp, S. & K.E.L. Simmons (red.) 1983: The birds of the western Palearctic. Vol. 3. – Oxford University Press.
- Dubois, P. & P. Yésou 1992: Les oiseaux rares en France. – Editions Raymond Chabaud, Bayonne.
- Dybbro, T. 1978: Oversigt over Danmarks fugle. – DOF, København.
- Dyck, J., J. R. Jacobsen, E. Kramshøj & J. Rabøl 1970: Rapport fra Sjældnehedsudvalget med oversigt over godkendte forekomster 1965-1969. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 64: 126-151.
- Evans, L. G. R. 1994: Rare birds in Britain 1800-1900. – LGRE Publications Ltd., Buckinghamshire, England.
- Frich, A. S. & L. Nordbjærg 1992: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1990. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: 107-122.
- Frich, A. S. & L. Nordbjærg 1993: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1991. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 87: 231-241.
- Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1995: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1993. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 89: 101-110.
- Frikke, J. & J. Tofft 1997: Den Store Hornugles *Bubo bubo* genindvandring til Danmark med særligt henblik på Sønderjylland. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 63-68.
- Gantlett, S. 1996: 1995, the Western Palearctic year. – *Birding World* 9: 21-36.
- Gantlett, S. 1997: 1996, the Western Palearctic year. – *Birding World* 10: 19-34.

- Hansen, P. S. 1976: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1975. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 70: 131-138.
- Hansen, P. S. 1977: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1976. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 71: 139-144.
- Heiser, F. 1996: Das Rubinkehlchen *Luscinia calliope*, eine neue Art für Deutschland. – Limicola 10: 177-180.
- Jacobsen, J. R., B. B. Nielsen & J. Rabøl 1971: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1970. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 65: 133-139.
- Knief, W. & M. Stein 1995: Bemerkenswerter Nachweis eines Dunklen Wasserläufers (*Tringa erythropus*). – Corax 16: 199.
- Laursen, J. T. 1997: Invasion af Slørugle *Tyto alba* i Danmark i 1990-91. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 59-62.
- Mardal, W. 1996: Kohejre - og hvad det medførte for et lille samfund. – Naturnyt 25: 1-4.
- Meltofte, H. 1993: Vadefugletrækket gennem Danmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 87: 1-180.
- Møller, A. P. 1978: Nordjyllands Fugle - deres yngleudbredelse og trækorhold. – Scandinavian Science Press, Klampenborg.
- Olsen, K. M. 1987: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1985. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 81: 109-120.
- Olsen, K. M. 1988: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1986-1987. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: 81-100.
- Olsen, K. M. 1989: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1988. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: 131-150.
- Olsen, K. M. 1991: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1989. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 85: 20-34.
- Olsen, K. M. 1992: Danmarks Fugle - en oversigt. – DOF, København.
- Olsen, K. M. 1996: Middelhavsstenpikker på Stevns sommeren 1996. – Pica 8: 12-17.
- Paulien, E. C. & K. Jeromin 1995: Der Bergpieper *Anthus spinoletta spinoletta* - ein regelmässiger Überwinterer in Schleswig-Holstein. – Corax 16: 1-8.
- Pedersen, B. B. 1980: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1977 og 1978. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 74: 127-140.
- Pedersen, B. B. 1982: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1979 og 1980. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 76: 111-122.
- Pedersen, B. B. 1984: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1981. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 78: 81-92.
- Rasmussen, P. A. F. 1996: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1994. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 90: 141-152.
- Risberg, L. 1990: Sveriges Fåglar. – Vår Fågelvärld suppl. 14.
- Rogers, M.J. & the Rarities Committee 1996: Report on rare birds in Great Britain in 1995. – British Bird 89: 481-531.
- Salomonsen, F. 1963: Oversigt over Danmarks Fugle. – Munksgård, København.
- Salomonsen, F. 1967: Fuglene på Grønland. – Rhodos, København.
- Scheepen, P. van & G. J. Oreeel 1995: Herkenning en voorkomen van Ijslandse Grutto in Nederland. – Dutch Birding 17: 54-64.
- Tucker, G. M. & M. F. Heath 1994: Birds in Europe - their conservation status. – BirdLife Conservation Series 3.
- Wiegant, M. W., G. H. Steinhaus & CDNA 1997: Rare birds in the Netherlands in 1995. – Dutch Birding 19: 97-115.
- Rettelser til SU-rapport nr 14, DOFT 81: 109-120, 1987**
Jagtfalk 1984: 11.4, Skagen, 1K skal være 2K. 12.5, Skagen, trk. skal være 2K trk.
- Rettelse til SU-rapport nr 17, DOFT 83: 131-149, 1989**
Grønlandsk Blisgås 1988: 12.3, Harbør Tange (NJ) skal være (RK).
- Rettelse til SU-rapport nr 18, DOFT 85: 20-34, 1991**
Jagtfalk 1989: 14.1, Nors Sø, ad. skal være 2K+.
- Rettelse til SU-rapport nr 25, DOFT 90: 141-152, 1996**
Dværgværling 1994: 6.10, Blåvands Huk (RB)...tilføjes som observatør *Ole Nyegaard*.
- Antaget 1. november 1997
- Palle A. F. Rasmussen
Svendsgade 6, 3. th
9000 Ålborg