



Gul sanger, Agger, Thy, 15. oktober 2022. Foto: Eva Foss Henriksen.

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2022

Af Kent Olsen, Morten Bentzon Hansen, Sebastian Klein, Andreas Bruun Kristensen, Rune Sø Neergaard, Søren Haaning Nielsen, Oskar Nilsson og Ulf Eschou Møller

Rapport nr. 54 fra Sjældenhedsudvalget

Indledning

Denne rapport omhandler 369 færdigbehandlede fund fra Danmark, heraf 234 fra 2022. Heri indgår også tre sager, som Sjældenhedsudvalget (SU) har behandlet, da det vedrører arter, som skønnes at være sjældne lokalt og derfor indgår som lokale SU-arter i visse regioner, men ikke figurerer på den nationale SU-liste. Sådanne fund publiceres (siden SU-rapport 1995-1996) i den landsdækkende årsrapport, andetsteds i *Fugleåret*, men er tillige nævnt i denne rapport. På opfordring fra lokalrapporterens redaktioner eller DOFbasens Kvalitetsudvalg (DKU) behandler Sjældenhedsudvalget også sager omhandlede fund af almindelige arter truffet på et usædvanligt tidspunkt af året, men i 2022 har der ikke været sådanne sager. 336 (91 %) af de færdigbehandlede fund (heraf 212 (91 %) fra 2022) blev godkendt, hvilket kan sammenlignes med en godkendelsesprocent på mellem 72 % og 92 % de seneste ti år. 317 (94 %) af de godkendte fund blev dokumenteret ved hjælp af foto, video, lydoptagelse, DNA-analyse mv. Fra Grønland færdigbehandlede 17 sager, som alle blev godkendt.

Til og med denne rapport henligger der 23 sager, som af forskellige årsager endnu ikke er færdigbehandlede. En

liste over disse sager samt en liste over forkastede fund findes bagerst i rapporten.

Rækkefølgen af arter i den systematiske gennemgang af forekomsterne samt arts- og underartsstatus for diverse taxa følger *International Ornithological Congress (IOC) World Bird List* (Gill et al. 2023).

Regionsopdelingen følger samme inddeling, som Sjældenhedsudvalget har fulgt siden 1992 (SU-rapport 1992). Forekomster i *Danmarks eksklusive økonomiske zone* regnes også som danske fund. En uddybende forklaring mht. til definition og afgrænsning af denne zone kan ses i SU-rapport 2011.

Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for hhv. første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen er mindst i sit andet (tredje) kalenderår, men kan være ældre. Derudover er ad. = adult (gammel, udfarvet fugl), imm. = immatur (dragter mellem juvenil og adult), juv. = juvenil (første egentlige fjerdragt), pull. = pullus (dununge), rst. = rastende, sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt, ekldr. = eklipsedragt, prdr. = pragtdragt, trk.fors. = trækforsøgende, trk. = trækkende, syng. = syngende og ringm. = ringmærket.



Blå glente, Skagen, 18. april 2022. Foto: Sakari Kauppinen.

Hvor aldersangivelse er baseret på fuglens udseende, benyttes kalenderår (ex. 3K+) frem for dragttype (ex. juvenil, immature og adult). Kalenderårsangivelsen er en betegnelse i henhold til fuglens dragtmæssige udseende og kendskabet til dragtudvikling hos den pågældende art frem for en egentlig aldersbetegnelse. Derfor vil eksempelvis en overvintrende amerikansk sortand (*Melanitta americana*) i adult dragt blive angivet som 3K+ ved fund i 1. halvår og 2K+ i andet halvår uanset om Sjældenhedsudvalget vurderer, at der i 1. og 2. halvår er tale om en ganganger. Ligeledes vil eksempelvis en terekklire (*Xenus cinereus*) i adult dragt blive angivet som 2K+, selvom der er tale om et individ, der igennem flere år regnes som en ganganger.

Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal anerkendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før 1. januar 1950, 2) antal godkendte fund og individer fra og med 1. januar 1950 til og med 2021 og 3) antal godkendte fund og individer i 2022. Denne opdeling er i overensstemmelse med den standard, der anbefales af Association of European Rarities Committees (AERC 2022). Bemærk, at opsummeringen af fund alene inkluderer fund godkendt i den kategori, som afsnittet i rapporten, hvor opsummeringen er nævnt, omhandler.



Schwarz' løvsanger, Sønder Lyngvig, Hvide Sande, 22. oktober 2022. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Derfor vil der for en art som eksempelvis hjelmskallesluger (*Lophodytes cucullatus*) være to forskellige opsummeringer, således én opsummering af fund af arten i afsnittet omhandlende fund godkendt i kategori D og én anden opsummering med fund af arten i afsnittet med kategori E.

Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid er identisk med antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på én dag ved samme lokalitet regnes som fem fund.

I lighed med europæisk standard regnes ynglefund (inkl. unger) som ét fund, hvorfor unger af danske ynglefremkomster ikke medregnes i opsummeringen. Såfremt det vurderes at være overvejende sandsynligt eller sikkert, at fund registreret på flere lokaliteter omhandler samme individ(er), regnes det som ét fund. Derfor vil f.eks. en trækkende sortbrynet albatros (*Thalassarche melanophris*) set fra forskellige kystlokaliteter i Kattegat blive regnet som ét fund ligesom en amerikansk pibeand (*Mareca americana*), der ud fra dragt karakterer kan genkendes på forskellige lokaliteter, vil blive regnet som ét fund. Returnerende individer fra år til år indgår ikke i opsummeringen.

Antal fund og individer fordelt på underarter opsummeres så vidt muligt også. Efter observatørnavnet er det oplyst, om de enkelte fund er dokumenteret med foto (Foto), video (Video), lydoptagelse (Lyd), telemetrisporing (GPS), DNA-analyse (DNA) eller indsamlet død fugl (Død). Desuden er findere(n) ved hvert fund markeret med en asterisk (*) foran observatørnavnet. Imidlertid fremgår det ikke altid tydeligt af beskrivelserne, hvem finderen er, og der kan derfor mangle enkelte markeringer. I beskrivelser til Sjældenhedsudvalget bør det angives, hvem finderen er.

I bemærkningerne til de enkelte arter/underarter er deres normale udbredelsesområder tilføjet i parentes, hvorfra de danske hhv. grønlandske forekomster vurderes at stamme fra.



Figur 1. Oversigt over regionsopdelingen anvendt i denne rapport.



Amerikansk hjejle, Holmen, Thorsminde, 31. maj 2022. Foto: Frits Rost.

SU-listen

En liste over arter og underarter, som skal godkendes af SU, kan findes på udvalgets hjemmeside på adressen: www.dof.dk/aktiv-i-dof/grupper-og-udvalg/sjaeldenheds-udvalget/den-danske-fugleliste.

Til og med 2022 skulle fund af hvidøjlet and (*Aythya nyroca*), amerikansk sortand (*Melanitta americana*) og brun løvsanger (*Phylloscopus fuscatus*) godkendes af Sjældenhedsudvalget, mens arterne udgår af SU-listen fra og med 2023. Til og med 2023 skal fund af mellemflag-spætte (*Dendrocoptes medius*) godkendes af Sjældenhedsudvalget fra hele landet, mens det fra og med 2024 kun er fund uden for Sønderjylland (region SJ), der fortsat skal behandles af udvalget.

Sjældenhedsudvalget er i gang med at vurdere status for snegås (*Anser caerulescens*) i Danmark med fokus på artens kategorisering og mulighed for at den kan blive en ny art for Danmark i kategori A. I den forbindelse efterlyses især fund, der opfylder følgende syv kriterier, der kan sandsynliggøre spontan optræden: 1) bestemmelsen bekræftet og hybrid udelukket, 2) ingen afvigende dragt-detajler, 3) ingen skader på svingfjer, 4) ingen burfugleringe, 5) ingen tam, men sky adfærd, 6) fugle i selskab med en passende "carrier-species", fx gæs, der yngler i Arktis, 7) fuglen er fundet i perioden medio september til medio maj, der vurderes som passende til en arktisk trækgæst, og den oversommer ikke. Er der fund, der opfylder flere af disse kriterier, og som endnu ikke er indtastet i DOF-basen, opfordres der til, at de indtastes.

En generel vejledning til indsendelse af fund til Sjældenhedsudvalget kan findes på udvalgets hjemmeside. Det er muligt for indsendere at uploade SU-beskrivelser direkte til SU's database. Hvis man vil uploade en beskrivelse til Sjældenhedsudvalget, kan man gå ind på adressen: <http://su.dof.dk/su-opload/index.php>, hvor man vil blive vejledt. Sjældenhedsudvalget modtager også

fortsat gerne beskrivelser pr. e-mail, men observatører opfordres til så vidt muligt at uploade deres beskrivelser via Sjældenhedsudvalgets hjemmeside.

Sjældenhedsudvalget behandler fund af arter og underarter, der er på listen over taxa, som skal forelægges udvalget, og nye arter eller underarter for landet fra alle fem kategorier (se nedenfor), og for at få så fyldestgørende et billede som muligt af de enkelte arters og underarters forekomst er det i princippet vigtigt, at alt bliver rapporteret til udvalget. Sjældenhedsudvalget behandler som udgangspunkt alle forekomster af SU-arter, samt taxa, der vurderes at have potentiale til at optræde spontant (kategori A og B) i Nordvesteuropa eller som fritlevende individ fra en selvsupplerende bestand (kategori C). Er man i tvivl om, hvorvidt et fund bør behandles af SU, kan man kontakte udvalget.

Kategorier

I henhold til AERC-standard (AERC 2023) og IUCN-definitioner (McInerny et al. 2022) inddeles de i Danmark trufne arter og underarter i fem hovedkategorier med underkategorier defineret som følger:

- A:** Arter og underarter, der betragtes som tilsyneladende spontant optrædende, og er truffet mindst én gang siden 1. januar 1950, f.eks. amerikansk pibeand (*Mareca americana*) og vibe (*Vanellus vanellus*). Som spontant optrædende regnes ligeledes skibs- eller på anden vis assisterede forekomster, så længe fuglen ikke er blevet fodret eller tilbageholdt undervejs.
- B:** Arter og underarter, der betragtes som spontant optrædende, men kun er truffet i perioden fra år 1800 til 1949, f.eks. lille sultanhøne (*Porphyrion alleni*) og østlig kravetrappe (*Chlamydotis macqueenii*).
- C:** Arter og underarter, der stammer fra translokation(er) (dvs. udsatte og undslupne arter (IUCN/SSC 2013)),

der har resulteret i etableringen af en fritlevende og selvsupplerende bestand, enten herhjemme eller i andre lande. Den danske liste inkluderer ti arter i kategori C: canadagås (*Branta canadensis*), indisk gås (*Anser indicus*) siden 1995, sortsvane (*Cygnus atratus*) siden 1995, nilgås (*Alopochen aegyptiaca*) siden 1993, rustand (*Tadorna ferruginea*) siden 1999, mandarinand (*Aix galericulata*) siden 1995, amerikansk skarveand (*Oxyura jamaicensis*) siden 1985, fasan (*Phasianus colchicus*), klippedue (*Columba livia*) og stor hornugle (*Bubo bubo*). Rustand er i kategori A og kategori C, da arten både forekommer som spontan gæst og som gæst fra fritlevende og selvsupplerende bestande etableret uden for Danmark. Stor hornugle er i kategori B og kategori C, da arten uddøde som ynglefugle i Danmark i 1884, men er genindvandret i 1984 fra Tyskland, hvor en fritlevende og selvsupplerende bestand har etableret sig på baggrund af introducerede individer. Kategori C opdeles i de seks underkategorier:

- C1:** Introducerede arter, der yngler herhjemme, og som alene forekommer som følge af udsætninger og/eller undslupne fangenskabsfugle enten herhjemme eller i andre lande, fx canadagås, nilgås og fasan.
- C2:** Introducerede arter, der optræder som følge af udsætninger og/eller undslupne fangenskabsfugle enten herhjemme eller i andre lande, men som også optræder spontant, fx rustand.
- C3:** Tidligere ynglefugle, der i dag optræder som følge af re-introduktion enten herhjemme eller i andre lande, fx stor hornugle.
- C4:** Introducerede tamformer af arter, som har etableret fritlevende bestand, fx klippedue.

C5: Arter, som udelukkende optræder som træk-gæster fra en fritlevende og selvsupplerende bestand i andre lande.

C5.1: Arter, som udelukkende optræder som træk-gæster fra en fritlevende og selvsupplerende bestand af individer introducerede i andre lande med henblik på at reetablere en tidligere ynglebestand, men hvor der ikke er dokumentation for, at Danmark har indgået i udbredelsen. Ingen danske C-arter er placeret i denne underkategori.

C5.2 Arter, som udelukkende optræder som træk-gæster fra en fritlevende og selvsupplerende bestand af individer introducerede udenfor deres normale udbredelsesområde i lande uden for Danmark, fx indisk gås og sortsvane fra introducerede bestande i Holland og Belgien.

C6: Arter, som tidligere var placeret i C1, men ikke længere har selvsupplerende bestand og/eller er uddøde. Ingen danske arter er placeret i denne underkategori.

D: Arter som ville være placeret i A eller B, hvis ikke der var rimelig tvivl om, hvorvidt de nogensinde havde optrådt spontant i landet, f.eks. bøffeland (*Bucephala albeola*) og hvid pelikan (*Pelecanus onocrotalus*).

E: Arter der betragtes som undsluppet fra fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i landet, eller hvis fritlevende bestande – hvis eksisterende – formentlig ikke er selvsupplerende, f.eks. rosapelikan (*Pelecanus rufescens*), lammegrib (*Gypaetus barbatus*), steppeørn (*Aquila nipalensis*) med stropper og fund af rødhøne (*Alectoris rufa*).

Den officielle danske liste udgøres af arterne i kategori A, B og C. Fund i kategori C, D og E publiceres særskilt bagerst i SU-rapporten.



Halsbåndstroland sammen med troidænder, Søndersø, Værløse, 21. april 2022. Foto: Jesper Brodersen.



Høgeugle, Sparresholm, Næstved, 27. december 2022. Foto: Finn Carlsen.

Danmarkslisten

Sjældenhedsudvalget fører en liste over arter og underarter, som er truffet i Danmark. Listen kan findes på udvalgets hjemmeside på adressen: www.dof.dk/aktiv-i-dof/grupper-og-udvalg/sjaeldenhedsudvalget/den-danske-fugleliste. Sjældenhedsudvalget følger de taksonomiske anbefalinger fra *International Ornithological Congress* (IOC) *World Bird List* (Gill et al. 2023).

Fra år 2022 er der godkendt fem nye arter for landet i kategori A: hvidhovedet skarveand (*Oxyura leucocephala*), wilsons stormsvale (*Oceanites oceanicus*), scopolis skråpe (*Calonectris diomedea*), makisanger (*Cumcua subalpina*) og gul sanger (*Setophaga aestiva*). Hvidhovedet skarveand, scopolis skråpe og makisanger regnes som monotypiske, mens wilsons stormsvale og gul sanger er polytypisk (Gill et al. 2023). Wilsons stormsvale består af de tre underarter: ssp. *oceanicus* (wilsons stormsvale), ssp. *exasperatus* (antarktisk stormsvale) og ssp. *chilensis* (kap horn-stormsvale) (Gill et al. 2023), hvor sidstnævnte primært overvintrer i Stillehavet syd for ækvator og ikke er ikke potentiel i Nordatlanten, mens både ssp. *oceanicus* og ssp. *exasperatus* menes at optræde i Nordatlanten. Gul sanger består af de ni underarter: ssp. *rubiginosa* (nordkyst-sanger), ssp. *banksi* (alaskasanger), ssp. *parkesi* (subarktisk sanger), ssp. *arnicola* (centralcanadisk sanger), ssp. *aestiva* (gul sanger), ssp. *morcomi* (rocky mountain-sanger), ssp. *brewsteri* (midtvest-gul sanger), ssp. *sonorana* (sonora-sanger) og ssp. *dugesi* (guerrero-gul sanger) (Gill et al. 2023). Nominatformen af gul sanger (*S. a. aestiva*) yngler fra det centrale til det østlige Canada og

det centrale og det østlige USA mod syd, og regnes som den underart, der forekommer i Europa.

Med denne rapport indgår dværgsnegås (*Anser rossii*) på listen i kategori A på baggrund af et fund fra 2021 og 2022, mens arten allerede er godkendt i kategori E på baggrund af andre fund. Dværgsnegås er monotypisk (Gill et al. 2023).

Efter en genbehandling af fund af musvåge (*Buteo buteo*) med karakterer svarende til ssp. *vulpinus* (steppevåge) anerkendes de forelagte fund ikke længere, og underarten udgår med denne rapport fra listen.

Tibetansk præstekrave (*Charadrius atrifrons*) er blevet udskilt som selvstændig art fra mongolsk præstekrave (*C. mongolus*) (omdøbt til sibirisk præstekrave) baseret på dragtmæssige forskelle og fylogenetiske analyser, som viser, at arterne er parafyletiske i forhold til ørkenpræstekrave (*C. leschenzeyii*) (Livezey 2010; Wei et al. 2022). Herefter har IOC hævet deres status til to selvstændige polytypiske arter, hvor tibetansk præstekrave består af underarterne ssp. *atrifrons* (tibetansk præstekrave), ssp. *pamirensis* (pamir-præstekrave) og ssp. *schaeferi* (sydmongolsk præstekrave), mens sibirisk præstekrave består af underarterne ssp. *mongolus* (mongolsk præstekrave) og ssp. *stegmanni* (sibirisk præstekrave) (Gill et al. 2023). Dermed indgår tibetansk præstekrave med denne rapport på listen i kategori A. Både tibetansk præstekrave og sibirisk præstekrave er truffet i Danmark med ét fund af hver art, i 1988 af sidstnævnte art og i 2004 af førstnævnte.

I forbindelse med en genbehandling af fund tilhørende artsparret hætteværling (*Emberiza melanocephala*) og brunhovedet værling (*E. bruniceps*) er et tidligere fund af hætteværling fra 2002 (SU-rapport 2013) blevet ombestemt til at vedrøre en brunhovedet værling, mens et ubestemt fund af de to arter fra 2019 (SU-rapport 2020) ligeledes er ombestemt til at vedrøre en brunhovedet værling. Dermed indgår brunhovedet værling med denne rapport på listen i kategori A, hvor arten allerede er godkendt i kategori E på baggrund af andre fund. Brunhovedet værling regnes som monotypisk (Gill *et al.* 2023).

Med dværsgnegås, hvidhovedet skarveand, tibetansk præstekrave, wilsons stormsvale, scopolis skråpe, makisanger, gul sanger og brunhovedet værling er der hermed godkendt 498 fuglearter i kategori A, B og C i Danmark til og med 2022.

Sjældenhedsudvalgets medlemmer

I 2022 trådte Henrik Haaning Nielsen og Sakari Kauppinen ud af udvalget og blev erstattet af hhv. Rune Sø Neergaard og Søren Haaning Nielsen. Udvalget bestod ved udgangen af 2022 af følgende medlemmer: Henrik Böhmer, Ole Zoltan Göller, Morten Bentzon Hansen, Andreas Bruun Kristensen, Rune Sø Neergaard, Anders Odd Wulff Nielsen, Søren Haaning Nielsen, Oskar Nilsson, Kent Olsen (formand) og Troels Eske Ortvad. Derudover er Søren Sørensen og David Boertmann tilknyttet udvalget som konsulenter ved behandlingen af fund fra Færøerne hhv. Grønland.



Kohejre, Tønder Kog, 2. maj 2022. Foto: Viggo Christiansen.



Gråsejler, Nordstrand, Skagen, 2. november 2022.
Foto: Jens Kirkeby.



Slangeørn, Portlandmosen, Lille Vildmose, 19. juni 2022.
Foto: Tonny Ravn Kristiansen.

Sjældenhedsudvalgets adresse:

Sjældenhedsudvalget, DOF, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V. E-mail: su@dof.dk.

Sjældenhedsudvalgets hjemmeside:

www.dof.dk/aktiv-i-dof/grupper-og-udvalg/sjaeldenheds-udvalget

Tak:

For kritik og kommentarer til denne rapport takkes David Boertmann, Jørgen Staarup Christensen, Tim Hesselballe Hansen, Troels Eske Ortvad og Palle A. F. Rasmussen foruden udvalgets øvrige medlemmer. For hjælp ved behandlingen af enkeltsager takkes J. Martin Collinson, Robert (Bob) Flood, Dick Forsman, Ricard Guterres, Yann Kolbeinsson, Juho Könönen, Hans Larsson, Björn Malmhagen, Rasmus Strack og Roni Väisänen. Derudover takkes Niklas Andersson, Tor A. Olsen, Roni Väisänen, Tadeusz Stawarczyk, Christopher König, Hans Schekkerman, Louise Bacon og Yann Kolbeinsson for informationer om forekomster i hhv. Sverige, Norge, Finland, Polen, Tyskland, Holland, Storbritannien og Island. Den største tak rettes dog til de mange, der rapporterede deres observationer til Sjældenhedsudvalget og dermed skabte grundlaget for denne rapport.



Steppeørn, Hulsig Hede, Skagen, 9. maj 2022. Foto: Jens Kirkeby.

Sjældne fugle i 2022

Januars overskrifter var sjældne ænder med fund af asiatisk fløjlsand både ved Høve Strand og Ordrup Næs (S), hvidøjjet and ved Kruså (SJ) og Halsbåndstroland ved Skjern (RK), som alle var gengangere fra tidligere vintre. En amerikansk sortand ved Bønnerup (ÅH) og en hybrid Halsbåndstroland x troland ved Julsø (ÅH) regnes som nye fund. De sønderjyske mellemflagspætter begyndte også at røre på sig med fund ved Gråsten og i Draved Skov; begge lokaliteter har huset arten i tidligere år.

Februar bød også på sjældne ænder, men af en lidt anden kaliber. En amerikansk skarveand blev opdaget i Selsø Sø (S) 13/2, og under eftersøgning af denne samme dag, svømmede Danmarks første hvidhovedet skarveand, en 2K han, ind i skopfeltet hos en skarveande-twitcher. Duoen var efter al sandsynlighed den samme, som var set tidligere på vinteren i Nordtyskland. Fund af hvidøjjet and ved Galtkær (VE) og Grarup Kulsø (RK) og Halsbåndstroland ved Mossø (ÅH) i løbet af måneden regnes som gengangere fra tidligere sæsoner.

En rekordtidlig triel var et overraskende fund på Stubben ved København (S) 6/3. Den opholdt sig i over to uger på lokaliteten og var velbesøgt. Det samme var tilfældet med dværsgnegåsen ved Ørum Sø (NJ) i slutningen af måneden. Fuglen regnes som samme individ, som sås ved Vejlerne (NJ) før nytår. På Langeland (F) blev

en prærietrane fotograferet ved Tranekær 31/3; fuglen vurderes til at være samme individ, der gæstede Danmark i 2020 og 2021.

April startede med en sortbrynet albatros fotograferet 60 km vestnordvest for Hanstholm (NJ) 2/4. Mere forventeligt var to blå glenter i løbet af måneden. Den første sås 7/4 ved Esrum Sø (S), mens den anden sås i Skagen (NJ) 18-23/4. Det blev et godt forår for sjældne rovfugle (og falke) i Skagen, hvor festen fortsatte med en slagfalk 21-23/4. I Sønderjylland sås i sidste halvdel af måneden kohejrer ved hhv. Hindemede og Ubjerg, hvilket regnes som to forskellige fugle. Måneden sluttede med manér, da Sjællands første stendrossel, en han, blev fundet ved Borreby om morgenen 30/4. Desværre blev fuglen om eftermiddagen fundet stærkt afkræftet på en mark, og den døde kort efter.

Maj var typisk hektisk, og der blev fundet hele to nye arter for landet. Den første var en makisanger, der sang og kaldte i mosen ved Blåvands Huk (RB) det meste af dagen 15/5. Den 21/5 var det en knap så publikumsvenlig wilsons stormsvale, der blev fotograferet fra skib ca. 110 km vest for Thyborøn (RK). Førstnævnte var en ventet ny art for landet, mens fundet af wilsons stormsvale blot var det andet fund i Skandinavien. Skagen blev bombarderet med sjældne rovfugle. Således bød måneden på en



Alpejernspurv, Grenen, Skagen, 2. maj 2022.
Foto: Daniel Palm Eskildsen.

GPS-høgeørn (genganger fra 2020 og 2021), steppeørn, dværgørn, slangeørn og ikke mindst en lille tårnfalk 20/5; en adult han, der først blev bestemt ved gennemsyn af fotos flere dage efter observationen. Møn markerede sig også på rovfuglefronten, hvor det absolutte højdepunkt var en adult ådselgrib, der sås over den østlige del af øen 15/5, og en blå glente rastede kortvarigt på Østmøn 29/5. Blå glenter sås desuden ved Saksfjed Inddæmning (LF) 1/5 og Melby Overdrev 3/5 (S), hvilket bragte årstotalen op på hele fem fugle. På Sjælland sås en 2K lammegrib, sandsynligvis fra den udsatte bestand i Alperne, ved Jægerspris Nordskov, Rørvig og Hundested 15-16/5 og samme fugl, bedømt ud fra dragtdetaljer, blev fotograferet på en mark ved Tønder (SJ) 18/5. Fyn kunne også være med, da en gåsegrib sås ved Ravnholt 29/5-1/6. En alpejernspurv rastede kortvarigt ved Grenen, Skagen (NJ) 2/5. Bornholm kom også på landkortet med en rødho-vedet tornskade på Hammeren 24/5 og en nathejre ved

Nexø 28/5. På vadefuglefronten blev det til to amerikanske hejler langs Vestkysten i løbet af måneden ved hhv. Margrethe Kog (SJ) 11-14/5 og Thorsminde (RK) 31/5-4/6.

Skagen var stedet i juni for sjældne sangere, hvor to lille rørsanger blev ringmærket 7/6 og 25/6, og en cistussanger sås og hørtes 27/6. En 2K lammegrib samme sted i midten af måneden fløj senere til Norge og, i lighed med tidligere fund, anses det for mest sandsynligt, at den stammer fra den udsatte bestand i Alperne. Hele tre slangeørne sås i løbet af juni ved hhv. Lille Vildmose (NJ) 15/6, Kallesmærsk Hede (RB) 22/6 og Sellebjergrusgrav (F) 28/6. Gåsegribben fra Fyn i maj sås på flere lokaliteter på Djursland (ÅH) i løbet af måneden. Juni bød på et lille influks af hvidskægget terne med fugle på Langeland og i Sønderjylland. Endelig skal nævnes en lille gulben i Vejlerne (NJ) 1/6 og en amerikansk svømmesnepe på Agger Tange (NJ) 16/6; sidstnævnte blev desværre først bestemt ud fra billeder, da den havde forladt lokaliteten.

Juli blev en stille periode for sjældenheder, hvor højdepunkterne var årets femte slangeørn ved Kongens Mose (SJ) og omegn i midten af måneden og frem til starten af august samt atlantisk/scopolis skråpe ved Børstuhage (S) 10/7 og Roshage 27/7 (NJ). Ved Torup Made, Als (SJ) sås en hvidskægget terne 25/7. En hvidøjet and i Maribosøerne (LF) var sandsynligvis en gammel kending fra tidligere år.

August fortsatte, hvor juli slap, med få sjældenheder. Årets sjette slangeørn, hvilket er rekord, blev set ved Lille Lyngby Mose (S) 22/8, mens fund af marmorand ved Ry (ÅH) og amerikansk tårnfalk ved Vejle (VE) i løbet af måneden regnes som undslupne fangenskabsfugle.

Septembers ubestridte højdepunkt var Danmarks første scopolis skråpe, der sås ved en række lokaliteter mellem Gilleleje og Rørvig (S), da den trak vest 14/9. Fuglen var



Amerikansk pibeand, Tempelkrogsøen, Holbæk, 30. december 2022. Foto: Lars Paaby.



Mellemflagspætte, Hjerting, Esbjerg, 11. december 2022. Foto: Bjørn Frikke.

tidligere på dagen set i Skåne. To dage senere, 16/9, dukkede den op ud for Grenen (NJ), hvor den sås frem til 19/9 til glæde for mange tilreisende. På havfuglefronten skal også nævnes en atlantisk/scopolis skråpe ved Grenen (NJ) 13/9 og en balearskråpe ved Roshage (NJ) 15/9. På Christiansø (B) blev det til en pileværling 19/9 og en blåstjert ringmærket 24/9. Endnu en blåstjert sås ved Hanstholm Fyr (NJ) 25/9, og en tajgapiber sås og hørtes på Grenen (NJ) 25/9. Sidstnævnte er første, længe ventede, fund i Nordjylland.

Oktober var som sædvanlig en travl måned for sjældenheder. På toppen, og hvad der nok var årets mest overraskende fund, var en gul sanger, der rastede i sommerhushaver i Agger (NJ) 8-16/10. Isabellastenspikker havde et rekordår med i alt tre fund, heraf to i oktober; 14/10 Ejstrup Strand (NJ) og Spodsbjerg (S) 22/10. Fyn noterede en ny art i form af en nonnestenpikker ved Bøjden Nor 15/10, og endnu en nonnestenpikker sås ved Stenbjerg (NJ) 29/10. Fem tajgapibere bogførtes i perioden 11-28/10, hvor Sjællands første på Røsnæs 20/10 var den mest bemærkelsesværdige. De fire andre fund var fordelt med to forskellige individer på Mandø (RB) 18/10 og to fund på Blåvands Huk (RB) hhv. 11/10 og 28/10. Både schwarz' løvsanger og himalayaløvsanger havde et godt efterår. 9/10 ringmærkedes en schwarz' løvsanger på Agger Tange (NJ), og samme dag sås en på Mandø (RB). Efterårets

tredje gæstede Sønder Lyngvig (RK) 19-24/10. Tre himalayaløvsangere sås i løbet af måneden med fund på Amager Fælled (S) 21/10, Røsnæs (S) 27/10 og Fanø (RB) 28/10. En gærdesanger ssp. blythi/halimodendri sås og hørtes på Agger Tange (NJ) 8/10, og en sibirisk/japansk bynkefugl sås på Grenen (NJ) 8/10 og igen 15-16/10. På Frederiksbø (B) rastede en 1K han hvidkindet værling 21-23/10. Den blev forsynet med en ring under opholdet, hvilket er første gang, arten ringmærkes herhjemme. To fund af jagtfalk på Sjælland ved Mandehoved 9/10 samt Sydvestpynten og Kalvebod Fælled 12-14/10 regnes som to forskellige fugle. Fra 27/10 og ind i november optrådte et rekordstort antal gråsejlere. I Skagen noteredes fem fugle 27/10 og yderligere seks fugle sås 27-30/10 ved hhv. Spodsbjerg (S), Gilbjerg Hoved (S), Stevns (S) og Jættebrink (M).

Tolv gråsejlere sås primo november, hvor største tal var fem i Skagen 2/11. Derudover var der fund ved Spodsbjerg (S), Melby Overdrev (S) og Hald (S), Stevns (S) og Frederikshavn (NJ). En 1K han vestlig middelhavsstenpikker på Fanø (RB) 1-6/11 og en klippesvale på Mandø (RB) 13/11 var sjældneste fugle i løbet af måneden. To adulte nathejrer i november var usædvanligt; en fugl rastede i en have ved Ejby, Køge (S) 3-16/11 og en fugl fotograferedes ved Årslev (F) 23/11. Tre mellemflagspætter blev fundet i det sydlige Jylland, og en høgeugle ved Sparresholm (S) fra 15/11 sås

året ud. Fire himalayasangere blev registreret i november med fund 4/11 i Gedser (LF), 11/11 på Harboøre Tange (RK), 12/11 og 26/11 på Mandø (RB), samt 25-28/11 ved Ishøj Strand (S). En isabellastenpikker sås ved Storvorde (NJ) 5/11, hvilket er første fund af arten på en indlandslokalitet, mens årets eneste brune løvsanger sås ved Fjand (RK) 12-13/11.

To himalayasangere sås i december hhv. på Nyord (M) 2-18/12 og ved Vesteregn, Langeland (F) 27/12 og året ud, hvilket bragte årstotalen op på ni fugle. Rekorden er dog fortsat ti fugle i 2003. Ved Rindum (RK) fouragerede en sortstrubet drossel han i en have 14/12, hvilket er første fund af arten i regionen. En 1K jagtfalk sås ved Kelds Nor (F) 14/12, og året sluttede med en amerikansk pibeand han i Tempelkrogsøen (S) fra 30/12 og ind i det nye år; sidstnævnte regnes som værende samme individ, der sås ved Hovvig (S) og Nykøbing Bugt (S) i 2021.

Kategori A: Spontane forekomster


Category A: Species recorded in an apparently wild state

Dværsgnegås *Anser rossii* (0, 1/1, 0)

2021: 17/11-1/12, Bygholm Vejle (NJ), 2K+ hvid form, *Lars Gabrielsen, Jørgen Peter Kjeldsen, Jens Jensen m.fl. (Foto). – 28-30/11, Korsholm, Gøttrup (NJ), 2K+ hvid form, Jørgen Hulbæk Christiansen, Kent Olsen m.fl. (Foto).

2022: 21-28/3, Villerup, Gammel Bedsted og Ørum Sø (NJ), 3K+ hvid form, *Henrik Haaning Nielsen, Stefan Andersen m.fl. (Foto).

Ny art for Danmark i kategori A. Fundet ved Bygholm Vejle og Gøttrup omhandler samme individ, der overnattede på Bygholm Vejle og fløj til kulturmarker omkring Gøttrup for at fouragere. Fuglen i Thy i marts 2022 regnes for samme fugl, som sås i 2021, og dette fund indgår derfor ikke i opsummeringen. Samme fugl sås i Trøndelag, centrale Norge, i perioden 12/10 til 4/11 2021, hvor den fulgtes med kortnæbbede gæs (*A. brachyrhynchus*) og i det sydlige Norge ved Kristiansand 16/11 2021 (Olsen 2023e). Fuglen viste ingen tegn på en fortid i fangenskab, og det kunne bekræftes ud fra fotos, at fuglen ikke bar ringe. Bestanden af dværsgnegås er steget kraftigt fra 2.000-3.000 individer i 1950'erne til en nuværende bestand på anslået to millioner fugle (Reeber 2015). British Ornithologists's Union (BOURC) genbehandlede i 2023 fund af dværsgnegås på de britiske øer med henblik på artens kategorisering. Der anvendtes syv kriterier, der kunne sandsynliggøre spontan optræden. De syv kriterier var 1) bestemmelsen bekræftet og hybrider udelukket, 2) ingen skader på svingfjer, 3) ingen burfugleringe, 4) ingen afvigende dragtdetaljer, 5) fuglen associerede med en passende "carrier-species", fx gæs, der yngler i Arktis, 6) fuglen ankom på et tidspunkt på året, der vurderes som passende til en arktisk trækfugl, og den oversomrede ikke, 7) fuglen var sky. Dværsgnegås blev optaget på den engelske kategori A liste, hvor i alt 18 individer i perioden 1970 til 2018 opfyldte de syv kriterier (Batty & McInerny 2023). I Norge blev kategorisering af fund af dværsgnegås også behandlet i 2023 af Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF) ud fra de



Dværsgnegås, Gammel Bedsted, Thy, 21. marts 2022.

Foto: Henrik Haaning Nielsen.

samme kriterier, der anvendtes i Storbritannien. I Norge blev tre individer godkendt i kategori A i perioden 2002 til 2021 (Olsen 2023e), hvor fundet i 2021 drejer sig om samme fugl, der sås i Danmark. På den baggrund valgte Sjældenhedsudvalget at godkende fuglen, der sås i Hanherred i november-december 2021 og Thy i marts 2022, i kategori A. (Nordamerika)

Amerikansk pibeand *Mareca americana* (0, 47/47, 0)

2022: 30-31/12, Tempelkrogsøen, Holbæk, (S), 2K+ han, *Mikkel Willemoes m.fl. (Foto).

Årets eneste fund vurderes at dreje sig om samme individ, som i 2021 blev observeret i Hovvig (S) i september og Nykøbing Bugt (S) i november-december (SU-rapport 2021). Begrundelse for dette er den ret korte afstand mellem lokaliteterne, da der blot er 27 kilometer i fugleflugtslinje. Samt det faktum, at der er meget få fund af arten øst for Storebælt. (Nordamerika)

Pibeand x amerikansk pibeand *Mareca penelope* x *Mareca americana* (0, 9/9, 0)

2022: 14/2-1/3, Favrholt Voldgrav (S), 3K+ han, *Christian Glahder (Foto). – 28/12, Favrholt Voldgrav (S), 2K+ han, *Christian Glahder.

Genganger fra tidligere år. Fuglen blev første gang observeret på lokaliteten i 2015 (SU-rapport 2015).

Hvidøjjet and *Aythya nyroca* (4/4, 64/71, 0/0)

2022: 1/1-7/2, Kiskelund Plantage og Kruså Mølle Sø (SJ), 3K+ han, *Jørn Vinther Sørensen m.fl. (Foto). – 7-17/2, Galtkær (VE), 3K+ han, *Bent Karup Frederiksen, Peder Nygaard Nielsen m.fl. (Foto). – 20/2, Grarup Kulsø (RK), 3K+ han, Patrick Hasager Lauritsen m.fl. (Foto). – 9-21/6, Tempelkrogsøen, Holbæk (S), 3K+ han, *Erik Vikkelsø Rasmussen m.fl. (Foto). – 5/7, Selsø Sø (S), 2K+ han, *Sebastian Klein m.fl. (Foto). – 7/7-17/8, Damhussøen (S), 2K+ han, Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl. (Foto). – 17-21/7, Søndersø, Maribo (LF), 2K+ han, *Jakob Engelhard, Michael Køie Poulsen, Lasse Birch Højrup (Foto & Video). – 3/8, Røgbølle Sø (LF), 2K+ han, *Michael Thelander (Foto).

Året bød ikke på nye fund af arten. Dermed anses alle årets fund for at omhandle allerede kendte individer fra

tidligere år. Fuglen fra hhv. Tempelkrogsøen, Selsø Sø og Damhussøen vurderes til at være samme individ, som har oversomret i Damhussøen i 2019, 2020 og 2021 (SU-rapport 2019, SU-rapport 2020, SU-rapport 2021). Ligeledes vurderes det som sandsynligt, at disse fund drejer sig om samme individ, der sås i Gl. Havdrup Mose (S) 30/6 2019 og ved Flintesø, Hedeland (S) 26/9-9/10 2019 (SU-rapport 2019), hvorfor det totale antal fund og individer er nedjusteret med ét ift. SU-rapport 2021. Fordelingen af danske kategori A fund er følgende (antal fund/antal individer i parentes): før 1950 (4/4), 1950-1959 (3/3), 1960-1969 (5/6), 1970-1979 (4/6), 1980-1989 (5/5), 1990-1999 (7/7), 2000-2009 (15/15), 2010-2019 (21/25), 2020-2022 (4/4). Bedste region for arten er Sjælland med 16 fund, mens de resterende fund fordeler sig med LF (12), NJ (11), F (6), VE (6), M (5), SJ (4), ÅH (3), RK (3) og RB (2). Hvidøjjet and er truffet i alle årets måneder med flest fund i perioden september til oktober. Da artens forekomst i Danmark er særdeles veldokumenteret, udgår hvidøjjet and af SU-listen pr. 1/1 2023. (Øst- & Sydøsteuropa; overvintrer Middelhavet, Sortehavet & Nordafrika)

Hvidøjjet and x taffeland *Aythya nyroca* x *Aythya ferina* (0, 21/21, 3/3)

2021: 26/9, Sønderød, Maribo (LF), 2K+ han, *Susanne Bach (Foto).

2022: 6/9, Bjørnebæk Sø, Bissrup (S), 2K+ han, *Hjalte Benjamin Johansen (Foto). – 3/12, Skt. Jørgens Sø, København (S), 2K+ han, *Anders Odd Wulff Nielsen, Tim Andersen, Ib Jensen m.fl. (Foto). – 4/12, Skt. Jørgens Sø, København (S), 1K/hun, *Tim Andersen, Anders Odd Wulff Nielsen, Benjamin Bechgaard Lisse (Foto). – 30/12, Hejrede Sø, Maribo (LF), 2K+ han, *Jakob Engelhard, Michael Køie Poulsen, Hjalte Benjamin Johansen (Foto & Video).

Fundene fra Maribo (LF) i 2021 og 2022 regnes som gengangere, mens fundet i Bjørnebæk Sø og de to fund i Skt. Jørgens Sø regnes som nye fund. I forlængelse af, at hvidøjjet and udgår af SU-listen pr 1/1 2023, skal fund af hybrider, hvor hvidøjjet and indgår, heller ikke forlægges Sjældenhedsudvalget efter d. 31/12 2022. Langt de

fleste fund af denne hybridform er gjort øst for Lillebælt. Således foreligger der blot fire jyske fund. Den regionale fordeling af de 24 danske fund t.o.m. 2022 er som følger: NJ (1), ÅH (1), SJ (2), F (3), S (9), LF (7) og M (1).

Hvidøjjet and x troland *Aythya nyroca* x *Aythya fuligula* (0, 1/1, 0)

2022: 27/3, Nakskov Inderfjord (LF), 3K+ han, *Rasmus Strack, *Sebastian Klein (Foto). – 12/11, Nakskov Inderfjord (LF), 2K+ han, *Rasmus Strack, Sebastian Klein (Foto).

Fundene anses for at omhandle samme individ, som blev opdaget i Store Kattinge Sø, 20/12 2020 (SU-rapport 2020) og siden set andre steder på Sjælland i 2021 (SU-rapport 2021). Der blev ikke konstateret individspecifikke karakteristika, såsom skader på fjer, men fuglen havde et særegent udseende, hvad angår mængden af mørkt i undergumpen og længden af toppen, som ellers er variabelt. Da hvidøjjet and udgår af SU-listen pr 1/1 2023, skal fund af hybrider, hvor hvidøjjet and indgår, heller ikke forelægges Sjældenhedsudvalget efter 31/12 2022.

Halsbåndstroland *Aythya collaris* (0, 22/22, 1/1)

2022: 3-5/1, Skjern Enge (RK), 3K+ han, *Tage Madsen, Ole Amstrup, Laurids Erik Andreassen m.fl. – 5-9/2, Mossø (ÅH), 3K+ han, *Erik Dylmer m.fl. (Foto). – 21/4, Sønderød, Værløse (S), 3K+ han, *Jesper Brodersen m.fl. (Foto). – 12-19/11, Klejtrup Sø (NJ), 2K+ han, *Thorkil Brandt, Flemming Hvarregaard Pedersen m.fl. (Foto).

2022 bød kun på ét nyt fund af halsbåndstroland. Det drejer sig om fundet fra Klejtrup Sø, hvilket er det kun tredje fund fra region NJ. Samtlige andre fund vurderes til at dreje sig om tilbagevendende fugle fra tidligere år. (Nordamerika)

Halsbåndstroland x troland *Aythya collaris* x *Aythya fuligula* (0, 9/9, 1/1)

2022: 22/1, Julsø (ÅH), 3K+ han, *Stephan Skaarup Båsen Lund (Foto).

Blot ét fund af denne hybridtype i 2022. Fundet udgør det andet fund for regionen, således er regionsfordelingen af de danske fund følgende: NJ (5), ÅH (2), RB (1) og S (2). Det første danske fund er fra Rejsby Sluse i april 2001 (SU-rapport 2002).

Asiatisk fløjlsand *Melanitta stejnegeri* (0, 6/6, 0)

2022: 1/1-21/2, Høve Strand og Ordrup Næs (S), 3K+ han, *Joshua Haahr, *Sebastian Thorup Hansen m.fl. (Foto). – 22/1-22/3, Kattegat ud for Sandflugtsplantagen, Rørvig (S), 3K+ han, Jørgen Hulbæk Christiansen, Lars Paaby, Erik Vikkelsø Rasmussen m.fl. (Foto). – 24/12, Høve Strand (S), 2K+ han, *Jørgen Hulbæk Christiansen.

Begge fugle set i 2022 regnes som gengangere fra tidligere år. Således har begge fugle været at finde på de respektive lokaliteter som overvintrende siden februar 2020 ved Rørvig og december 2020 ved Høve Strand (SU-rapport 2020, 2021). (Nordøstasien)

Amerikansk sortand *Melanitta americana* (0, 36/36, 3/3)

2022: 1-25/1, Asserbo Strand og Melby Strand (S), 3K+ han, *Jakob Engelhard m.fl. (Foto). – 15/1, Stavnshoved



Amerikansk sortand, Blåvands Huk, 21. oktober 2022.
Foto: Lars Andersen.



Gråsejler, Nordstrand, Skagen, 2. november 2022.
Foto: Jens Kirkeby.

Rev, Bønnerup (ÅH), 3K+ han, *Kent Olsen, Mogens Stoustrup Jensen (Foto). – 9/3, Lakolk Strand, Rømø (SJ), 3K+ han, *Troels Eske Ortvad, Sebastian Klein (Foto). – 23/3, Røsnæs (S), 3K+ han, *Daniel Palm Eskildsen, Nina Yasmin Ali, Thomas Vikstrøm (Foto). – 24/3, Blåvands Huk (RB), 3K+ han, Mikkel Bello, Henrik Bøhmer. – 5/4, Blåvands Huk (RB), 3K+ han, Mikkel Bello, Menno Den Uijl, Morten Jenrich Hansen (Foto). – 14/9, Hirtshals Havn (NJ), 2K+ han, *Ragnar Smith, Rune Sø Neergaard (Foto & Video). – 17/10, Vejers Strand (RB), 2K+ han, *Jan Svejgaard Jensen (Foto). – 21-24/10, Blåvands Huk (RB), 2K+ han, *Leif Nørgaard Schmidt m.fl. (Foto). – 20-26/11, Røsnæs Rev (S), 2K+ han, *Sebastian Klein m.fl. (Foto). – 16-31/12, Dragsmur (ÅH), 2K+ han, *Kim Mouritsen m.fl. (Foto).

Der blev registreret tre nye fund i 2022, mens alle øvrige fund omhandler individer, der gentagne gange er vendt tilbage til de samme overvintringslokaliteter. De nye fund drejer sig om fuglene ved hhv. Bønnerup i januar samt Lakolk og Røsnæs begge i marts. Amerikansk sortands forekomst i Danmark har været støt stigende siden det første fund; 26/3 2003 Blåvands Huk (RB) (SU-rapport 2003). Således er fordelingen af de danske fund fordelt på årtier som følger: 2000'erne (6), 2010'erne (24) og 2020-2022 (9). Nordjylland er den region med flest fund, således 16 i alt. Ud af de 39 danske fund er i alt 19 af fundene gjort langs den jyske vestkyst, dog foreligger der ingen fund på en strækning på 225 km mellem Tranum Strand (NJ) og Vejers Strand (RB). Således er der følgende regionale fordeling af de danske: NJ (16), ÅH (4), RB (6), SJ (5) og S (8). Tidsmæssigt fordeler de danske fund sig ganske jævnt hen over året, hvor eneste måneder uden fund er juni og juli. Den månedlige fordeling af de danske fund er følgende: januar (7), februar (5), marts (4), april (4), maj (3), juni (0), juli (0), august (3), september (1), oktober (5), november (4) og december (3). Forekomsten af amerikansk sortand betragtes som særdeles veldokumenteret med flere fugle, der ses år efter år på de samme lokaliteter. Arten udgår derfor af SU-listen pr. 1/1 2023. (Nordamerika & Nordøstibirien)

Hvidhovedet skarveand *Oxyura leucocephala* (0, 0, 1/1)

2022: 13/2-27/3, Selsø Sø (S), 2K+ han vdr., *Anders Wiig Nielsen m.fl. (Foto).

Ny art for Danmark. Hvidhovedet skarveand var en ventet ny art for Danmark, da arten inden for de senere år har optrådt i flere lande i Vest- og Centraleuropa, herunder Belgien, Holland og Polen (Tarsiger 2023). Læs mere om dette fund andetsteds i Fugleåret (Olsen 2023a). (Spanien, Nordafrika, Tyrkiet, Mellemøsten, Kaukasus & Centralasien)

Gråsejler *Apus pallidus* (1/1, 29/29, 18/23)

2022: 27/10, Grenen, Skagen (NJ), rst., derefter trk., *Alex Sand Frich, Ragnar Smith m.fl. (Foto). – 27/10, Grenen, Skagen (NJ), 3 rst., derefter trk., *Alex Sand Frich, *Knud Pedersen m.fl. – 27-29/10, Nordstrand, Skagen (NJ), 1K, *Erik Christophersen m.fl. (Foto). – 27/10, Gilbjerg Hoved, Gilleleje (S), *Rasmus Strack, Sebastian Klein m.fl. (Foto). – 27/10, Spodsbjerg, Hundested (S), 1K rst., derefter trk., *Søren Haaning Nielsen, Allan Holm Sønderskov, Jakob Dall (Foto). – 29/10, Stevns Klint (S), 1K, *Jan Pedersen m.fl. (Foto). – 29/10, Klinteskoven og Jættebrink, Møns Klint (M), 1K, *Sebastian Klein (Foto). – 29/10, Fyns Hoved (F), trk., *Esben Eriksen (Foto). – 30/10, Nørre Vorupør (NJ), 1K, Kristian Tikjøb Olsen m.fl. (Foto). – 2/11, Nordstrand, Skagen (NJ), 1K trk., *Alex Sand Frich m.fl. (Foto). – 2/11, Nordstrand, Skagen (NJ), 3 rst., derefter trk., *Jens Kirkeby, Alex Sand Frich m.fl. (Foto). – 2/11, Nordstrand, Skagen (NJ), trk., *Alex Sand Frich m.fl. (Foto). – 3/11, Grenen, Skagen (NJ), 1K, *Noa Vedel (Foto). – 3/11, Spodsbjerg, Hundested (S), 2 1K trk., *Søren Haaning Nielsen, Lars Jensen, Henrik Bjørsløv m.fl. (Foto). – 3/11, Melby Overdrev (S), 1K, *Jon Lehmsberg (Foto). – 3-4/11, Hald, Halsnæs (S), 1K, Hjalte Benjamin Johansen, Henrik Højholm, Lars Paaby m.fl. (Foto). – 5/11, Nordre Skanse, Frederikshavn (NJ), 2, *Gustav Urth (Foto & Video). – 10/11, Højerup, Stevns Klint (S), 1K, *Thomas W. Johansen (Foto).

Rekordår for arten, hvor næstbedste år var 2020 med tolv fund af tolv fugle (SU-rapport 2020). Fundene i 2022 blev alle gjort ultimo oktober til primo november, hvilket er typisk for arten. Bortset fra et fund fra hhv. maj og juni samt et fund af en død fugl fra forår/sommer er alle danske fund fra perioden oktober til november.



Hvidhovedet skarveand, Selsø Sø, 18. februar 2022.
Foto: Benjamin Bechgaard Lisse.



Triel, Nordhavnstippen, København, 6. marts 2022 (kollage). Foto: Kim Duus.

Det er bemærkelsesværdigt, at 45 af de 48 danske fund er gjort siden 2001. Gråsejler er efterhånden en ventet gæst i det sene efterår i forbindelse med vind fra sydlige retninger; arten har - bortset fra 2021 - været årlig siden 2012. Især årets forekomst i Skagen imponerer, hvor der bl.a. sås flokke på tre individer både 27/10 og 2/11. 27/10 sås i alt fem individer i Skagen (et fund af en flok på tre samt to fund af enkeltindivider); det samme var tilfældet 2/11. Gengangere fra observationerne i Skagen er forsøgt sorteret fra (Alex Sand Frich, Knud Pedersen og Jens Kirkeby pr. mail). Fuglen ved Spodsbjerg 27/10 trak sydvest ved 11-tiden, mens fuglen samme dag ved Gilbjerg Hoved trak øst ved 16-tiden. Disse observationer regnes som to fund af to forskellige fugle. De to fugle ved Spodsbjerg 3/11 regnes som to forskellige fund, da fuglene trak sydvest med ca. to timers mellemrum. Fundet ved Hald 3-4/11 regnes som samme fugl, som sås tidligere på dagen ved Melby Overdrev, da foto fra begge lokaliteter viser, at fuglen havde en hvid tegning på højre flanke. Fundet af to fugle ved Frederikshavn 5/11 regnes som ét fund, da fuglene sås sammen. 2022 var også rekordår for arten i Sverige med 15 fund af 17 individer og i Norge med 12 fund af 12 individer. Næstbedste år i begge lande var – ligesom i Danmark – 2020 med hhv. 14 fund af 15 individer i Sverige (Niklas Andersson pr. mail) og fem fund i Norge (Olsen 2023e). (Sydeuropa; overvintrer Afrika)

Prærietraner *Antigone canadensis* (0, 2/2, 0)

Med karakterer svarende til lille prærietraner, ssp. *canadensis* (0, 2/2, 0)

2022: 31/3, Tranekær, Langeland (F), 3K+, *Claus Dalskov (Foto).

Fuglen regnes som værende samme individ, der sås på Møn og Sjælland samt i Nordjylland fra 27/12 2020 (SU-rapport 2020) til 8/5 2021 (SU-rapport 2021). Ud fra

kendetegn synlige på billeder, regnes en prærietraner, der sås i Nordnorge i maj 2022 og igen i august-september 2022, som værende samme fugl, der sås i Danmark 2020-2022. Derimod regnes en fugl, der sås i Sydnorge i april 2022, for en anden fugl og dermed et nyt fund (Olsen 2023e). (ssp. *canadensis*: Nordøstlige Sibirien, Alaska & det nordlige Canada til Baffin Island; overvintrer sydvestlige USA)

Triel *Burhinus oedichnemus* (13/13, 45/45, 1/1)

2022: 6-21/3, Nordhavnstippen, København, (S), 2K+, *Michael Borch Grell m.fl. (Foto).

Et fænologisk meget afvigende fund, idet det hidtil tidligste forårsfund er fra Vejle (VE) 19/4 1905 (Christensen og Rasmussen 2015) og Bulbjerg (NJ) 20/4 2000 (SU-rapport 2000). Fundet var det første på Sjælland siden en fugl ved Kikhavn 25/4 2014 (SU-rapport 2014). (Mellem- & Sydeuropa; overvintrer Sydeuropa & Nordafrika)



Amerikansk højle, Holmen, Thorsminde, 31. maj 2022.

Foto: Frits Rost.



Lille gulben, Arup Vejle, 20. juni 2022. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Amerikansk hjejle *Pluvialis dominica* (0, 20/20, 2/2)

2022: 11-14/5, Margrethe Kog (SJ), 2K, *Sebastian Klein, Kristian Tijkøb Olsen m.fl. (Foto). – 31/5-4/6, Holmen, Thorsminde (RK), 3K+ sdr., *Frits Rost, Kristian Tijkøb Olsen m.fl. (Foto).

To klassiske fund, idet maj er bedste måned for arten med i alt syv fund medregnende fundene i 2022. Fundet i Margrethe Kog var fjerde fund i Sønderjylland, mens fundet ved Thorsminde var tredje fund på Vestkysten mellem Blåvands Huk og Thyborøn. Norge havde ét fund i 2022; en 2K i april (Olsen 2023e), mens der ikke var fund i Sverige i 2022 (Niklas Andersson pr. mail). (Arktisk Nordamerika; overvintrer Sydamerika)

Tibetansk præstekrave *Charadrius atrifrons* (0, 1/1, 0)

Med karakterer svarende til tibetansk præstekrave ssp. *atrifrons* / *pamirensis* / *schaeferi* (0, 1/1, 0)

2004: 22/6, Råhede Vade (RB), *Kurt Bredal Christensen (Foto). – 9-15/7, Lakolk Strand, Rømø (SJ), hun, *Ole Kristjansen m.fl. (Foto). – 12-15/8, Lakolk Klitsø, Rømø (SJ), hun, Morten Bentzon Hansen m.fl. (Foto).

Alle observationer drejer sig sandsynligvis om samme fugl, hvorfor de regnes som ét fund. Tibetansk præstekrave (*Charadrius atrifrons*) og sibirisk præstekrave (*Charadrius mongolus*) er med denne rapport optaget på den danske liste som polytypiske arter (Gill et al. 2023). Bemærk, at der i SU-rapport 2004 står, at ovennævnte fund i 2004 omhandlede en fugl med karakterer svarende til *C. m. atrifrons*. Dette var en fejl, hvor der mentes, at fuglen tilhørte *atrifrons*-gruppen, der består af de tre underarter ssp. *atrifrons*, ssp. *pamirensis* og ssp. *schaeferi*. (Centralasien; overvintrer Mellemøsten, Syd- & Sydøstasien)

Sibirisk præstekrave *Charadrius mongolus* (0, 1/1, 0)

Med karakterer svarende til sibirisk præstekrave ssp. *mongolus* / *stegmanni* (0, 1/1, 0)

1988: 2-3/7, Korevlerne, Odsherred (S), ad. han sdr, *Poul Erik Madsen.

Tibetansk præstekrave (*Charadrius atrifrons*) og sibirisk præstekrave (*Charadrius mongolus*) er med denne rapport optaget på den danske liste som polytypiske arter (Gill et al. 2023). Bemærk, at der i SU-rapport 2004 står, at ovennævnte fund i 1988 omhandlede en fugl med karakterer svarende til *C. m. mongolus*. Dette var en fejl, hvor der mentes, at fuglen tilhørte mongolus-gruppen, der består af de to underarter ssp. *mongolus* og ssp. *stegmanni*. (Nordøstibirien; overvintrer Sydøstasien & Australien)

Tibetansk præstekrave / sibirisk præstekrave / ørkenpræstekrave *Charadrius atrifrons* / *Charadrius mongolus* / *Charadrius leschenautii* (0, 1/1, 0)

2007: 25/6, Tipperne (RK), hun, *Ole Amstrup.

Fundet har tidligere været godkendt som mongolsk præstekrave / ørkenpræstekrave (SU-rapport 2007). Da mongolsk præstekrave er blevet opdelt i to arter, tibetansk præstekrave og sibirisk præstekrave (Gill et al. 2023), er fundet nu godkendt som tibetansk præstekrave / sibirisk præstekrave / ørkenpræstekrave.

Amerikansk svømmesnepe *Phalaropus tricolor* (0, 10/10, 1/1)

2022: 16/6, Agger Tange (NJ), 2K+ han sodr., *Jens Jensen (Foto).

Fuglen blev i felten bestemt til odinshane, men fotos viste, at det drejede sig om en amerikansk svømmesnepe-



Amerikansk svømmesneppe, Agger Tange, 16. juni 2022.
Foto: Jens Jensen.

pe. Hermed første fund af arten siden Tissing Vig (NJ) 20-30/9 2011 (SU-rapport 2011) og Geddal Enge (RK) 26/10-7/11 2015 (SU-rapport 2015). Fundene fra 2011 og 2015 er de eneste fra efteråret, mens de øvrige otte tidligere fund alle er gjort i perioden fra april til juli. Regionsfordelingen af danske fund er: RK (4), NJ (4), SJ (1) og S (2). Der var ingen fund i det øvrige Norden i 2022. (Nordlige Nordamerika; overvintrer Mellem- & Sydamerika)

Lille gulben *Tringa flavipes* (1/1, 15/15, 1/1)

2022: 1+20/6, Arup Vejle (NJ), 2K+ sdr., *Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Foto & Video).

Fjerde fund i Vejlerne, hvilket gør lokaliteten til den bedste for arten, hvor de tre tidligere fund er 4-6/6 1997 (SU-rapport 1997), 9-10/6 2001 (SU-rapport 2001) og 31/5 + 23/6 2019 (SU-rapport 2019). Tretten af de danske fund er fra april til juli, mens tre fund er gjort i oktober. Dertil kommer landets første fund, der omhandler en fugl skudt ved Sønderborg i 1912, hvor datoen er angivet som "efterår". Regionsfordelingen er: NJ (6), SJ (4), LF (2), RB (2), S (1), RK (1) og F (1). I Norge var der fire fund i 2022, hvilket er hidtil største antal fund på ét år (Olsen 2023e), mens der ikke var fund i Sverige i 2022 (Niklas Andersson pr. mail). (Nordamerika; overvintrer Mellem- & Sydamerika)

Hvidskægget terne *Chlidonias hybrida* (0, 53/97, 5/8)

2022: 7/6, Torup Made, Als (SJ), 3K+ sdr., *Gert Lystrup Jørgensen, Svend Ove Jensen, Kaj Abildgaard (Foto). – 24/6, Tryggelev Nor, Langeland (F), 2 3K+ sdr., *Esben Aagaard (Foto). – 26/6, Rudbøl Sø og Magisterkog (SJ), 2 3K+ sdr. rst., derefter trk., *Sebastian Klein, Lis Kastrop m.fl. (Foto). – 26/6, Nørresø (SJ), 4 3K+ sdr., *Sebastian Klein, Jørn Vinther Sørensen (Foto). – 25/7, Torup Made, Als (SJ), 3K+, *Kim Hagen Andersen (Foto).

Året bød på i alt fem forskellige fund, heraf fire i juni måned. Juni er den måned med næstflest danske fund, således er månedsfordelingen t.o.m. 2022 som følger: april (2), maj (28), juni (14), juli (5), august (2), september (1) og oktober (6). Den 26/6 sås først to fugle i Rudbøl Sø, hvorefter to andre fugle sås i nærliggende Nørresø samtidig med, at fuglene i Rudbøl Sø/Magisterkog stadig var på plads. Senere samme dag havde alle fire fugle fundet sammen i Nørresø. De to fund på Als regnes som to forskellige fund grundet det lange tidsrum mellem observationerne. Eneste andet fund i de nordiske lande var et fund af to fugle medio maj i Skåne, Sverige (Niklas Andersson pr. mail). Arten yngler årligt i Tyskland i veks-lende antal, således omkring 150 par i både 2020 og 2021 (Christopher König pr. mail). Arten har ynglet årligt i Hol-land siden 2012, således var der i 2022 ca. 60 ynglepar (Sovon 2023a). I Polen er der en voksende ynglebestand med estimeret 4.500 par i 2022 (Tadeusz Stawarczyk pr. mail). (Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika)

Wilsons stormsvale *Oceanites oceanicus* (0, 0, 1/1)

2022: 21/5, Nordsøen ca. 110 km vest for Thyborøn (RK), 2K+, *Troels Eske Ortvad (Foto).

Første danske fund af denne art, der yngler på den sydlige halvkugle. Fuglen er ikke racebestemt men omhandler givetvis enten ssp. *oceanicus* eller *exasperatus*, som begge forekommer i Nordatlanten. Fuglen blev observeret i Danmarks eksklusive økonomiske zone, hvilket betyder, at arten optages på den danske liste over fuglearter truffet i Danmark - se Indledning. Læs mere om fundet andetsteds i Fugleåret (Ortvad 2023). (Antark-



Wilsons stormsvale, Nordsøen, 21. maj 2022. Foto: Troels Eske Ortvad.

tis & øer i Sydhavet; overvintrer Stillehavet, Indiske Ocean & Atlanterhavet)

Sortbrynet albatros *Thalassarche melanophris* (0, 5/5, 1/1)

2022: 2/4, Nordsøen 60 km VNV for Hanstholm (NJ), 5K+, Jonathan Vig, Allan Nøhr Pedersen, Brian Majgaard Hansen (Foto).

Årets fund regnes som et nyt fund i forhold til de tidligere danske fund, som er følgende:

- 23/9 1991 5K+ Ørhage (NJ) (SU-rapport 1991).
- 20/7 1999 4K Skagerrak 17 km NV for Hanstholm (NJ) (SU-rapport 1999).
- 2014-2015 samme fugl (5K+) på en række lokaliteter på den jyske vestkyst (SU-rapport 2014, SU-rapport 2015).
- 5-8/10 2017 samme fugl (4K+) på flere lokaliteter i Nordsjælland (S), på Djursland (ÅH) samt til sidst ved Skagen (NJ) (SU-rapport 2017).
- 17-22/4 2021 samme fugl (5K+ med ikke helt udfarvet næb) ved først Skagen (NJ) og derefter ved Nordsjælland (S) og i Øresund (S) (SU-rapport 2021).

Fuglen, der sås i 2014 og 2015, antages at være identisk med en fugl, der har opholdt sig i sulekolonier på den tyske ø Helgoland i årene 2014-2018 og siden ved Bempton Cliffs på den engelske Nordsøkyst i årene 2020-2022. I 2022 sås også en trækkende fugl på Helgoland 9/4 2022 (Christopher König pr. mail). Denne fugl kan meget vel tænkes at være identisk med den danske fugl syv dage tidligere. Både 2/4 og 9/4 2022 sås fuglen ved Bempton Cliffs (Nightingale & Hussey 2022). Den

engelske fugl er altså med sikkerhed ikke identisk med hverken den danske eller tyske fugl. (Sydatlanten)

Scopolis skråpe *Calonectris diomedea* (0, 0, 1/1)

2022: 14/9, Gilleleje Havn (S), trk., *Eric Schaumburg, Lars Paaby m.fl. (Foto). – 14/9, Børstrup Hage, Gilleleje (S), trk., Ib Jensen m.fl. (Foto & Video). – 14/9, Asserbo Strand (S), trk., Jon Lehmberg. – 14/9, Liseleje Strand (S), trk., Lars Jensen (Foto). – 14/9, Hyllingebjerg (S), trk., Jakob Dall. – 14/9, Nødebohuse (S), trk., Aage Kabbelgaard. – 14/9, Korshage og Isefjord (S), trk., derefter rst., derefter trk., Erik Vikkelsø Rasmussen, Jørgen Hulbæk Christiansen, Jan Svejgaard Jensen m.fl. (Foto & Video). – 16-19/9, Grenen og Nordstrand, Skagen (NJ), *Rolf Christensen, Erik Christophersen m.fl. (Foto & Video).

Alle fund drejer sig om samme fugl, der også sås på den svenske vestkyst samme dag som observationerne i Nordsjælland. Der er tale om det første danske fund af denne art, der yngler i Middelhavet samt mere fåtalligt langs den portugisiske, spanske og franske Atlanterhavskyst (Reyt & Jean-Luc 2023). Læs mere om fundet andetsteds i Fugleåret (Olsen 2023b). (Middelhavet)

Atlantisk skråpe / scopolis skråpe *Calonectris borealis* / *Calonectris diomedea* (0, 65/66, 3/3)

2022: 10/7, Børstrup Hage, Gilleleje (NJ), trk., *Jakob Engelhard, Jens Lind, Peter Hartoft Jakobsen (Foto & Video). – 27/7, Roshage, Hanstholm (NJ), trk., *Stephan Skaarup Båsen Lund m.fl. – 13/9, Grenen, Skagen (NJ), trk., *Diana Sciandra, *Solenn Boucher, *Rolf Christensen (Foto).



Nathejre, Ejby, Køge, 13. november 2022. Foto: Sakari Kauppinen.



Scopis skræpe, Grenen, Skagen, 18. september 2022.
Foto: Søren Brinch.



Nathjere, Ferskesø, Nexø, 28. maj 2022.
Foto: Sune Riis Sørensen.

Der er godkendt i alt tre fund, som er relativt typiske mht. tid og sted. Sjældenhedsudvalget er pt. i gang med en genbehandling af alle fund tilhørende artsparet atlantisk skræpe og scopolis skræpe.

Balearskræpe *Puffinus mauretanicus* (1/1, 98/101, 2/2)

1997: 15/9, Grenen, Skagen (NJ), *Knud Pedersen m.fl. – 15/9, Grenen, Skagen (NJ), *Knud Pedersen m.fl.

2008: 17/8, Grenen, Skagen (NJ), trk., *Rolf Christensen m.fl. – 23/8, Grenen, Skagen (NJ), trk., *Kenneth Bach Christensen m.fl.

2010: 2/8, Grenen, Skagen (NJ), trk., derefter rst., derefter trk., *Rolf Christensen, Thomas Bundgaard Rasmussen, Mathias Vogdrup-Schmidt. – 2/8, Grenen, Skagen (NJ), trk., derefter rst., derefter trk., *Rolf Christensen, *Thomas Bundgaard Rasmussen, Mathias Vogdrup-Schmidt.

2022: 26/7, Roshage, Hanstholm (NJ), trk., *Allan Kjær Villesen, Tonny Ravn Kristiansen. – 15/9, Roshage, Hanstholm (NJ), trk., *Henrik Haaning Nielsen, Henrik Læssøe, Frits Rost m.fl.

Fundene i 2022 er typiske både mht. tidspunkt og sted og udgør det 23. og 24. fund i Thy, dvs. fra strækningen fra Bulbjerg til Agger Tange. De to fund fra 1997 er tidligere blevet regnet som ét fund af to fugle, men regnes nu efter genbehandling som to fund af hver én fugl, idet de to fugle ikke associerede med hinanden under iagttagelsen. Det samme gør sig gældende for de to fund i 2010. De to fund i 2008 er tidligere begge regnet som værende gangangere i forhold til et fund 12/8 + 15/8 2008, Grenen, Skagen (NJ) (SU-rapport 2008), men de regnes nu efter genbehandling som to nye fund af hver én fugl, idet fuglene både 17/8 og 23/8 sås trække mod nordvest fra Kattegat og ud i Skagerrak. På baggrund af ovenstående er opsummeringen blevet ændret, således at det samlede antal fund er blevet opjusteret med fire fund. (Vestlige Middelhav; overvintrer Middelhavet & Biscayen)

Topskarv *Gulosus aristotelis* (fund udenfor den jyske vestkyst og nordjyske kystlinje, samt nordlige Kattegat-øer)

2022: 20/3, Gilbjerg hoved, Gilleleje (S), 2 3K+ sdr. trk., dernæst rst., derefter trk., *Jakob Engelhard m.fl. (Foto). – 9/10, Bøstrup Hage, Gilleleje (S), 1K rst., *Jan Hjort Christensen, Tommy Jensen (Foto).

Topskarv udgik af SU-listen fra den jyske vestkyst fra og

med 2017, og Nordjyllands kystlinje i 2020, samt nordlige Kattegat-øer i 2021. Sjældenhedsudvalget behandler kun fund uden for dette område, og samlet status for topskarv ajourføres i dag i årsrapporten andetsteds i dette nummer af Fugleåret. (Island, Færøerne, Britiske Øer, Norge & Sverige)

Nathjere *Nycticorax nycticorax* (3/3, 33/34, 4/4)

1979: 16/7, Tjele Langsø (NJ), 3K+, *Søren Peter Pinnerup.

2022: 2+29/5, Rye Mølle (ÅH), 3K, Bjarne Hemming-sen m.fl. (Foto). – 28/5, Ferskesø, Nexø (B), 3K+, *Klaus Hermansen, Jan Riis-Hansen m.fl. (Foto). – 16/6, Boderne (B), 3K+, *Gunnar Tindborg m.fl. (Foto). – 3-16/11, Ejby, Køge (S), 3K+, *Benja Nielsen m.fl. (Foto & Video). – 23/11, Årslev (F), 3K+, *Karsten Beyer Holme (Foto).

De to fund på Bornholm regnes som samme fugl på baggrund af dragtkarakterer. Med fire fund er 2022 det bedste år nogensinde for arten. De næstbedste år er 1988 (SU-rapport 1998) og 2012 (SU-rapport 2012) begge med tre fund. Set i lyset af antallet af danske fund kan det overraske, at der i 2022 kun var ét andet fund i de øvrige nordiske lande; en fugl i oktober i Norge (Olsen 2023e). Månedsfordelingen af de danske fund er med årets fund som følger: januar (2), februar (0), marts (1), april (6), maj (14), juni (5), juli (4), august (2), september (0), oktober (0), november (4) og december (1). (Syd- & Centraleuropa; overvintrer Afrika)

Kohejre *Bubulcus ibis* (4/4, 26/29, 3/3)

2022: 16/4 + 19-20/4, Hindemøde (SJ), sodr., *Jens Faurbye, Niels Peter Møller Jensen, Emil Frederiksen m.fl. (Foto). – 30/4-2/5, Ubjerg Kog og Tønder Kog (SJ), sodr., Viggo Christiansen (Foto). – 6/5, Sortemoen, Svendborg (F), sodr., *Hans Rytter (Foto).

I alt tre fund er på linje med de sidste par år, således tre fund i 2020 og fire fund i 2021. Alle tre fund er typiske, hvad angår tidspunkt, således er april og maj sammen med oktober de måneder med flest fund. Månedsfordelingen er med årets fund følgende: januar (0), februar (1), marts (0), april (7), maj (7), juni (2), juli (2), august (1), september (1), oktober (7), november (4) og december (0). Arten har udvist en stærkt stigende tendens mht. antal fund. Fordelingen på årtier er med årets fund som følger: 1900-1949 (4), 1980-1989 (1), 1990-1999 (4), 2000-2009 (6), 2010-2019 (8) og 2020-2022 (10). Der var ligeledes tre fund i Sverige (Niklas Andersson pr. mail), mens der var fem fund af otte fugle i Norge (Olsen 2023e). (Sydeuropa, Mellemøsten & Nordafrika)



Blå glente, Skagen, 20. april 2022.
Foto: Tonny Ravn Kristiansen.

Blå glente *Elanus caeruleus* (0, 24/24, 5/5)

2022: 7/4, Jonstrup, Esrum Sø (S), 2K rst., derefter trk., *Julius Nielsen (Foto). – 18-23/4, Skagen (NJ), 2K, *Jens Tomas Larsen m.fl. (Foto). – 1/5, Saksfjed Inddæmning (LF), 2K indtrk. rst., derefter trk., *Preben Berg, *Claus Mortensen, *Jesper Nelby Christiansen m.fl. (Foto). – 3/5, Melby Overdrev (S), trk., *Jon Lemberg. – 29/5, Østmøn (M), 2K, *Rasmus Strack m.fl. (Foto).

Selvom gengangere ikke kan udelukkes, regnes de fem forekomster som forskellige fugle og dermed nye fund. Årets fem fugle tangerer således topåret 2020. Månedsfordelingen for de i alt 29 danske fund fordeler sig således: marts (2), april (13), maj (6), juni (2), juli (2), august (2), september (2). Arten er i de senere år set herhjemme med tiltagende hyppighed. Med undtagelse af 2017 er arten således registreret årligt i Danmark siden 2012. (Sydvestlige Frankrig, Iberiske Halvø & Nordvestafrika)

Ådselgrib *Neophron percnopterus* (1/1, 3/3, 1/1)

2022: 15/5, Østmøn (M), 5K+ trk., *Niels Bahl Andersen m.fl. (Foto).

Landets femte fund og det første på Møn. Der er desuden tale om tredje danske fund af en udfarvet fugl. Fire af de i alt fem fund fra Norge involverer ligeledes udfarvede fugle (Norgeslisten 2023), mens blot ét eller to af i alt syv svenske fund involverer udfarvede fugle (Birdlife Sverige 2023). De tidligere danske fund er 30/8 1918 Fakse (S), 1K (Christensen & Rasmussen 2015), 22-23/5 1993, Skagen (NJ), 3K (SU-rapport 1993), 28/4 2010 Selsø (S) 5K+ (SU-rapport 2010), 3/6 2017 Kikhavn, Ullerup Skov og Rørvig (S) 5K+ samt (samme fugl) 5/6 Saksfjed Inddæmning, Sjunkeby, Spidsbuen, Albuen Strand m.m. (LF), 5K+ (SU-rapport 2017). (Sydeuropa, Mellemøsten & Afrika)

Gåsegrib *Gyps fulvus* (1/1, 11/44, 1/1)

2022: 29/5-1/6, Lindkær, Ravnholt (F), *Tina Kierkegaard Hansen m.fl. (Foto). – 14/6, Feldballe (ØJ), trk., *Lars Keller. – 14-16/6, Elløv Enge (ØJ), *Kevin Andersen, Marlene Festersen (Video). – 18/6, Tirstrup Lufthavn (ØJ), *Tau Iversen (Foto). – 19-20/6, Hvalskov Plantage og Korup Sø (ØJ), Valdemar Juul, Klaus Sørensen m.fl. (Foto).

Alle iagttagelser vedrører samme fugl. Fuglen var ringmærket med metalring samt gul farvering med teksten "N7L". Ringene var af spansk oprindelse, men skønt infor-



Gåsegrib, Hvalskov Plantage, 19. juni 2022.
Foto: Niels Kristian Bech Jensen.

mation efterfølgende blev afsendt til Spanien, er der fortsat (i skrivende stund mere end et år efter) ikke modtaget svar om fuglens oprindelse, alder eller lignende. Derfor er det eksakte ringmærkningssted fortsat ukendt, om end det synes nærliggende at antage, at den er ringmærket i Spanien. Gåsegrib er øget i hyppighed herhjemme. Fordelingen af de danske fund i kategori A er som følger: 1850-1859 (1), 1980-1989 (2), 2010-2019 (7) og 2020-2022 (3). Bortset fra 2018 er arten registreret hvert år i Danmark siden 2016. (Iberiske Halvø, Sydfrankrig & Balkan)

Slangeørn *Circaetus gallicus* (uddød 1877, herefter 1/1, 54/54, 6/6)

2022: 23/5, Råbjerg Hede og Troldkær (NJ), 3K+ trk., *Alex Sand Frich, Yvonne Feldskov, Lars Paaby m.fl. (Foto). – 15-21/6 + 2-10/7, Portlandmosen, Lille Vildmose (NJ), 2K, *Elly Hansen m.fl. (Foto). – 22/6, Kallesmærsk Hede (RB), 2K+, *Thomas Sørensen, *Trine Harreby, *Michael Harreby (Foto). – 28-29/6, Sellebjerg Grusgrav, Kirkeby (F), 2K, *Emil Skovgaard Brandtoft m.fl. (Foto). – 13/7-2/8, Kongens Mose, Løgumkloster Plantage, Favrbj og Travsted (SJ), 2K, *Tim Andersen, Jørgen Hulbæk Christiansen, Jan Eske m.fl. (Foto). – 22/8, Vittenbjerg, Arresø og Lille Lyngby Mose (S), 2K+ trk., *Erik Buchwald, Hanne Schüssler.

Efter et 0-år i 2021 satte 2022 rekord med hele seks fund. Selvom det ofte kan være svært at udelukke gengangere, peger dragtdetaljer på, at de forskellige observationer reelt vedrører forskellige fugle. Tidligere topår var 1999 og 2008 med hver fire fund. Også Holland havde usædvanligt mange fund af arten i 2022, hvor det estimeres, at 12-15



Slangeørn, Sellebjerg Grusgrav, Kirkeby, 28. juni 2022.
Foto: Emil Skovgaard Brandtoft.



Steppeørn, Hulsig Hede, 9. maj 2022. Foto: Jens Kirkeby.

fugle blev registreret (de Jong 2022). (Syd- & Østeuropa; overvintrer nordlige del af tropisk Afrika)

Dværgørn *Hieraaetus pennatus* (0, 17/17, 1/1)

2022: 20-21/5, Skagen (NJ), 3K+ lys form trk.fors., *Torben L. Sørensen, *Jens Eriksen m.fl. (Foto).

Et meget typisk fund. Hele 13 af de 18 danske fund er fra Skagen. Månedsfordelingen er: april (4), maj (7), juni (3), august (2), september (2). Et fund fra 15/10 og 21/10 1990, Stignæs (S) er efter genbehandling blevet forkastet. (Sydeuropa; overvintrer Afrika)

Steppeørn *Aquila nipalensis* (0, 32/32, 1/1)

2022: 9/5 + 16-22/5 + 27/5 + 29/5, Skagen (NJ), 3K trk.fors., Laila Neermann, Jan Eske Smidt m.fl. (Foto).

Tolv af de 33 danske steppeørnefund er gjort ved Skagen, som dermed er bedste danske lokalitet for arten. Månedsfordelingen for de danske fund er: marts (1), april (2), maj (11), juni (2), juli (2), august (1), september (7), oktober (7). (Centralasien; overvintrer tropisk Afrika, Indien & Arabiske Halvø)

Høgeørn *Aquila fasciata* (0, 7/7, 0)

To GPS-mærkede individer, der blev mærket som unger i Sydfrankrig i 2019, har besøgt Danmark hhv. 2020-2021 ("3C") og 2020-2022 ("26") (Aigle de Bonelli 2022). Ud fra observationer og satellit-data via Aigle de Bonelli (GPS) har det været muligt, at kortlægge de to individers ophold i Danmark, og med de supplerende data, er det fundet nødvendigt at genpublicere tidligere godkendte fund fra 2020 og 2021. Nedenstående omfatter således en fuldstændig fortegnelse af fund i årene 2020-2022, hvor der for enkelte fund er foretaget ændringer til mere præcise lokaliteter samt datoer end hvad der tidligere har været angivet i 2020 (SU-rapport 2020) og 2021 (SU-rapport 2021). Af hensyn til overskueligheden er nedenstående fund fordelt på de respektive individer, som i det franske projekt kaldes:

"3C":

2020: 27/4, Kragelund Mose, Frøslev (SJ), 2K (GPS). – 27-28/4, Vilstrup Skov, Vejle (VE), 2K rst., senere trk. (GPS). – 28/4, Slagballe Plantage, Bryrup (VE), 2K (GPS). – 28-29/4, Vesterbølle Plantage (NJ), 2K rst., senere trk., Henrik Haaning Nielsen, Vagn Freundlich m.fl. (Foto & GPS). – 29/4, Svingelbjerg, Farsø (NJ), 2K (GPS). – 29-30/4, Harklit Grav, Hjørdemål (NJ), 2K rst., senere trk., Jens Jørgen Andersen, Per Rasmussen m.fl. (Foto & GPS). – 1/5, Ballerum, Nors (NJ), 2K (GPS). 1/5, Tvorup Plantage, Thy (NJ), 2K trk. (GPS). – 2/5, Skallerup, Sundby, Mors (NJ), 2K (GPS). – 2-3/5, Dalby Skov (VE), 2K rst., senere trk., Hans Rytter, Martin Strømkjær m.fl. (Foto & GPS). – 3/5, Binnerup Sønderkov (VE), 2K (GPS). – 3/5, Sjølund (SJ) 2K trk., Morten Bentzon Hansen, Anders Wiig Nielsen. – 3/5, Vonsbæk Kirke (SJ), 2K trk., Jørn Vinther Sørensen (Foto). – 25/6, Langager Gårde, Spjald (RK), 2K (GPS). – 26/6, Pajhede Skov (NJ), 2K (GPS). – 27/6, Bjergby (NJ), 2K (GPS). – 28/6, Ryå, Store Vildmose (NJ), 2K (GPS). – 28-29/6, Hallundbjerg, Hallund (NJ), 2K (GPS). – 30/6-1/7, Dronninglund Storskov (NJ), 2K (GPS). – 2/7, Ryå, Øster Brønderslev (NJ), 2K (GPS). – 3-7/7, Hals Sønderkov, Hals (NJ), 2K (GPS). – 8/7, Als (NJ), 2K (GPS). – 8-9/7, Ulstrup, Ramten og Fjeld Skov (ÅH), 2K (GPS). – 10-19/7, Staulund og Barslund (RK), 2K, Ole C. Olesen, Ulf Eschou Møller m.fl. (Foto & GPS). – 20/7, Sjørsløv (NJ), 2K (GPS). – 21/7, Kolindsund, Fannerup (ÅH), 2K (GPS). – 22-24/7, Staulund og Barslund (RK), 2K (GPS). – 25/7, Stubberkloster Plantage, Herrup (RK), 2K (GPS). – 26-31/7, Staulund og Barslund (RK), 2K (GPS). – 1/8, Tvis Nordre Kommune Plantage (RK), 2K (GPS). – 2-3/8, Hestbjerg Plantage, Idom Kirkeby (RK), 2K (GPS). – 4/8, Søndersthoved, Give (VE), 2K (GPS). – 5/8, Ulvemosen, Tinglev (SJ), 2K (GPS). – 6/8, Brystrup, Hellevad (SJ), 2K (GPS). – 7/8, Faldhøje Plantage, Tofterup (RB), 2K (GPS). – 7-11/8, Mourier Petersen Plantage, Lem (RK), 2K (GPS). – 12/8, Klosterhede Plantage (RK), 2K (GPS). – 13/8, Vind Hede (RK), 2K (GPS). – 14/8, Klim Plantage, Fjerritslev (NJ), 2K (GPS). – 15/8,



Mellemslagspætte, Gråsten Slotspark og Dyrehave, 16. februar 2022. Foto: Steen E. Jensen.

Råbjerg Mose (NJ), 2K (GPS). – 16/8, Uggerby Å, Tårs (NJ), 2K (GPS). – 17-18/8, Torup Klitplantage, Fjerritslev (NJ), 2K (GPS). – 19/8, Tranum Klitplantage (NJ), 2K (GPS). – 20/8, Ølands Vejle, Ulvedyb (NJ), 2K (GPS). – 21/8-9/10, Lundergård Mose, Pandrup (NJ), 2K, Lars Grøn, Johan Henrik Funder Castenschiold, Jesper Johannes Madsen m.fl. (Foto & GPS). – 11/10, Ryå, Aabybro (NJ), 2K (GPS). – 13/10, Tingskov, Brovst (NJ), 2K (GPS). – 14/10, Østerild Klitplantage, Østerild (NJ), 2K (GPS). – 15/10, Sennels, Thisted (NJ), 2K (GPS). – 16/10, Vester Assels, Mors (NJ), 2K (GPS). – 17/10, Torsted Plantage, Ørnhøj (RK), 2K (GPS). – 18-19/10, Nordre Feldborg Plantage (RK), 2K (GPS). – 19/10, Vejerslev, Mors (NJ), 2K (GPS).

2021: 11/2, Søvig Bæk, Øster Vrågum (RB), 3K (GPS). – 13-22/2, Lovrup Skov (SJ), 3K (GPS). – 9/5, Sejerslev, Mors (NJ), 3K (GPS). – 10/5, Råbjerg Mose (NJ), 3K (GPS). – 10/5, Skagen Klitplantage og Hulsig Hede (NJ), 3K, Knud Pedersen, m.fl. – 11/5, Råbjerg Mile (NJ), 3K (GPS). – 12/5, Tislum Plantage (NJ), 3K (GPS). – 13/5, Rugholm, Tårs (NJ), 3K (GPS). – 16/5, Tranum Enge, Tranum (NJ), 3K (GPS). – 18/5, Vindblæs Hede (NJ), 3K (GPS). – 19/5, Staulund/Barlund (RK), 3K (GPS). – 20/5, Jelling (VE), 3K (GPS). – 21/5, Kragelund Mose, Bække (VE), 3K (GPS). – 23-27/5, Liegård Plantage og Tingkærskov, Egtved (VE), 3K (GPS). – 28/5, Bregnhoved, Give (VE), 3K (GPS). – 29/5, Skjern Å, Borris (RK), 3K (GPS). – 30/5, Dejbjerg Plantage, Lem (RK), 3K (GPS). – 31/5, Torsted Plantage, Ørnhøj (RK), 3K (GPS). – 1-2/6, Sønder Omme Plantage (RB), 3K (GPS). – 3/6, Nysted Klitplantage (NJ), 3K (GPS). – 4/6, Krog, Vigso (NJ), 3K (GPS). – 5/6, Tversted og Tversted Plantage (NJ), 3K (GPS). – 5/6, Råbjerg Mile (NJ), 3K (GPS). – 5/6, Skagen Klitplantage (NJ), 3K, *Ole

Zoltan Göller, *Sebastian Klein m.fl. (Foto & GPS). – 6/6, Hulsig Hede (NJ), 3K (GPS). – 7/6, Ålbæk Klitplantage (NJ), 3K (GPS). – 8/6, Råbjerg Mose (NJ), 3K (GPS). – 9/6, Hagsholm Skov, Thorsø (ÅH), 3K (GPS). – 10/6, Sønder Feldborg Plantage (RK), 3K (GPS). – 11-14/6, Sønder Omme Plantage (RB), 3K (GPS). – 15/6, Sønderbæk, Stenderup (VE), 3K (GPS).

"26":

2020: 17-19/4, Højris, Mors (NJ), 2K rst., senere trk., Sigrud Kistrup Ilsøe, Jan Lindgaard Rasmussen, Tim Hesselballe Hansen m.fl. (Foto & GPS). – 19-20/4, Try, Sæby (NJ), 2K rst., senere trk., Birthe Rasmussen, Erik Vikkelsø Rasmussen m.fl. (Foto & GPS). – 20/4, Lodskovvad og Hulsig Hede og Skagen (NJ), 2K trk.fors., Jens Kirkeby m.fl. (Foto). – 20-21/4, Åstrupgård Plantage, Møldrup (NJ), 2K rst., senere trk., Andreas Egelund Christensen, René Rørbæk m.fl. (Foto & GPS). – 21-22/4, Hjortlund, Ribe (RB), 2K rst., Lars Paaby m.fl. (Foto & GPS).

2021: 19-20/4, Allingkloster Skov, Grønbæk (ÅH), 3K (GPS). – 20/4, Skagen (NJ), 3K trk.fors., *Knud Pedersen, Andreas Egelund Christensen m.fl. (Foto). – 20-21/4, Skagen Klitplantage (NJ), 3K (GPS). – 21/4, Ålbæk Klitplantage (NJ) og Jerup (NJ), 3K (GPS). – 21/4, Dronninglund Storskov (NJ), 3K (GPS). – 21-22/4, Melholt Rimmer, Hou (NJ), 3K (GPS). – 22/4, Lille Vildmose (NJ), 3K (GPS). – 22/4, Randers (ÅH), 3K (GPS). – 22/4, Horsens (VE), 3K (GPS). – 22-23/4, Rohden Ådal, Vejle Fjord (VE), 3K (GPS).

2022: 21/5, Fovslet Skov, Kolding (VE), 4K (GPS). – 22/5, Støvring Hede (NJ), 4K (GPS). – 23/5, Tolne Bakker (NJ), 4K (GPS). – 23/5, Skagen (NJ), 4K trk.fors., *Karsten Klau-

sen, Erik Christophersen, Lars Paaby m.fl. (Foto). – 23/5, Hulsig Hede, Lodskovvad & Råbjerg Hede (NJ), 4K trk., Hans Ægidius, Alex Sand Frich, Lars Paaby m.fl. (Foto). – 24-25/5, Eskær Skov (NJ), 4K (GPS). – 26-27/5, Tislum Plantage, Løndum (NJ), 4K (GPS). – 28/5, Hals Sønder-skov, Hals (NJ), 4K (GPS). – 29/5, Røjen, Skødshoved Strand (ÅH), 4K (GPS).

På baggrund af supplerende oplysninger fra det franske projekt, understøtter dette at "3C" opholdt sig i Danmark i vinteren 2020/21, og dermed udgør det den nordligst dokumenterede overvintring i Europa (SU-rapport 2021). Overvintringen og ophold i Danmark er velbeskrevet i SU-rapport 2021, hvor de supplerende oplysninger har givet anledning til følgende præciseringer: første GPS-registrering i 2021 er nu fastslået til 11/2, Søvig Bæk, Øster Vrøgum (RB), hvilket er 16 dage tidligere end hidtil dokumenteret. Forekomsten af "3C" i perioden 19/10 2020-11/2 2021 er stadig ukendt. 26/2 2021 krydsede "3C" grænsen mod syd og ankom til Frankrig 15 dage senere (SU-rapport 2021), men ankom igen til Danmark 9/5, Sejerslev, Mors (NJ), hvilket er én dag tidligere end opsummeret i SU-rapport 2021. Alle fund af Høgeørn i 2022 kan henføres til samme individ "26", der besøgte landet for tredje gang, nu i en alder af 4K, i perioden 21/5-29/5. Årets ankomst lå tidsmæssigt noget senere på året, da første GPS-registrering var 21/5 mod 17/4 i 2020 og 19/4 2021. (Sydeuropa, Nordafrika & Mellemøsten)

Musvåge *Buteo buteo*

Med karakterer svarende til steppevåge, ssp. *vulpinus* (0, 0, 0)

Ét fund fra 1-10/6 1972, 2K+ i Skagen (NJ) (SU-rapport 1972) anerkendes efter genbehandling ikke længere og på den baggrund udgår underarten af den danske liste. Sjældenhedsudvalget har genbehandlet fund af steppevåge, hvor fotos af fotodokumenterede fugle har været sendt til kommentering hos Dick Forsman og Nils van Duivendijk, der begge er eksperter med omfattende viden om forekomst og bestemmelse af underarten. Selv om flere af fuglene i Danmark har vist kendetegn, der passer på steppevåge, mente ingen af de to eksperter, at blandingsformer mellem nominatformen af musvåge og steppevåge fra overlappzonen i især Finland kunne udelukkes. For at fund af ikke-indsamlende individer i Danmark kan godkendes, har Sjældenhedsudvalget på baggrund af kommentarerne fra de to eksperter besluttet, at der skal være tale om individer tilhørende farveformerne "pure rufous", "pure dark-rufous" eller "pure black" (Forsman 2016), da alle øvrige farveformer ikke kan adskilles fra blandingsformer. Da tidligere godkendte fund ikke omhandler fugle tilhørende de tre ovennævnte farveformer, er fundene efter genbehandling blevet forkastet, og som konsekvens udgår underarten af den danske liste (SU-rapport 2021). (Nordøstlige Skandinavien, Baltikum & Rusland; overvintrer Afrika)

Høgeugle *Sumia ulula* (21/21, 269/270, 1/1)

2022: 15/11-31/12, Sparresholm, Næstved (S), 2K+, *Heine Skjerning m.fl. (Foto).

Første danske fund siden 2020. Artens forekomst i Danmark varierer meget fra år til år. Den største invasion fandt sted i efteråret 1983 og ind i 1984, og blev



Lille tårnfalk, Skagen, 20. maj 2022. Foto: Jens Eriksen.

godkendt som én samlet invasion (SU-rapport 1982-84). Denne invasion er i Christensen et al. (2022) opgjort til at omfatte 193 fund fordelt på følgende regioner: NJ (32), ÅH (1), SJ (1), F (3), S (148), LF (4) og M (4), hvorfor opsummeringen nu inkluderer alle fund. (Skandinavien & Rusland)

Mellemflagspætte *Dendrocytes medius* (yngle-fugl, uddød 1959 med enkelte fund til og med 1963, herefter 20/20, 5/5)

2022: 1/1-30/4, Draved Skov (SJ), Thomas W. Johansen, Tim Andersen m.fl. (Foto). – 1/1-12/5, Gråsten Slotspark og Dyrehave (SJ), han, Hanne Eriksen, Jens Eriksen m.fl. (Foto). – 13/1-26/4, Gråsten Slotspark og Dyrehave (SJ), hun, *Gert Lystrup Jørgensen, *Bjarne Nielsen m.fl. (Foto). – 9/2, Bolderslev Skov (SJ), *Svend Anker Schwebs. – 10/3, Kollund Skov (SJ), han, *Troels Eske Ortvad, *Sebastian Klein (Foto & Video). – 13/11-31/12, Klostermølle, Højlund Skov (VE), *Sebastian Højholm, *Nikolaj Mikkelsen, *Arne Kaas m.fl. (Foto). – 23/11-29/12, Hjerting, Esbjerg (RB), *Søren Peder Nielsen m.fl. (Foto). – 30/11-31/12, Øse, Nordenskov (RB), *Niels Just Andersson (Foto). – 7-31/12, Gråsten Slotspark og Dyrehave (SJ), han, *Svend Anker Schwebs, *Klaus Bo Jensen m.fl. (Foto).

Der blev gjort i alt fem nye fund i 2023 ved hhv. Bolderslev Skov, Klostermølle, Hjerting, Øse samt hunnen ved Gråsten. Fuglen i Draved Skov i januar samt hannen ved Gråsten blev begge først observeret i december 2021 (SU-rapport 2021). De to fund ved hhv. Hjerting og Øse udgør de første fund for RB. Den regionale fordeling af de 25 danske fund, der er gjort siden 1963 er som følger: RK (1), RB (2), VE (3), SJ (17), F (1) og S (1). Som det fremgår, er langt hovedparten af de nyere danske fund gjort i Sønderjylland, hvor arten nu optræder årligt på flere lokaliteter. På baggrund heraf skal fund af mellemflagspætte i Sønderjylland (region SJ) fra og med 1. januar 2024 ikke længere behandles af Sjældenhedsudvalget (Netfugl 2023b). Arten har været i kraftig fremgang mange steder i den nordlige del af udbredelsesområdet, således talte den hollandske ynglebestand 1.300-1.800 par i 2019, hvilket kan sammenlignes med under ti par omkring årtusindeskiftet (Sovon 2023b). (Syd- & Mellemuropa)

Lille tårnfalk *Falco naumanni* (3/3, 6/6, 1/1)

2022: 20/5, Skagen (NJ), 3K+ han trk.fors., *Torben L. Sørensen, *Jens Eriksen m.fl. (Foto).



Rødhovedet tornskade, Hammeren, 24. maj 2022.
Foto: Hans Fæster.



Himalayasanger, Lille Vejlesø, Ishøj Strand, 26. november 2022.
Foto: Sakari Kauppinen.

Første fund siden 2006 (SU-rapport 2007) og ikke uventet fra Skagen i forbindelse med trækobservationer, hvor fuglen bemærkelsesværdigt blev fotograferet få minutter efter en dværgørn på trækforsøg. Arten kan være vanskelig at adskille fra tårnfalk (*F. tinnunculus*) og er formentlig overset, men den øgede brug af fotoudstyr vil givetvis bidrage til, at flere fund dokumenteres, i stil med ovenstående fund. De danske fund fordeler sig geografisk på følgende regioner: NJ (3), RK (1), SJ (2), F (2), S (1) og B (1). I det øvrige Norden er der gjort følgende fund: 18 fund i alt i Sverige (Birdlife Sverige 2023), tre fund i Norge med ét i 2022 (Olsen 2023e), seks fund i Finland med ét fund i 2022 (Roni Väisänen pr. mail). (Sydeuropa, Tyrkiet, Kaukasus & Rusland; overvintrer Afrika syd for Sahara)

Slagfalk *Falco cherrug* (0, 3/3, 1/1)

2022: 21-23/4, Skagen (NJ), 2K trk.fors. og dernæst trk., Joakim Matthiesen, Mads Bjarke Salling, Stig Kjærgaard Rasmussen m.fl. (Foto).

Landets fjerde fund blev en fugl set i Skagen (NJ). Dermed fordeler de danske fund godkendt i kategori A sig på to forårsfund og to efterårsfund. Forårsfundene omhandler begge 2K-fugle trækkende ved Skagen (NJ), hvor første fund var 6-7/5 2006 (SU-rapport 2018) og andet fund ovennævnte fra 2022, mens efterårsfundene er en 1K på Værnengene (RK) 17-21/8 2017 (SU-rapport 2018) og en 2K ved Ballum Forland (SJ) 4/8-9/10 2018 (SU-rapport 2018). Observationer af storfalke og vurdering af de enkelte funds spontanitet er generelt besværliggjort af undslupne falkonerfugle, men det er også kendt, at opdrættede storfalke, som eksempelvis slagfalk, sættes fri i en periode, angiveligt for at opnå en højere markedsverdi af en naturligt trænet falk. Årets fugl var

uden tydelige tegn på en fortid i fangenskab, optrådte på et forventeligt tidspunkt i en periode med højtryksvejr og østenvind og med et for årstiden forventeligt slid i fjerdragten for en 2K-fugl, hvorfor Sjældenhedsudvalget har godkendt fundet i kategori A. (sydlige Rusland, Mellem- & Sydøsteuropa; overvintrer Sydøsteuropa, Mellemøsten & Nordøstafrika).

Jagtfalk *Falco rusticolus* (40/40, 135/136, 3/3)

2009: 5/1, Højerup, Stevns (S), 2K, *Jørgen Hulbæk Christiansen, Tim Andersen. – 6/1 Jungshoved, Stevns (S), 2K, *Preben Berg, Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl. – 11-16/1, Stevnfortet, Stevns (S), 2K, Thomas W. Johansen, Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl. (Foto). – 25-27/1, Sevedø Fed (S), 2K, *Rasmus Bøgeskov Larsen, Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl. – 12+15+21/2, Stevns (S), 2K, Helge Sørensen, Thomas W. Johansen, Henrik Kristensen (Foto).

2022: 9/10, Mandehoved & Storedal, Stevns (S), 1K, Tim Andersen, Jan Pedersen m.fl. (Foto). – 12-14/10, Sydvestpynten og Kalvebod Fælled, Amager (S), 1K, *Steffen Sommer Nielsen m.fl. (Foto). – 12/12, Keldsnor, Langeland (F), 1K, Anonym (Foto).

Alle fundene i 2009 drejer sig om samme fugl, der tidligere blot har været godkendt for datoerne 5-6/1, 11-16/1 og 25/1 (SU-rapport 2009). Fundene i 2022 regnes som tre separate fund og omfatter alle 1K-fugle set i den østlige og sydlige del af landet. Først gjordes to fund inden for kun fire dage på Sjælland i midten af oktober og efterfulgt af ét fund i december på Langeland, hvor arten optræder fåtalligt, og således blot udgør tredje fund for øen. Arten har været årlig siden 2003, og årets fund understøtter, at forekomster primært udgøres af ungfugle på træk om efteråret eller overvintrende i vinterhalvåret ved især kystnære vådområder. (Nordskandinavien & Rusland)



Klippesvale, Mandø, 13. november 2022. Foto: Henrik Baktoft.

Rødhovedet tornskade *Lanius senator* (2/2, 48/48, 1/1)

2022: 24/5, Hammeren (B), 3K+ han, *Allan Bech m.fl. (Foto).

De fleste fund er gjort om foråret i perioden primo maj-medio juni, og således også årets fund, der udgør det tredje fund på Hammeren, og femte for Bornholm medregnende Christiansø. Arten optræder næsten årligt herhjemme. (Sydeuropa; overvintrer Afrika)

Klippesvale *Ptyonoprogne rupestris* (0, 5/5, 1/1)

2022: 13/11, Mandø (RB), rst., derefter trk., *Tim Hesselballe Hansen, Henrik Baktoft, Andreas Winding Mønsted (Foto).

Første fund siden 2013 og det kun andet efterårsfund. Fundet blev gjort i en periode med usædvanligt mildt vejr med varme sydlige vinde, der også medførte en større forekomst af gråsejler (*Apus pallidus*). Månedsfordelingen af de seks fund af klippesvale er: maj (3), juni (1) og november (2). I det øvrige Norden foreligger følgende antal fund: fire fund af i alt syv fugle i Sverige, seneste i 2011 (Birdlife Sverige 2023), ét i 2011 i Norge (Norgeslisten 2023) og fire i Finland, hvor seneste var i 2018 (Roni Väisänen pr. mail). (Mellem- & Sydeuropa)

Himalayasanger *Phylloscopus humei* (0, 35/35, 9/9)

2022: 21/10, Amager Fælled (S), *Finn Olofson (Lyd). – 27/10, Røsnæs (S), *Jan Lindgaard Rasmussen (Foto). – 28/10, Fanø Klitplantage (RB), *Benjamin Gnep (Foto & Lyd). – 4/11, Gedser Odde (LF), Henrik Jørgensen, Anne Ramskov Hermanns, Ole Friis Larsen m.fl. (Lyd). – 11/11, Harboøre Tange (RK), *Frits Rost (Foto). – 12/11 + 26/11, Mandø (RB), *Sigrid Kistrup Ilsøe, Jørn Vinther Sørensen, Tim Hesselballe Hansen m.fl. (Foto & Lyd). – 25-28/11, Lille Vejlesø, Ishøj Strand (S), *Jonas Hansen Tchikai m.fl. (Foto & Lyd). – 2-18/12, Nyord Kirkegård, Nyord (M), *Uffe Damm Andersen, Ole Lund Jensen, Per Schiermacker-Hansen m.fl. (Foto & Lyd). – 27-31/12, Vesteregn, Langeland (F), *Torbjørn Eriksen, Michael Bjerregaard m.fl. (Foto & Lyd).

Med hele ni fund blev året det næstbedste, kun overgået af 2003 med ti fund (SU-rapport 2003, SU-rapport 2006). Alle årets fund er gjort om efteråret og tidlig vinter, i tråd med det hidtil etablerede forekomstmønster (Christensen et al. 2022). Formentligt som følge af usædvanligt mildt efterårsvejr, blev der for første omgang observeret overvintringsforsøg, endda på lokaliteter: Nyord ved Møn og Vesteregn på Langeland. Samme exceptionelle forekomst sås i landene omkring Danmark med seks fund i Norge (62



Schwarz' løvsanger, Agger Tange, 9. oktober 2022. Foto: Sakari Kauppinen.

fund i alt) (Olsen 2023e), seks fund i Finland (104 fund i alt) (Roni Väisänen pr. mail), tre fund i Polen (ni fund i alt) (Tadeusz Stawarczyk pr. mail), elleve fund i Storbritannien (166 fund i alt) (Louise Bacon pr. mail), ni fund under behandling i Tyskland (56 fund i alt t.o.m. 2020) (Christopher König pr. mail), 16 fund i Sverige (124 fund i alt t.o.m. 2021, hvorefter arten ikke længere har skullet forelægges Raritetskommittén) (Artportalen 2023, Birdlife Sverige 2023). (Centralasien; overvintrer Nepal & Indien)

Schwarz' løvsanger *Phylloscopus schwarzi* (0, 31/31, 3/3)

2022: 9/10, Agger Tange (NJ), 1K han ringm., *Morten Jenrich Hansen, *Arne Urvang m.fl. (Foto). – 9/10, Mandø (RB), *Tim Hesselballe Hansen, *Thomas W. Johansen (Lyd). – 19-24/10, Sønder Lyngvig, Hvide Sande (RK), 1K, *Ole Amstrup, Kristian Tikjøb Olsen m.fl. (Foto).

I lighed med den øgede forekomst af himalayasanger (*Phylloscopus humei*) blev der med tre fund af schwarz' løvsanger i 2022 gjort flere fund end normalt, hvilket kun er overgået af 2017 med fem fund (SU-rapport 2017). Årets fund omfattede to endagsfugle, der bemærkelsesværdigt begge blev fundet den 9/10, samt en stationær fugl ved Sønder Lyngvig, der blev velbesøgt i perioden. Forekomsten i landet er ret koncentreret primo og medio oktober, i intervallet 21/9-24/10, hvorfor fundet ved Sønder Lyngvig således er den hidtil senest forekommende. Norge oplevede også en stor forekomst, idet der blev gjort seks fund, hvilket var en tredobling af tidligere årsrekord (26 fund i alt) (Olsen 2023e). I Finland blev der gjort ét fund (31 fund i alt) (Roni Väisänen pr. mail), mens efteråret i Sverige bød på 18 fund af i alt 24 fugle, heraf 12 fund af i alt 18 fugle på Øland alene (Artportalen 2023). Der foreligger i Sverige i alt 109 fund t.o.m. 2020, hvorefter arten ikke længere har skulle forelægges Raritetskommittén. (Sydøstlige Sibirien; overvintrer Sydøstasien)

Brun løvsanger *Phylloscopus fuscatus* (0, 89/89, 1/1)

2021: 2-3/11, Mandø (RB), *Sebastian Klein (Lyd).

2022: 12-13/11, Fjand, Helm Klit Banke (RK), *Kurt Willumsen m.fl. (Lyd).



Lille rørsanger, Grenen, Skagen, 7. juni 2022.
Foto: Sakari Kauppinen.

Med tilføjelsen af fundet fra 2021, blev totalen for dette år på fem fund. Derfor er det også bemærkelsesværdigt, at der kun blev gjort ét fund i 2022, når der i efteråret var væsentligt større forekomster end normalt af de langt sjældnere arter schwarzh' løvsanger og himalayasangere, der ligesom brun løvsanger gæster os fra Central- og Østasien. Både fundet fra 2021 og fra 2022 følger det etablerede forekomstmønster i landet med efterårsfugle, ofte langs den jyske vestkyst, hvor middeldato tidligere er opgjort til 24/10 (Christensen *et al.* 2022). Det første danske fund af brun løvsanger blev gjort på Christiansø 22/10 1980 (SU-rapport 1979-1980), og der har siden været en gradvis stigning i antallet af fund, om end der har været store udsving i antallet af fund de enkelte år. Særligt tre år skiller sig ud, med usædvanligt store forekomster: 2020 (12) (SU-rapport 2020), 1987 (11) (SU-rapport 1986-1987 og SU-rapport 1988) samt 1991 (10) (SU-rapport 1991). Forde-

lingen af de danske fund på årtier er følgende: 1980-1989 (12), 1990-1999 (17), 2000-2009 (17), 2010-2019 (26), 2020-2022 (18). Ertholmene er det sted med flest fund, således hele 32 fund, hvilket udgør mere end en tredjedel af de 90 godkendte danske fund. Herudover er de fleste fund gjort langs den jyske vestkyst, særligt i den sydvestlige del, fordelt på følgende områder: Blåvand (16), Mandø (5) og Fanø (2). Dette afspejles også tydeligt i fordelingen af fund på regioner: NJ (11), RK (4), RB (23), ÅH (1), VE (1), SJ (1), F (0), S (10), LF (1), M (1), B (34). Arten forekommer som andre sibiriske sangere næsten udelukkende om efteråret, hvor tidligste forekomst er 24/9 2008 på Christiansø (SU-rapport 2008). Langt de fleste fund er gjort i oktober, men der er også flere fund i det sene efterår i november og egentlige vinterfund i december (2) og januar (1). Brun løvsanger er aldrig truffet om foråret, men alene efterår og vinter, med følgende månedsfordeling: januar (1), september (3), oktober (70), november (14) og december (2). Da artens forekomst i Danmark er særdeles veldokumenteret, udgår brun løvsanger af SU-listen pr. 1/1 2023. Tilsvarende skal arten heller ikke længere forelægges de nationale sjældenhedsudvalg i hhv. Sverige (efter 2006) og Finland (efter 2018). Arten skal fortsat godkendes af det norske sjældenhedsudvalg. Der er gjort 96 fund af arten i Norge t.o.m. 2022 (Olsen 2023e). (Østlige Asien; overvintrer Sydøstasien)

Lundsanger *Phylloscopus trochiloides* (2, 279-286/280-287, 0)

1979: 2/6-10/7, Kongelunden, Amager (S), 2 (han og hun, ynglepar m. 6 pull.), *Bent Bøggild Pedersen, Michael Fink Jørgensen, Hans Peter Jensen m.fl. (Foto & Lyd).


Der er tale om det første sikre ynglefund i Danmark, hvilket er seks år tidligere end hvad der hidtil har været regnet som Danmarks første yngleforsøg i 1985 (SU-rapport 1985) og elleve år tidligere end hvad der



Makisanger, Blåvands Huk, 15. maj 2022. Foto: Sakari Kauppinen.



Stendrossel, Fornetofte Marker, Borreby Mose, 30. april 2022.
Foto: Ingela Hallin.



Blåstjert, Mandø, 15. oktober 2022. Foto: Thomas W. Johansen.

har været regnet som det første sikre ynglefund i 1990 (SU-rapport 1990). I henhold til europæisk standard regnes ynglefund (inkl. unger) som ét fund, hvorfor unger af danske yngleførekoster ikke medregnes i opsummeringen. Fund af lundsanger efter 1992 skal ikke forelægges Sjældenhedsudvalget (SU-rapport 1992). (Finland, Baltikum, Nordøstlige Europa & Rusland; overvintrer Indien & Sydøstasien)

Lille rørsanger *Acrocephalus agricola* (0, 17/17, 2/2)

2022: 7/6, Grenen, Skagen (NJ), ringm., Lisa Vergin, Alice Scalzo, Simon S. Christiansen m.fl. (Foto). – 25/6, Grenen, Skagen (NJ), ringm., *Leona Gottschalkson m.fl. (Foto).

Årets to fund blev begge gjort i Skagen i forbindelse med ringmærkning og udgør hhv. ottende og niende fund her, alle siden 2007. Idet arten lever diskret i krat og rørskove, kan langt de fleste fund i landet henføres til ringmærkning (16 fund) og med ovenstående fund er månedfordelingen som følger: maj (3), juni (10), august (2), september (3) og oktober (1). Der er således en overvægt af forårsfund, hvilket formentligt kan henføres til særligt Skagens geografiske placering, men også kontinuerlige ringmærkningsindsats i juni måned. (Bulgarien, Rumænien til Centralasien; overvintrer fra Iran til Myanmar)

Cistussanger *Cisticola juncidis* (0, 4/4, 1/1)

2022: 27/6 + 5/7, Grenen, Skagen (NJ), han syng., *Rolf Christensen, Jørgen Kabel m.fl. (Lyd)

Fjerde fund i Skagen, hvor det seneste var i 2020. Alle danske fund er således gjort i Skagen på nær ét enkelt fund fra det øvrige Danmark: 18-25/8 2002 Sønderho, Fanø (SU-rapport 2003). At Skagen udmærker sig ved majoriteten af de danske fund, kan formentlig henføres til oddens opsamling af trækforsøgende fugle, samt en god observatørdækning. Arten har siden 1990'erne ekspanderet mod nord efter en række milde vintre, og der har i visse år siden år 2000, været over 100 territoriehævdende hanner i Holland (Christensen et al. 2022). Ligeledes konstateredes første ynglefund i Tyskland i 2020 (SU-rapport 2020). Artsens fremgang i den nordlige del af udbredelsesområdet og antallet af fund på toppen af Danmark, vil måske også føre til flere fund i det øvrige Norden, men indtil nu foreligger der blot ét fund fra Sverige i 2000 (Birdlife Sverige 2023), mens arten hverken er truffet i Norge (Norgeslisten 2023) eller Finland (Roni Väisänen pr. mail). (Syd- & Vesteuropa)

Gærdesanger *Curruca curruca*

Med karakterer svarende til sibirisk gærdesanger / steppegærdesanger ssp. *blythi* / *halimodendri* (0, 5/5, 1/1)

2022: 8/10, Agger, Thy (NJ), *Henrik Haaning Nielsen, Ulf Eschou Møller, Lars Grøn m.fl. (Foto & Lyd).

Siden 2012 har genetiske analyser af 170 prøver indsamlet fra gærdesangere på træ i Vesteuropa vist, at sibirisk gærdesanger (*C. c. blythi*) er en ret almindelig trækfugt i Vesteuropa. Her ses underarten fra september til november med de fleste fund medio til ultimo oktober, og individer kan lejlighedsvis overvintrer, mens steppegærdesanger (*C. c. halimodendri*) forekommer i samme periode, om end underarten er meget sjældnere end sibirisk gærdesanger (Collinson et al. 2022). (Rusland, Sibirien, Kasakhstan, Usbekistan, Turkmenistan til Mongoliet & Kina; overvintrer sydlige Asien)

Makisanger *Curruca subalpina* (0, 0, 1/1)

2022: 15/5, Blåvands Huk (RB), 2K han, *Bent Jakobsen m.fl. (Foto & Lyd).

Ny art for landet. Læs mere om nærværende fund andetsteds i Fugleåret (Olsen 2023c). (Nordvestlige Italien, Korsika, Sardinien & Baleariske Øer; overvintrer nordvestlige Afrika)

Sortstrubet drossel *Turdus atrogularis*

(2/2, 16/16, 1/1)

2022: 14/12, Rindum, Ringkøbing (RK), han, *Finn Bro (Foto).

Hermed det 19. danske fund og det sjette fra december, som dermed er den bedste måned for arten. Månedsfordelingen for de øvrige fund er: januar (4), februar (2), april (1), oktober (3) og november (2). Landets første fund fra 1822 i Herlufmagle (S) er kun angivet med årstal og indgår derfor ikke i månedsfordelingen. De danske fund fordeler sig geografisk på blot fire af de elleve regioner, som Sjældenhedsudvalget opdeler Danmark i: NJ (4), RK (3), RB (2) og S (10). Arten er således aldrig truffet på hverken Bornholm, Lolland, Falster, Møn, Fyn, Østjylland eller i Sønderjylland. (Sibirien; overvintrer fra Iran til Myanmar)

Blåstjert *Tarsiger cyanurus* (0, 29/29, 4/4)

2022: 24/9, Christiansø, Ertholmene (B), 1K ringm., *Anton Herrig Liebermann (Foto). – 25/9, Hanstholm Fyr (NJ), 1K/hun, *Rune Sø Neergaard, Kenneth Bach Christensen (Foto). – 4/10, Omø (S), 1K/hun ringm., *Johan-



Isabellastenpikker, Spodsbjerg, Hundested, 22. oktober 2022.
Foto: Lars Jensen.

nes Bang (Foto). – 15/10, Mandø (RB), 1K/hun, *Thomas W. Johansen m.fl. (Foto).

Med fire fund tangeres rekordåret 2018. Forekomsten er helt tidstypisk, da ikke færre end 28 af de 33 danske fund ligger i 31-dages perioden 22/9-22/10. De bedste danske lokaliteter for arten er Hanstholm med syv fund og Blåvands Huk med seks fund. (Finland, Rusland, nordøstlige Kina & Japan; overvintrer Korea, sydlige Kina, nordlige Indokina, Thailand & Myanmar)

Stendrossel *Monticola saxatilis* (0, 9/9, 1/1)

2022: 30/4, Fornetofte Marker, Borreby Mose (S), 2K han, *Ingela Hallin m.fl. (Foto & Død).

Danmarks tidligste fund. Arten er bortset fra et enkelt fund i oktober udelukkende truffet i maj (5) og juni (3). Den aktuelle fugl blev fundet omkring kl. 07:30 og sås frem til ved 12-tiden, hvorefter den forsvandt. Ved 15-tiden blev fuglen fundet, liggende døende på en mark, og den døde kort efter. Fuglen er sidenhen indleveret til skindsamlingen på Statens Naturhistoriske Museum, hvor den er blevet undersøgt og skindlagt. I den forbindelse kunne det konstateres, at fuglen havde et massivt hovedtraume og hjerneblødning i overensstemmelse med en kollision. Danmark har flest fund i Skandinavien, da arten blot er truffet fem gange i Sverige (Birdlife Sverige 2023) og fire gange i Norge (Norgeslisten 2023). (Syd- & Østeuropa; overvintrer Afrika)

Sibirisk bynkefugl / japansk bynkefugl *Saxicola maurus* / *Saxicola stejnegeri* (0, 50/50, 1/1)

2022: 8/10 + 15-16/10, Grenen, Skagen (NJ), 1K/hun, *Rolf Christensen, Erik Christophersen m.fl. (Foto).

Med en uge mellem de to forekomster ville det være nærliggende at tro, at der var tale om to forskellige individer. Der blev dog taget gode fotos, som afslører, at det med overvejende sandsynlighed drejer sig om samme fugl. Artsparret udgør en af nutidens større bestemmelsesmæssige udfordringer, og Sjældenhedsudvalget er på baggrund af et nyt studie af dragt karakterer (Hellström & Waern 2021) i gang med en genbehandling af alle fund tilhørende artsparret. Pågældende studie viste, at arterne har stor variation i dragten, men afslørede også, at visse



Vestlig middelhavstenpikker, Rindby Strand, Fanø, 6. november 2022. Foto: Bo L. Christiansen.



Isabellastenpikker, Storvorde, 5. november 2022.
Foto: Casper Sylvester Conradsen.

individer af begge arter kan artsbestemmes i felten og ud fra gode foto. Indtil videre publiceres alle danske fund som ubestemte, hvis der ikke foreligger en DNA-undersøgelse, med undtagelse af hanner af sibirisk bynkefugl ssp. *hemprichii*, hvis haletegning udelukker andre underarter og arter inden for komplekset.

Isabellastenpikker *Oenanthe isabellina* (0, 3/3, 3/3)

2022: 14/10, Ejstrup Strand, Tranum (NJ), *Peter Hedegaard Kristensen m.fl. (Foto). – 22/10, Spodsbjerg, Hundested (S), *Diderich Diderichsen, Michael Trasborg, Søren Haaning Nielsen m.fl. (Foto). – 5/11, Storvorde (NJ), *Casper Sylvester Conradsen m.fl. (Foto).

Rekordforekomst. Årets tre fugle fordoblede antallet af danske fund. Samtlige danske fund er fra det sene efterår i perioden 13/10-14/11. Også i flere af vores nabolande var der en del fund i 2022, eksempelvis var der fire fund i Holland, hvilket er ny rekord (CDNA 2023). I Finland var der ligeledes fire fund (Roni Väisänen pr. mail), ét i Sverige (Niklas Andersson pr. mail), ét i Polen (Tadeusz Stawarczyk pr. mail), to i Tyskland (Christopher König pr. mail) og to i Storbritannien (Louise Bacon pr. mail). (Tyrkiet, centrale Asien; overvintrer Afrika, Arabiske halvø & nordvestlige Indien)


Vestlig middelhavstenpikker *Oenanthe hispanica* (0, 3/3, 1/1)

2022: 1-6/11, Rindby Strand, Fanø (RB), 1K han, *Kim Fischer m.fl. (Foto).

Efteråret 2022 udmærkede sig med fund af hele tre forskellige sjældne stenpikkerarter. Det aktuelle fund udgør landets fjerde fund af vestlig middelhavstenpikker.



Hvidkindet værling, Frederikssø, Ertholmene, 21. oktober 2022. Foto: Anton Herrig Liebermann.



Pileværting, Christiansø, Ertholmene, 19. september 2022. Foto: Anton Herrig Liebermann.

ker. De tidligere fund ligger fænologisk set ret spredt. Disse er: 10-21/6 2000, Aflandshage, Amager (S), 2K han (SU-rapport 2000), 1-8/11 2011, Thorsminde (RK), 1K han (SU-rapport 2011) og 26/12 2018-3/1 2019 Sundstrup (NJ), 1K hun (SU-rapport 2018). (Vestlige Middelhavsområde; overvintrer tropisk Afrika)

Nonnestenpikker *Oenanthe pleschanka* (0, 13/13, 2/2)

2022: 15/10, Bøjden Nor (F), hun, *Esben Aagaard, Flemming Agner Jørgensen (Foto). – 29/10, Stenbjerg Landingsplads, Nørre Vorupør (NJ), 1K han, *John Kyed m.fl. (Foto).

To årstidsmæssigt meget typiske fund. Af Danmarks 15 fund er hele elleve fra oktober. De øvrige fordeler sig på maj (2), juni (1) og november (1). Fuglen ved Bøjden Nor er første fund på Fyn. (Bulgarien, østlige Rumænien & videre østpå til Mongoliet; overvintrer Østafrika)


Alpejernspurv *Prunella collaris* (0, 15/15, 1/1)

2022: 2/5, Grenen, Skagen (NJ), rst. og dernæst trk.fors., *Daniel Palm Eskildsen, Nina Yasmin Ali, Joshua Emil Haahr m.fl. (Foto).

Danmarks 16. fund og et tidstypisk et af slagsen, da samtlige fund på nær ét, ligger i den forholdsvis korte periode 10/4-11/5. Kun et fund fra Christiansø 21-30/6 1990 skiller sig datomæssigt ud. Skagen er med nu fem fund Danmarks bedste lokalitet for arten. Christiansø var med fire fund førhen Danmarks bedste lokalitet, men her er alpejernspurv ikke registreret siden 1990. (Mellem- & Sydeuropa)



Nonnestenpikker, Stenbjerg Landingsplads, Nørre Vorupør, 29. oktober 2022. Foto: Henrik Haaning Nielsen.



Tajgapiber, Røsnæs Fyr, 20. oktober 2022. Foto: Jan Lindgaard Rasmussen.

Tajgapiber *Anthus hodgsoni* (0, 27/28, 6/6)

2022: 25/9, Grenen, Skagen (NJ), trk., *Rolf Christensen (Lyd). – 11/10, Blåvands Huk (RB), *Jonas Pedersen, Sebastian Thorup Hansen m.fl. (Foto & Lyd). – 18/10, Mandø (RB), *Sigrid Kistrup Ilsøe, Frederik W. Johansen, Tim Hesselballe Hansen m.fl. (Foto & Lyd). – 18/10, Mandø (RB), *Jakob Engelhard, Tim Hesselballe Hansen m.fl. (Foto). – 20/10, Røsnæs Fyr (S), rst., derefter trk., *Jan Lindgaard Rasmussen (Foto). – 28/10, Blåvands Huk (RB), trk., *Henrik Böhmer, Joshua Haahr, Sebastian Thorup Hansen m.fl. (Lyd).

Med seks fund blev 2022 det hidtil bedste år for arten og overhalede 2014, hvor der var fem fund (SU-rapport 2014). Arten har nu været årlig i Danmark siden 2017. Det aktuelle fund fra Skagen er det første i Nordjylland og første jyske fund uden for region RB, som med hele 25 af de 33 danske fund er landets suverænt bedste område for arten. Fundet fra Røsnæs er desuden det første på Sjælland. Kendskabet til artens stemme og ikke mindst godt optageudstyr har uden tvivl været med til at øge antallet af bestemte tajgapibere herhjemme. Af de sidste ti danske fund hviler dokumentationen for hele seks af dem således udelukkende på optagelser af fuglenes kald. Både i Norge (Artsobservasjoner 2023) og i Holland (Dutch Bird Alerts 2023) var der influs af arten ultimo september. Arten skal ikke godkendes af de respektive sjældenhedsudvalg i hverken Norge eller Holland. (Sibirien mod vest til Ural; overvintrer Indien & Sydøstasien)



Gul sanger, Agger, Thy, 12. oktober 2022. Foto: Poul Holm Pedersen.

Hvidkindet værbling *Emberiza leucocephalos* (0, 6/6, 1/1)

2022: 21-23/10, Frederiksborg, Ertholmene (B), 1K han, *Anton Herrig Liebermann m.fl. (Foto).

Tredje år i træk med fund af arten. Sjettede danske fund af en han og anden gang, at arten ses på Ertholmene (B). I de øvrige nordiske lande var der ét fund i Finland (Roni Väisänen pr. mail), ét i Sverige (Niklas Andersson pr. mail) og ét i Norge (Olsen 2023e). (Nord- & Centralasien; overvintrer Sydøstasien)

Pileværbling *Emberiza rustica* (0, 55/55, 1/1)

2022: 19/9, Christiansø, Ertholmene (B), *Anton Herrig Liebermann (Foto).

Et fund, der nærmest ikke kunne være mere typisk. Med imponerende 25 fund er Ertholmene nemlig den suverænt bedste lokalitet for arten. September er med lige så imponerende 24 fund desuden bedste måned. De øvrige fund fordeler sig således: marts (3), april (1), maj (17), juni (5) og oktober (6). Artens bestand i Finland udviser i disse år stærk fremgang (Roni Väisänen pr. mail). (Nordlige Skandinavien, Finland & Rusland; overvintrer Kina & Sydøstasien)

Brunhovedet værbling *Emberiza bruniceps* (0, 2/2, 0)

2002: 7/9, Hønen, Fanø (RB), 1K han, *Lars Jensen, Klaus Malling Olsen, Andreas Bruun Kristensen m.fl. (Foto).

2019: 15/10, Blåvands Huk (RB), 1K, *Jonathan-Hemmer Hansen, Morten Bentzon Hansen m.fl. (Foto).

Fundet i 2002 har tidligere været godkendt som en adult hun hætteværbling (*Emberiza melanocephala*)

(SU-rapport 2013), men det er efter genbehandling nu ombestemt til brunhovedet værbling. Fuglen kunne aldersbestemmes til 1K, da den havde friske håndsvingfjer samt hånddækfjer med ensartede, lyse kanter. Håndsvingfjer og hånddækfjer ville i september være mere slidte på en 2K+. På flere fotos ses, at fuglen har én eller flere rygfjer med guligt anstrøg inderst, hvilket passer med postjuvenile fjer på han brunhovedet værbling, hvor hætteværbling han i postjuvenil dragt har brun ryg. Desuden har fuglen ret kraftig rygstriking, hvor både udbredelse og stribernes form ligeledes understøtter bestemmelsen til brunhovedet værbling. Flere observatører kommenterede under, og umiddelbart efter, observationen, at fuglen havde en rødlig plet centralt på brystet. Denne plet er svær at konstatere på fotos, men ét foto giver indtryk af en rødlig markering på brystet. På baggrund af ovenstående karakterer vurderer Sjældenhedsudvalget, at bestemmelsen til brunhovedet værbling er tilstrækkelig dokumenteret.

Fundet i 2019 har tidligere været godkendt som 1K hætte-/brunhovedet værbling (SU-rapport 2020), men er efter genbehandling nu ombestemt til brunhovedet værbling. Fuglen havde brede sorte striber på ryggen og kraftig striking på bryst og flanker. Disse kendetegn passer med 1K brunhovedet værbling i juvenil dragt. På baggrund af fotos og kommentarer fra Tor A. Olsen, der har gennemgået norske efterårsfund af hætte- og brunhovedet værbling, har Sjældenhedsudvalget vurderet, at dragten ligger uden for variationen hos 1K hætteværbling. Denne art har om efteråret typisk ustribet - eller svagt stribet - underside og smalle mørke striber på ryggen. På den baggrund er fundet godkendt som en 1K brunhovedet værbling.

Fundene fra 2002 og 2019 er godkendt i kategori A, da ingen af fuglene viste tegn på en fortid bag tremmer. Fuglen på Fanø fra 7/9 kan umiddelbart synes tidligt på efteråret, men arten forlader ynglepladserne i Kazakhstan fra ultimo juli til midten af august (Cramp *et al.* 1994), og der er fund i Indien i august (eBird 2023), hvor arten overvintrer. Fundet i Blåvand 15/10 passer fint årstidsmæssigt med et fund fra Norge af en 1K han, 22-23/10 2017 (Norgeslisten 2023) og Polen med et fund af en 1K 6/10 2022 (Tadeusz Stawarczyk pr. mail).

Der er tidligere godkendt syv danske fund af brunhovedet værling i kategori E – se afsnittet om denne kategori. (Centralasien; overvintrer i Indien)

Gul sanger *Setophaga aestiva* (0, 0, 1/1)

2022: 8-16/10, Agger, Thy (NJ), 1K, *Jan Drachmann, Frits Rost, Jens Skovgaard Pedersen m.fl. (Foto & Lyd).

Ny art for landet og første fund i Skandinavien. Læs mere om nærværende fund andetsteds i Fugleåret (Olsen 2023d). (Alaska, Canada & USA; overvintrer i Mellemamerika)

Kategori C: Fund af arter hvis bestande stammer fra udsatte eller undslupne fugle

Category C: Records relating to established feral breeding population

Amerikansk skarveand *Oxyura jamaicensis* (0, 12/12 ekskl. fund fra 1991-2012, 2/2)

2022: 13/2-13/3, Selsø Sø (S), 2K+ han vdr., *Ulla Munch Hansen m.fl. (Foto). – 6-18/4, Sjølsø (S), 2K+ han vdr., *Christian Glahder m.fl. (Foto). – 26-28/10, Føns Vang (F), hun, *Nis Rattenborg, Henrik Frier m.fl. (Foto).

Begge fund fra Sjælland drejer sig om samme individ. Fuglen i Selsø Sø fulgtes med en hvidhovedet skarveand, da den blev opdaget på lokaliteten. Fuglen blev forgæves forsøgt skudt, da arten anses som en trussel mod den europæiske bestand af hvidhovedet skarveand. Efter den fejlslagne jagt på fuglen i Selsø Sø, fortrak fuglen siden til Sjølsø. Her gjorde den ophold, denne gang uden den hvidhovedede skarveand. (Kategori C-bestand: Vesteuropa)

Stor hornugle *Bubo bubo* (0, 3/3, 1/2)

2022: 11-12/10 + 1/11, Middelfart (F), 2 (han og hun) syng., *Michael Brunhøj Hansen (Lyd).

Fund øst for Lillebælt er usædvanlige og skal forelægges Sjældenhedsudvalget som lokal SU-art. Fundet i 2022 er det andet fund på Fyn (F); første var en dødfunden på Vestfyn 7/11 2020 (SU-rapport 2020). Derudover foreligger der øst for Lillebælt blot to godkendte fund, begge dødfundne fugle på Falster i hhv. 2004 og 2005 (SU-rapport 2007). (Kategori C-bestand: Tyskland & Danmark)

Kategori D: Mulige undslupne fangenskabsfugle

Category D: Possible escapes

Hjelmskallesluger *Lophodytes cucullatus* (0, 13/13, 1/1)

2022: 11-24/12, Bygholm Enge, Horsens (VE), 2K+ han, Søren Manscher, Steffan Andersen m.fl. (Foto).

Fuglen bar ikke ringe eller viste tydelige tegn eller adfærd, der indikerer en fortid i fangenskab. Sådanne

fund er traditionelt blevet placeret i kategori D i lighed med fremgangsmåden i de fleste af vores nabolande. Sjældenhedsudvalget opfordrer til, at der under fremtidige observationer af hjelmskallesluger i Danmark, sørges for god dokumentation vedrørende adfærd, ringe på ben og eventuelle tegn i fjerdragten, der kunne tyde på en fugl undsluppen fra fangenskab. Dette med henblik på at alle fund er tilstrækkeligt dokumenteret i forhold til eventuel genbehandling af kategorisering i fremtiden. (Nordamerika)

Kategori E: Formodede eller sikre undslupne fangenskabsfugle

Category E: Presumed or certain escapes

Dværgcanadagås *Branta hutchinsii*

Med karakterer svarende til mørk dværgcanadagås, ssp. *minima* (0, 10/10, 0)

2019: 30/12, Favrholm Voldgrav, Hillerød (S), 2K+, *Christian Glahder (Foto).

Sjældenhedsudvalget er i gang med at behandle alle hidtidige fund af dværgcanadagås med henblik på at danne et overblik over artens forekomst i Danmark, idet fund af dværgcanadagås, ssp. *hutchinsii* kandididerer til at blive placeret i kategori A, mens mørk dværgcanadagås, ssp. *minima* er under evaluering i forhold til en placering i kategori C og ikke som nu i kategori E. (Kategori C-bestand: Holland)

Dværgsnegås *Anser rossii* (0, 7/10, 0)

2013: 16/2, Søer syd for Tårnholm, Korsør (S), 3 2K hvid form, Morten Bentzon Hansen, Pierre-Andre Crochet, Julien Mazenauer (Foto). – 1-5/3, Holløse Bredning (S), 3 2K hvid form, Tim Andersen, Jakob Engelhard m.fl. (Foto). – 17-19/5, Luddeholme og Hegnede Bugt (M), 3K+ hvid form, Sebastian Klein, Per Schiermacker-Hansen m.fl. (Foto).

2014: 29/4, Drejød Nørresø (F), 3K+ hvid form, *Erhardt Edmund Ecklon (Foto).

Fundet ved Korsør og Holløse Bredning vurderes at omhandle samme tre individer, der i øvrigt forinden havde ophold sig i Holland 8/12 2012-2/2 2013 (Waarneming 2023) og efterfølgende i Sverige 12/3-22/4 (BirdLife Sverige 2023). Fundet på Drejø vurderes at omhandle samme individ, der sås 27/3-14/11 2013 på Ærø (SU-rapport 2014). Der foreligger fem tidligere fund af seks fugle i kategori E: 7/2-7/3 1997, Vejlerne (NJ), 3K+ (SU-rapport 1997), 3-13/10 1998, Ballum Enge og Forland (SJ), 2K+ (SU-rapport 1998), 15/10 2000, Margrethe Kog (SJ), 2K+ rst. og dernæst trk. (SU-rapport 2000), 27/3-14/11 2013, Vitsø og Stokkeby Nor, Ærø (F), 2K+ (SU-rapport 2014), 16/7 2020, Saltholm (S), 2 3K+ (SU-rapport 2021) og 18-23/7 2020, Klydesøen og Villahøj Sø, Kalvebod Fælled (S), 2 3K+ (SU-rapport 2021, SU-rapport 2022), hvor fundet på Saltholm, Klydesøen og Villahøj Sø vurderes at omhandle samme individer. Mens fuglen på Ærø i 2013 og Drejø i 2014 sås godt nok til, at det kunne udelukkes, at den var ringmærket, så kunne det ikke afgøres, om fuglen i Margrethe Kog i 2000 og/eller fuglene på Saltholm og Kalvebod Fælled i 2020 bar ringe; fuglen i Margrethe Kog var i flok med bramgæs (*Branta leucopsis*), mens fuglene på Saltholm



Lammegrib, Jægerspris Nordskov, 15. maj 2022. Foto: Peter Jørgensen.

og Kalvebod Fælled holdt til sammen med grågæs (*Anser anser*). Derimod har alle øvrige fugle, hvor fundene er godkendt i kategori E, båret farvede ringe, hvilket beviser eller kraftigt indikerer, at de er undslupne fangenskabsfugle. Sjældenhedsudvalget opfordrer alle til at indsende fund, der ikke fremgår af listen ovenfor, også selvom fuglen(e) har båret ring, så udvalget kan danne et overblik over artens forekomst i Danmark, idet arten med denne rapport indgår på den danske liste i kategori A. (Nordamerika)

Marmorand *Marmaronetta angustirostris* (0, 1/1, 1/1)

2022: 24-30/8, Lillesø og Ry Møllekanal, Ry (ÅH), 2K+, *Thomas Secher Jensen m.fl. (Foto).

Fuglen var ikke ringmærket, men udviste en særdeles tam adfærd og vurderes derfor at omhandle en fugl, som er undsluppet fra fangenskab. (Spanien, Nordafrika, Tyrkiet & Mellemøsten)

Hjelmskallesluger *Lophodytes cucullatus* (0,7/7,1/1)

2022: 3/9-31/12, Hornbæk Enge og Gudenåen vest for Randers (ÅH), 2K+ hun, *Sebastian Klein, Michael Knudsen m.fl. (Foto).

Fuglen var ikke ringmærket, men udviste særdeles tam adfærd og vurderes derfor at omhandle en fugl, som er undsluppet fra fangenskab. (Nordamerika)

Japansk trane *Grus japonensis* (0, 1/1, 0)

2022: 5/1, Ødis Sø (VE), Sten Nielsen (Foto). – 27/2, Svanemosen, Kolding (VE), via Aleks Lund (Foto). – 23/4,

Jelssøerne, Jels (SJ), via Aleks Lund (Foto). – 28/4-27/9, Egholt, Gejsing Skov, Røj Mose og Bøllingbæk, Kolding (VE/RB), Jørn Chemnitz Kristiansen, Tina Ellegaard m.fl. (Foto). – 27/11-31/12, Røj Mose (RB), Lars Paulsen, Lea Riis Stenfeldt m.fl. (Foto).

Fuglen er set i området siden august 2020 og er undsluppet fra Skærup Zoo (SU-rapport 2020, SU-rapport 2021). (Sydøstlige Sibirien, Nordøstkina & Japan)

Kohejre *Bubulcus ibis* (0, 2/2, 1/1)

2022: 23/10, Fruens Bøge, Odense (F), *Anni Immerkær Andersen (Foto).

Tredje danske fund af en undsluppen kohejre drejer sig om en fugl, der var undsluppet fra Odense Zoo. De to første er fra hhv. 1985 (SU-rapport 1985) og 1989 (SU-rapport 1989), begge gange slap en fugl ud fra Københavns Zoo. Fuglen i 1985 havde en klippet vinge og sås efterfølgende på både Amager og i Skåne, mens fuglen fra 1989, der var forsynet med en ring, sås på en række sjællandske lokaliteter samt på Lolland. (Sydeuropa, Mellemøsten & Nordafrika)

Hammerhovedhejre *Scopus umbretta* (0, 0, 1/1)

2022: 25/5, Aalborg (NJ), *John Brask m.fl. (Foto).

Første danske fund af denne karakteristiske art. Fuglen var samme dag undsluppet fra Aalborg Zoo, som ligger blot 500 meter fra fundstedet (Nordjyske 2023). (Afrika & den sydligste del af den Arabiske Halvø)

Lammegrib *Gypaetus barbatus* (0, 5/5, 2/2)

2022: 15-16/5, Jægerspris Nordskov, Kikhavn, Ullerup

Skov, og Slettemose, Rørvig (S), 2K trk., *Peter Jørgensen, *Michael Trasborg, Klaus Bjerre m.fl. (Foto). – 18/5, Grip-penfeld, Tønder (SJ), 2K, Lars Nielsen (Foto). – 10-12/6, Råbjerg, Hulsig Hede og Skagen (NJ), 2K rst., derefter trk. fors., Laila Neermann m.fl. (Foto).

Fundene fra Sjælland og Sønderjylland involverer samme fugl, mens fuglen fra Råbjerg og Skagen ud fra dragt-karakterer vurderes at være en anden. Ingen af fuglene havde blegede svingfjer, hvilket ellers kendetegner fugle, der stammer fra de sydeuropæiske udsætningsprojekter. Begge fugle er således formentlig klækket i naturen. Det ændrer dog ikke på kategoriseringen, da Sjældenheds-udvalget vurderer, at fuglene efter al sandsynlighed er efterkommere af fugle fra de eksisterende udsætningsprojekter. Disse projekter har fortsat ikke opbygget en selvsupplerende bestand, hvorfor også efterkommere af udsatte fugle placeres i kategori E. (Sydeuropa & Nordvestafrika til Nordøstlige Kina; Himalaya til Nepal & vestlige Pakistan)

Hvidhovedet havørn *Haliaeetus leucocephalus* (0, 0, 1/1)

2022: 19/4, Mellerup, Randers (ÅH), 5K+, Martin Toft Hansen (Foto). – 20-22/4, Jesperhus, Nykøbing Mors (NJ), 5K+, Bo Lehm m.fl. (Foto). – 27/4, Ringkøbing (RK), 5K+, Morten Stricker m.fl. (Foto).

Første danske fund af denne karakteristiske art. Fuglen var undsluppen fra den tyske rovfuglepark Adlerwarte Berlebeck. Fuglen blev indfanget og transporteret tilbage til Tyskland (TV2 2022). (Nordamerika)

Amerikansk tårnfalk *Falco sparverius* (0, 7/7, 1/1)

2022: 27-28/8, Vinding, Vejle (VE), 2K+ han, Hanne Brøndum, Paul Brøndum (Foto).

Der foreligger nu i alt otte fund af amerikansk tårnfalk, der er vurderet at være undslupne fugle. De fem første fund var alle fra Sjælland i årene 2012-2015 (Christensen et al. 2022), mens de tre seneste i årene 2020-2022, inklusive dette års fund, alle har været i det sydøstlige Jylland omkring Horsens og Vejle. (Nordamerika)

Jagtfalk *Falco rusticolus* (0, 10/10, 1/1)

2022: 27/6, Glimsholt, Sindal (NJ), 1K-type, Kristian Nygren Holm (Foto).

Forekomsten af en 1K-type midt sommer afviger fra artens forekomst i landet, idet arten normalt ankommer fra ultimo september, med de fleste fund omkring ultimo oktober og primo november. Endvidere udviste fuglen tillidsfuld adfærd og på billeder så det ud til, at den enten bar en sender på det ene ben eller havde en strop. (Nordskandinavien & Rusland)

Broget krage *Corvus albus* (0, 0, 1/1)

2022: 27/3, Hammeren (B), trk.fors., *Carsten Andersen, Erik Sand (Foto).

Første danske fund af denne karakteristiske art. Det er oplagt, at der er tale om samme individ, som sås på Rügen ud mod Østersøen i det nordlige Tyskland 21/3 2022 (Ornitho 2023). Broget krage yngler i Afrika syd for Sahara, og aktuelt betragtes europæiske fund af arten som fugle, der er undsluppet fra fangenskab, selvom det ikke kan udelukkes, at det kan dreje sig om fugle, der har

været blinde passagerer på skibe. Flere fund af arten i Storbritannien har vist sig at være undslupne fra fangenskab. En fugl, der dukkede op i Storbritannien i 2018, og som sås i Holland og Tyskland i 2019, kunne dog ikke umiddelbart spores tilbage til fangenskab, men fundet er ligesom øvrige britiske fund godkendt i kategori E (Viles 2018). (Afrika syd for Sahara)

Rødvinget sortstær *Onychognathus morio* (0, 0, 1/1)

2022: 30/5, Engklit, Skagen (NJ), hun trk., *Casper Sylvestor Conradsen, Anders Rasmussen, Rasmus Matthiesen-Juhl m.fl. (Foto). – 3/6, Lønstrup (NJ), hun, Allan Pade, Jonna Andreassen, Conny Jensen m.fl. (Foto). – 4/6, Løkken (NJ), hun, Kirsten Marie Kjær Gunvald (Foto). – 5/6, Hirtshals (NJ), hun, Allan Kynn Jensen (Foto). – 14/6, Skagen Havn (NJ), hun, via Knud Neergaard Flensted (Foto). – 16/6, Sæby Havn (NJ), hun, Kristina Dettmann Sørensen (Foto). – 26/6, Lønstrup (NJ), hun, Malene Elholm Jeppesen (Foto). – 16/8, Grenen, Skagen (NJ), hun trk.fors., Rolf Christensen (Foto). – 21/8, Fyrklit, Hirtshals (NJ), hun, Preben Christensen (Foto). – 30/8, Hirtshals (NJ), hun, Ragnar Smith (Foto). – 3/9, Grenen, Skagen (NJ), hun trk.fors., Rolf Christensen. – 21/9, Hirtshals (NJ), hun, Karen Bennedsen (Foto).

Første danske fund af denne art. Alle iagttagelser vurderes at omhandle samme individ. Fuglen blev oprindeligt bestemt til tristræms sortstær (*Onychognathus tristræmus*), men billeder tillod efterfølgende, at den kunne ombestemmes. (Østlige Afrika fra Eritrea til Sydafrika)

Brunhovedet værling *Emberiza bruniceps* (0, 7/7, 0)

1966: 4-7/6, Stausø, Henne (RB), 2K+ han syng., *Finn Birkholm-Clausen, Ole Hansen.

1967: efter 16/8, Febersted, Hanstholm (NJ), 2K+ han fundet død, *Hans Peter Christensen (Foto & Død).

1974: 22/7, Viborg (NJ), 2K+ han, *Steen Frandsen (Foto).

1979: 13/5, Hanstholm Fyr (NJ), 2K+ han, Hanne Eriksen, Jens Eriksen m.fl.

1979: 25/5, Annelbanken, Mandø (RB), 2K+ han, *Nis Rattenborg.

1983: 5/8, Arup (NJ), 2K+ han, Lars Witting, Karsten Nørgaard, Helge Røjle Christensen m.fl. (Foto).

2001: 10/5, Listed, Svaneke (B), 2K+ han, Hans Lyster, Lars Trolle (Foto).

Efter genbehandling er de syv nævnte fund godkendt i kategori E. Fundene fra 1966 til 1983 er fra en periode, hvor arten var almindeligt forekommende i fangenskab, hvilket taler kraftigt imod spontan forekomst i denne periode. Lignende forekomster er observeret andre steder i Europa (Vinicombe 2007). Fundet i 2001 blev vurderet til at være for tidligt på foråret til, at det kunne dreje sig om en spontan forekomst, da arten først ankommer til sine nærmeste ynglepladser i det nordlige Kasakhstan omkring midten af maj (Cramp et al. 1994). Lokaliteten på fundet i 1966 har tidligere været angivet som Henne Strand (RB), men nye oplysninger har klargjort, at fuglen sang i haven ved Stausø Skole, der lå øst for Henne, og nu er blevet erstattet af Blåbjerg Friskole & Naturbørne-

have, hvorfor lokaliteten hermed angives som Stausø (RB). Den præcise dato på fundet i 1967 er ukendt, men samleren mener, at jagten dengang gik ind efter 16. august, og at det var i perioden derefter, at han fandt den døde fugl ved en plantage nær Febbersted øst for Hanstholm. Den dødfundne fugl blev udstoppet og står nu på Hanstholm Friskole. (Centralasien; overvintrer Indien)

Husfinke *Haemorhous mexicanus* (0, 1/1, 1/1)

2022: 15/3, Boserup Vang, Gribskov (S), han, *Troels Eske Ortvad (Foto).

Arten er aldrig truffet spontant i Europa. Det aktuelle fund involverer en fugl, som var meget lidt sky og derfor med meget stor sandsynlighed omhandler en fugl undsluppet fra fangenskab. (Nord- & Mellemamerika)

Sortgrackel *Quiscalus quiscula* (0, 1/1, 0)

1970: 25/3-20/4, Gevninge (S), O. Schelde (Foto).

Siden 1990'erne har fundet været regnet som et kategori E fund, men dette har ikke tidligere været publiceret.

Grønland – Kategori A Greenland – Category A

Rørhøne *Gallinula chloropus* (0, 1/1, 0)

2019: forår, Station Nord, Nordgrønland, fundet død, *Sirius Slædepatrulje, Bjarne Jensen (Foto).

Rørhønen (*Gallinula chloropus*) og amerikansk rørhøne (*G. galeata*) er nu splittet i to arter (Gill *et al.* 2023). De kan kendes fra hinanden på morfologiske karakterer såsom pandeskjoldets form, genetiske og vokale forskelle, og den dødfundne fugl i 2019 var den europæiske art. Fundet repræsenterer det første sikre af denne art i Grønland, hvor der er fem sikre fund af amerikansk rørhøne i 1908, 1928, 1972, 1984, 1991 (dokumenteret med skind) og derudover to fund i 1993 og 2022, som formentlig er den amerikanske art, men som omhandler feltobservationer, der ikke kan artsbestemmes med sikkerhed (Boertmann 1994). (Europa)

Rørhøne / amerikansk rørhøne *Gallinula chloropus* / *Gallinula galeata* (0, 1/1, 1/1)

2022: 7/11, Qaqortoq, Vestgrønland, *Ejvind-David Jerimiassen (Video).

Rørhønen og amerikansk rørhøne er splittet i to arter (Gill *et al.* 2023), hvor der er ét fund af rørhøne, fem sikre fund af amerikansk rørhøne og nu to fund, som ikke kan artsbestemmes med sikkerhed (Boertmann 1994).

Prærietrane *Antigone canadensis* (0, 4/4, 1/1)

2022: 25-27/7, Tasiussap Imaa, Svartenhuk Halvø, Vestgrønland, *David Boertmann, Janne Fritt-Rasmussen, Josephine Nymand m.fl. (Foto).

Femte grønlandske fund; de fire tidligere er fra Qaanaaq/Thule juli-august 1985 (Boertmann 1994), Qaanaaq/Thule august 1990 (SU-rapport 2000), Nuuk september-oktober 2007 (SU-rapport 2012) og Qaanaaq/Thule juni 2012 (SU-rapport 2012). Bemærk, at der var en fejl i opsummeringen i SU-rapport 2012 (se rettelser sidst i denne rapport). (Alaska & det nordlige Canada til Baffin Island; overvintrer sydvestlige USA)

Ringnæbbet måge *Larus delawarensis* (0, 7/8, 0)

2009: 20/7, Gurreholm, Jameson Land, Nordøstgrønland, 4K+, *Christian Glahder, *Alyn Walsh (Foto).

2011: 20-26/7, Station Nord, Nordgrønland, 3K, Bjarne Jensen (Foto).

Fundene i 2009 og 2011 er de eneste i Grønland siden 2007, hvor der var to fund af tre fugle (SU-rapport 2007). Ynglebestanden af arten i det østlige Nordamerika har udvist tilbagegang de seneste årtier, hvilket tillige har resulteret i en stor nedgang i antallet af fugle, der ses i Vesteuropa hvert år (Birdguides 2019). (Nordamerika)

Hornlunde *Fratercula corniculata* (0, 1/1, 0)

2022: 25/7, Dalrymple Rock, Nordgrønland, Kurt K Burnham, Jennifer L. Burnham, Jeff A Johnson m.fl. (Foto).

Arten blev set på lokaliteten hen over somrene 2002-2006, 2008, 2013-2019 (SU-rapport 2021) og 2022, hvorfor Sjældenhedsudvalget har vurderet, at det skal regnes som ét fund af én fugl. Læs mere om fundet i Nordgrønland i Burnham *et al.* (2020). Fra Vestpalæarktisk kendes blot ét fund; en fugl i sommerdragt fotograferet fra skib 10/8 2009 ud for øen Hornøya i Norge (Norgeslisten 2023). (Nordlige Stillehav)

Toplunde *Fratercula cirrhata* (0, 2/2, 0)

2022: 25/7, Dalrymple Rock, Nordgrønland, sdr., Kurt K. Burnham, Jennifer L. Burnham, Jeff A. Johnson m.fl. (Foto).

Arten blev set på lokaliteten både i 2019 (SU-rapport 2021) og 2022, hvorfor Sjældenhedsudvalget har vurderet, at fundet fra 2022 regnes som genganger fra 2019. Læs mere om fundet i Nordgrønland i Burnham *et al.* (2020). (Nordlige Stillehav)

Silkehejre *Egretta garzetta* (0, 0, 1/1)

2022: 4/5, Aappilattoq, Sydgrønland, 2K+, Tittus Titussen (Foto).

Første fund i Grønland. Taget i betragtning, at der t.o.m. 2022 foreligger ca. 88 fund fra Island, var et grønlandsk fund til en vis grad ventet (Yann Kolbeinsson pr. mail). (Syd-, Vest- & Sydøsteuropa)

Træsvaler *Tachycineta bicolor* (3/3, 4/4, 0)

2019: 30/7, Danas Banke, 60 km sydvest for Ugarsiorfik, Vestgrønland, 1K/hun, *Frank Riget (Foto).

Ottende fund i Grønland, hvor de tidligere er: 13/7 1864 i Qeqertarsuaq, Vestgrønland (Boertmann 1994), april (dato ukendt) 1941 i Sisimiut, Vestgrønland (Boertmann 1994), 28/5 1948 i Qassarsuk, Vestgrønland (Boertmann 1994), sidst i maj (dato ukendt) 1958 i Itinnera, Nuuk, Vestgrønland (Boertmann 1994), 26/6 1970 på Danas Banke ud for Paamiut, Vestgrønland (Boertmann 1994), sidst i juni (dato ukendt) 1977 ud for Sisimiut, Vestgrønland (Boertmann 1994) og ét fund, der ikke indgår i opsummeringen, da det omhandler et udstoppet eksemplar i Aasiaat, Vestgrønland uden dato (Boertmann 1994). Fundet i 2019 blev set ombord på et fiskeriundersøgelsesskib på Danas Banke på position: 62°46'N, 51°52'W. (Alaska, Canada & nordlige USA; overvintrer USA, Mexico, Mellemamerika & Cuba)



Sortstrubet drossel, Rindum, Ringkøbing, 14. december 2022. Foto: Finn Bro.

Elle-empidonax *Empidonax alnorum* (0, 1/1, 0)

2019: 6-13/10, Asiarpak, Nuuk, Vestgrønland, *Lars Witting (Foto & DNA).

Første fund i Grønland. Den 13/10 var der stort snefald i området, og dagen efter blev en vinge fra fuglen fundet og indsamlet (formentlig efter at have været fanget af en kat). En DNA-analyse blev sidenhen foretaget, og denne bekræftede bestemmelsen (Witting & Kauppinen 2023). (Nordøstlige USA & Canada til centrale Alaska; overvintrer nordvestlige Sydamerika)

Østlig kongetyran *Tyrannus tyrannus* (1/1, 5/5, 0)

2016: 19/7, Akunnaq, nær Aasiaat, Vestgrønland, 2K+, *Jens Peter Olsen (Foto).

Sjette fund i Grønland, hvor de tidligere er: tidlig september (dato ukendt) 1900 i Arsuk, Paamiut, Vestgrønland (Boertmann 1994), 18/7 1952 i Maniitsoq, Vestgrønland (Boertmann 1994), 23/6 1961 i Nuuk, Vestgrønland (Boertmann 1994), 5-6/6 1990 i Paaimut, Vestgrønland (Boertmann 1994) og 12/7 2006 i Paamiut, Vestgrønland (SU-rapport 2006). (Nordamerika; overvintrer Sydamerika)

Sangdrossel *Turdus philomelos* (0, 2/2, 0)

2011: 20-21/9, Grønlandshavet ud for Germania Land, Nordøstgrønland, *Bruce Mactavish (Foto).

Andet fund i Grønland, hvor det første blev gjort i forbindelse med at et mumificeret individ blev fundet i juni 1982 ved Dahls Skær på Clavering Ø i Nordøstgrønland (Boertmann 1994). (Europa & vestlige Asien; overvintrer Vest- og Sydeuropa, Nordafrika & Sydvestasien)

Vandredrossel *Turdus migratorius* (6/6, 0, 1/1)

2022: 29-30/10, Kimmernat, Nuuk, Vestgrønland, han, *Johannes Kyed, Martin Kviesgaard m.fl. (Foto).

Syvende grønlandske fund i Grønland og første fund siden 1946 (Boertmann 1994). (Alaska, Canada & nordlige USA; overvintrer USA, Mexico & Cuba)

Hvidkronet spurv *Zonotrichia leucophrys* (4/6, 0, 1/1)

2022: 12/6, Nuuk, Vestgrønland, 2K+ fanget i vindfang og sat fri, Steen Sørensen (Foto).

Første fund i Grønland siden 1894 (Boertmann 1994). En lille flok er ifølge Holbøll (1943) set ved Godthaab i efteråret 1824, hvilket i opsummeringen er regnet som ét fund af tre fugle selvom det præcise antal individer ikke er kendt. (Canada & Alaska; overvintrer USA & Mexico)

Stribet sangspurv *Melospiza lincolni* (1/1, 1/1, 0)

2016: 11/6, Davisstrædet, 200 km sydvest for Qeqertarsuaq, Vestgrønland, 2K+ fundet død på skib, *Svend Erik Garbus (Foto).

Andet fund i Grønland, hvor det første sås 1/9 1901 i Tuapait nær Nanortalik, Vestgrønland (Boertmann 1994). Fuglen i 2016 blev fundet død ombord på forskningsskibet Amundsen på position: 68°29'N, 57°58'W. (Canada & nordlige USA; overvintrer sydlige Nordamerika)

Brunhovedet kostær *Molothrus ater* (0, 0, 1/1)

2022: 11-18/6, Paamiut, Vestgrønland, 2K+, *Erik Fleischer, Nancy Jeremiassen m.fl. (Foto).

Ny art for Grønland. (Canada & USA; overvintrer USA & Mexico)

Gul sanger *Setophaga aestiva* (1/1, 2/2, 1/1)

2022: 26+28/8, Saqqarliit, Nuuk, Vestgrønland, 1K, *Martin Kviesgaard (Foto).

Fjerde grønlandske fund. I forbindelse med at gul sanger (*S. aestiva*) og magrovesanger (*S. petechia*) er blevet splittet og nu regnes som selvstændige arter (Gill et al. 2023), har Sjøældenhedsudvalget genbehandlet de tre tidligere fund fra hhv. 1940 (Boertmann 1994), 1976 (Boertmann 1994) og 2010 (SU-rapport 2010). Alle fund er godkendt som tilhørende nominatformen af gul sanger (*S. a. aestiva*), der yngler fra det centrale til det østlige Canada og det centrale og det østlige USA mod syd, og

regnes som den underart, der forekommer i Grønland. (Alaska, Canada & USA; overvintrer Mellemamerika)

Myrtesanger *Setophaga coronata* (6/6, 0, 1/1)

2022: 23/6, Havet vest for Disko, Vestgrønland, 2K han landede på forskningstrawleren Tarajok, hvor den efterfølgende omkom, *Henrik Lund (Foto).

Det syvende grønlandske fund, hvor de tidligere er gjort 1841, 1847, 1878, 1880, 1931 og 1937 (Boertmann 1994). (Alaska, Canada & nordøstlige USA; overvintrer østlige USA & Mellemamerika)

Endnu ikke færdigbehandlede sager

Records still under consideration

- Dværgcanadagås *Branta hutchinsii*, 2005: 21-22/3, Margrethe Kog (SJ), 3K+ (Foto). – 25/4-12/5, Margrethe Kog (SJ), 3K+ (Foto). – 2006: 11/3, Ribe Holme (RB) (Foto).
- Dværgcanadagås *Branta hutchinsii*, ssp. *minima*, 1996: 31/3-10/4, Østerild Fjord, Vejlerne (NJ) (Foto).
- Ederfugl *Somateria mollissima*, ssp. *borealis*, 2012: 1-3/4, Hanstholm Havn (NJ), 3K+ han (Foto). – 2-29/11, Hanstholm Havn (NJ), 3K+ han (Foto).
- Amerikansk skarveand *Oxyura jamaicensis*, 2022: 23-28/2, Sundet, Faaborg (F), hun (Foto).
- Polarlomvie *Uria lomvia*, 2021: 22/10, Asserbo Strand (S), vdr. trk. – 24/10, Fornæs (ÅH), vdr. trk. – 24/10, Frederikshavn (NJ), vdr. trk. – 24/10, Hassensør, Ebeltoft (ÅH), vdr. trk. (Foto). – 6/11, Kronborg, Helsingør (S), vdr. trk. – 13/11, Grenen, Skagen (NJ), vdr. trk. – 19/11, Udsholt Strand (S), vdr. trk. – 2022: 5/2, Kikhavn, Hundested (S), sdr. trk.
- Slørugle *Tyto alba*, ssp. *alba*, 1997: 2/7-16/6, Hundeslev, Midtals (SJ). – 2018: 4/10, Rågeleje (S), ilanddrevet (Foto & Død). – 2019: 29/4, Ramskov, Holstebro (RK) (Foto). – 2020: 12/10, Skallingen (RB) (Foto).
- Allike *Coloeus monedula*, ssp. *soemmerringii*, 2021-2022: 24/10-16/1, Hundested Havn (S) (Foto).
- Vindrossel *Turdus iliacus*, ssp. *coburni*, 2020: 17/4, Rimmevejmarkerne, Rømø (SJ), 3K+ (Foto).
- Dværgcanadagås *Branta hutchinsii*, ssp. *hutchinsii*, 2022: 12-14/6, Kalvebod Fælled (S) (Foto).
- Hvidøjlet and *Aythya nyroca*, 2022: 17.18/7, Marup Mose, Holbæk (S), 2 (3K+ han og 2K+ hun).
- Blåvinget and x skeand *Spatula discors* x *Spatula clypeata*, 2022: 30/4, Bøtø Enge (LF), 3K+ han (Foto).
- Tornhalesejler *Hirundapus caudacutus*, 2022: 30/5, Himmelev (S). – 31/5, Roskilde (S). – 1/6, Roskilde (S).
- Alpesejler *Tachymarptis melba*, 2022: 18/7, Hampenbjerg, Langbjerg Plantage (RK), rst., derefter trk.
- Gråsejler *Apus pallidus*, 2022: 15/5, Bastemose (B). – 4/11, Lystrup Strand (ÅH).
- Orientsejler *Apus pacificus*, 2022: 30/6, Grønjordssøen, Amager Fælled (S), rst., derefter trk.
- Sibirisk hjejle *Pluvialis fulva*, 2013: 19/7, Frederikskog (SJ), ad. sdr. (Foto).
- Lattermåge *Leucophaeus atricilla*, 2022: 25/7, Margrethe Kog (SJ) (Foto).
- Stormmåge *Larus canus*, ssp. *heinei*, 2006: 18/11, Uterslev Mose (S), 1K (Foto).
- Polarlomvie *Uria lomvia*, 2021: 28/12, Fornæs (ÅH), vdr. trk.
- Lille stormsvale *Hydrobates pelagicus*, 2019: 17/9, Børstrup Hage, Gilleleje (S), trk.
- Atlantisk skråpe / scopolis skråpe *Calonectris borealis* / *Calonectris diomedea*, 1998: 26/12, Gilleleje Havn (S), trk.
- Brun sule *Sula leucogaster*, 2022: 21/9, Flyvesandet (F), trk.
- Dværgørn *Hieraaetus pennatus*, fund, som efter genbehandling ikke længere er godkendt: 1990: 15/10, Stignæs (S), lys fase trk.fors. – 21/10, Stignæs (S), lys fase trk.fors.
- Ørnevåge *Buteo rufinus*, 2016: 2/6, Skagen (NJ) (Foto). – 3/6, Skagen (NJ) (Foto).
- Musvåge *Buteo buteo*, ssp. *vulpinus*, 1972: 1-10/6, Skagen (NJ) (Foto). Fundet er blevet genbehandlet og er ikke længere er godkendt.
- Stor hornugle *Bubo bubo*, 2022: 2/7-9/3, Fænø (F), syng.
- Slagfalk *Falco cherrug*, 2022: 7/5, Hundsemyre (B), ad.
- Broget krage *Corvus albus*, 1995: 28-29/3, Hammeren (B).
- Brun løvsanger *Phylloscopus fuscatus*, 2022: 20/11, Blåvands Huk (RB) (Lyd).
- Gærdesanger *Curruca curruca*, ssp. *blythi* / *halimodendri*, 2022: 16-18/10, Blåvand (RB), 1K (Foto).
- Hvidhalset fluesnapper *Ficedula albicollis*, 2022: 6/9, Hanstholm (NJ), 1K han ringm. (Foto).
- Sibirisk bynkefugl *Saxicola maurus*, 2022: 5/6, Korsbage (S) (Foto).
- Sibirisk jernspurv *Prunella montanella*, 2022: 4/5, Slipshavn Enge (F).
- Gul vipstjert *Motacilla flava* ssp. *feldegg*, 2022: 10/5, Tontoft Nakke (SJ), han (Foto). – 20/6, Nordby, Skagen (NJ), han. (Foto).
- Tajgapiber *Anthus hodgsoni*, 2022: 30/4, Blåvands Huk (RB), trk.



Prærietran, Tranekær, Langeland, 31. marts 2022.
Foto: Claus Dalskov.

English summary: Rare birds in Denmark and Greenland in 2022

In 2022, the Danish Rarities Committee processed 369 Danish records (including three records on behalf of the regional reports) of which about 91 % were accepted. Seventeen records from Greenland were processed and all records were accepted. The main section of the report, Accepted records, includes records of species on the Danish list accepted in category A and category B in accordance with the AERC guidelines as well as species considered for the regional reports. Records of species accepted in category C, D and E are treated after the main section, followed by sections with records from Greenland, records still under consideration, and records not accepted. For each record, the following details are included: (1) year and date, (2) location (see map for regions), (3) number of individuals, if more than one, (4) other details, if known: sdr. = summer plumage, vdr. = winter plumage, odr. = transitional plumage, K = calendar year, ringm. = ringed, and (5) name of observer(s), with finders marked by asterisk(s). Documentation by photo (Foto), video (Video), sound recording (Lyd), telemetry tracking (GPS), DNA analysis (DNA) or collected corpse (Død) is indicated, if applicable. The numbers in brackets after the species name refer to the total number of records and individuals (separated by a slash) in Denmark (1) before 1950, (2) during the period from 1950 to 2021, and (3) in 2022, respectively. Five new species recorded in 2022 were added to the Danish list: White-headed Duck (*Oxyra leucocephala*), Wilson's Storm Petrel (*Oceanites oceanicus*), Scopoli's Shearwater (*Calonectis diomedea*), Moltoni's Warbler (*Curruca subalpina*) and American Yellow Warbler (*Setophaga aestiva*). Furthermore, Ross's Goose (*Anser rossii*) was accepted in category A based on a single bird seen at several sites in 2021 and 2022. All previous records of this species have been accepted in category E. Tibetan Sand Plover (*Charadrius atrifrons*) is split from Lesser Sand Plover (*C. mongolus*) (re-named Siberian Sand Plover) based on phenotypic differences and phylogenetic analysis which demonstrates parphyly of these two taxa relative to Greater Sand Plover (*C. leschenaultia*). As a result, Tibetan Sand Plover has been added to the Danish list in category A based on a record from 2004. There is also one record of Siberian Sand Plover from 1998. Based on a reassessment of Black-headed Bunting (*Emberiza melanocephala*) and Red-headed Bunting (*E. bruniceps*) records, a record from 2002 of a Black-headed Bunting has been accepted as a Red-headed Bunting. Furthermore, a record from 2019 of an unidentified Red-headed Bunting / Black-headed Bunting has been accepted as a Red-headed Bunting. These two records represent the first two records of Red-headed Bunting in category A. All previous records of Red-headed Bunting have been accepted in category E. Other notable sightings included the fourth record of Saker (*Falco cherrug*) and Western Black-eared Wheatear (*Oenanthe hispanica*), respectively, the fifth record of Egyptian Vulture (*Neophron percnopterus*). Records of Ferruginous Duck (*Aythya nyroca*), Black Scoter (*Melanitta americana*) and Dusky Warbler (*Phylloscopus fuscatus*) done after 2022 will not be considered by the Danish Rarity Committee.

Bedes citeret

Please quote

Olsen, K., M.B. Hansen, S. Klein, A.B. Kristensen, R.S. Neergaard, S.H. Nielsen, O. Nilsson & U.E. Møller 2023: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2022. – Fugleåret 2022: 119-156 (in Danish with English summary).


Referencer

References

- AERC 2023: Guidelines for Rarities Committees: <http://www.aerc.eu/guidelines.html>
- Aigle de Bonelli 2022: Plan National d'Action pour l'Aigle de Bonelli (*Aquila bonelli*): <http://www.aigledebonelli.fr/>
- Artsobservasjoner 2023: www.artsobservasjoner.no
- Artportalen 2023: www.artportalen.se
- Batty, C. & McInerny, C. J. 2023: The Ross's Goose in Britain. – *British Birds* 116: 12-25.
- Burnham, K.K., J.L. Burnham, J.A. Johnson, B. W. Konkel, J. Stephens & H. Badgett 2020: First record of horned puffin in the North Atlantic and tufted puffin in High Arctic Greenland. – *Polar Research* 39: 4458: <https://doi.org/10.33265/polar.v39.4458>
- Birdguides 2019: The rise and fall of Ring-billed Gull: <https://www.birdguides.com/articles/britain-ireland/the-rise-and-fall-of-ring-billed-gull/?fbclid=IwAR13ov-zax236l1FY8TfNAietO8bWo8NnG7iZhTGzFtjVOKNlp-t1JgMYCfTU>
- BirdLife Sverige 2023: Sverige Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige. Raritetskommittén (Rk). Raritetskatalogen: <http://birdlife.se/rk/raritetskatalogen>
- Boertmann, D. 1994: An annotated checklist to the birds of Greenland. – *Meddr. Greenland, Bioscience* 38: 64 s.
- CDNA 2023: Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna: <https://www.dutchavifauna.nl/>
- Christensen, J.S. & P.A.F. Rasmussen 2015: Revideret status for sjældne fugle i Danmark før 1965. – *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 109: 41-112.
- Christensen, J.S., T.H. Hansen, P.A.F. Rasmussen, T. Nyegaard, D.P. Eskildsen, P. Clausen, R.D. Nielsen & T. Bregnballe 2022: Systematisk oversigt over Danmarks fugle 1800-2019. – *Dansk Ornitologisk Forening*.
- Christopher König pr. mail: Deutsche Avifaunistische Kommission (DAK).
- Collinson, J. M., T. Senfeld, T.J. Shannon & S. Waite 2022: Molecular Birding: the new 'New Approach' to identification. – *British Birds* 115: 703-714.
- Cramp, S., C.M. Perrins & D.J. Brooks (red.) 1994: Handbook of the Birds of Europe, the Middle East, and North Africa: The Birds of the Western Palearctic. Vol. IX. Buntings and New World Warblers. – Oxford University Press, Oxford.
- David Boertmann pr. mail: Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
- de Jong, A. 2022: Influx van Slangenarenden 2022: <https://www.sovon.nl/actueel/nieuwsberichten/influx-van-slangenarenden>
- Dutch Bird Alerts 2023: <https://www.dutchbirdalerts.nl/search?species=488&page=1&size=30>
- eBird 2023. eBird: An online database of bird distribution and abundance. – eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. www.ebird.org.

- Forsman, D. 2016: Flight Identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East. – Bloomsbury. London.
- Gill, F., D. Donsker & P. Rasmussen (eds) 2023: IOC World Bird List (v 13.2): <http://www.worldbirdnames.org>.
- Hans Schekkerman pr. mail: Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA).
- Hellström, M. & M. Waern 2021: Vitgumpad buskskvätta och amurbuskskvätta – Raritetskommitténs granskning av de svenska fynden. – Vår Fågelvärld 2: 2021.
- Holbøll, C. 1843: Ornitologiske bidrag til den grønlandske fauna. – Naturhistorisk Tidsskrift 4: 361-457.
- IUCN/SSC 2013. Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations. Version 1.0. Gland, Switzerland: IUCN Species Survival Commission. <https://www.iucn.org/content/guidelines-reintroductions-and-other-conservation-translocations>.
- J. Martin Collinson pr. mail: School of Medicine, Medical Sciences and Nutrition, University of Aberdeen, Institute of Medical Sciences, Foresterhill, Aberdeen, UK.
- Livezey, B.C. 2010: Phylogenetics of modern shorebirds (Charadriiformes) based on phenotypic evidence: Analysis and discussion. – Zoological Journal of the Linnean Society 160: 567-618.
- Louise Bacon pr. mail: British Birds Rarities Committee (BBRC).
- McInerney, C.J., P.A. Crochet & S. Dudley 2022: Assessing vagrants from translocated populations and defining self-sustaining populations of non-native, naturalized and translocated avian species. – Ibis 164: 924-928.
- Netfugl 2023a: Netfugl.dk: <https://dklist.netfugl.dk/dklist.php>.
- Netfugl 2023b: Netfugl.dk. Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget, 18. april 2023: <https://netfugl.dk/artikler/2888/nyhedsbrev-fra-sjaeldenhedsudvalget>.
- Nightingale, B. & H. Hussey 2022: British Birds, May 2022. – British Birds 115(5): 299-300.
- Niklas Andersson pr. mail: Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige. Raritetskommittén (RK).
- Nordjyske 2023: Afrikansk dyr forsvundet fra Aalborg Zoo: <https://nordjyske.dk/nyheder/krimi/afrikansk-dyr-forsvundet-fra-aalborg-zoo/2958568>.
- Norgeslisten 2023: <https://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php>.
- Olsen, K. 2023a: Hvidhovedet skarveand (*Oxyura leucocephala*) i Selsø Sø – første fund i Danmark og ny art på den danske fugleliste. – Fugleåret 2022: 157-159.
- Olsen, K. 2023b: Første fund af scopolis skråpe (*Calonectris diomedea*) i Skandinavien. – Fugleåret 2022: 164-168.
- Olsen, K. 2023c: Makisanger (*Curruca subalpina*) ved Blåvands Huk – første fund i Danmark og ny art på den danske fugleliste. – Fugleåret 2022: 169-172.
- Olsen, K. 2023d: Gul sanger (*Setophaga aestiva*) i Agger – første fund i Danmark og ny art på den danske fugleliste. – Fugleåret 2022: 173-175.
- Olsen, T. 2023e. Sjældne fugler i Norge i 2022. – Rapport fra Norsk sjældenhetskomité for fugl (NSKF). – Fugleåret 11: 4-67. <https://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/rapporter.php>.
- Ornitho 2023: Pied Crow (*Corvus albus*): https://www.ornitho.de/index.php?m_id=54&id=66003308.
- Ortvad, T.E. 2023: Wilsons stormsvale (*Oceanites oceanicus*) - første fund i Danmarks eksklusive økonomiske zone i Nordsøen og ny art på den danske fugleliste – Fugleåret 2022: 160-163.
- Ortvad, T.E., J.H. Christensen, T.H. Hansen, A.B. Kristensen, K. Olsen, K. Pedersen, P.A.F. Rasmussen & M. Schwalbe 2015: Revision af den danske fugleliste pr. 2013. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: 24-35.
- Reeber, S. 2015: Wildfowl of Europe, Asia and North America, Helm, London.
- Roni Väisänen pr. mail: Finnish National Rarities Committee. BirdLife Suomen rareiteettikomitea (BSR).
- Reyt, S. & D. Jean-Luc 2023: Scopoli's Shearwater in French Atlantic waters in June 2021 and status in western Atlantic European region. – Dutch Birding 45: 179-182.
- Shirihi, H. & L. Svensson 2018: Handbook of Western Palearctic Birds, Vol. 1+2. – Christopher Helm.
- Sovon 2023a: Whiskered Tern: <https://stats.sovon.nl/stats/soort/6260>.
- Sovon 2023b: Middle Spotted Woodpecker: <https://stats.sovon.nl/stats/soort/8830>.
- Svensson, L. 1992: Identification guide to European passerines. 4. udg. – Stockholm.
- Tadeusz Stawarczyk pr. mail: Polska Komisja Faunistyczna.
- Tarsiger 2023: www.tarsiger.com.
- Tor A. Olsen pr. mail: Norsk Sjældenhetskomité for fugl (NSKF).
- TV2 2022: Havørn fanget med frottelagen: <https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2022-04-28-havoern-fanget-med-frottelagen>.
- Viles, S 2018: Pied Crow: wild or escape? <https://www.birdguides.com/articles/rare-birds/pied-crow-wild-or-escape/>.
- Vinicombe, K.E. 2007: The status of red-headed Bunting in Britain. – British Birds 100: 540-551.
- Waarneming 2023: Dværgsnegås: https://waarneming.nl/species/317/observations/?date_after=2012-12-01&date_before=2013-02-02&page=4.
- Wei, C.T., M. Schweizer, P.A. Tomkovich, V. Yu, M. Romanov, J. Jonathan Martinez, X. Lin, N. Halimubieke, P.J. Que, T. Mu, Q. Huang, Z.W. Zhang, T. Székely & Y. Liu 2022: Genome-wide data reveals paraphyly in the sand plover complex (*Charadrius mongolus/leschenaultii*). – Ornithology 139: 2.
- Witting, L. & S. Kauppinen 2023: Alder Flycatcher (*Empidonax alnorum*) i Nuuk – Første fund i Grønland bekræftet via DNA: <https://netfugl.dk/artikler/2849/alder-flycatcher-empidonax-alnorum-i-nuuk-foerste-fund-i-groenland-bekraeftet-via-dna>.
- Wright, M. 2011: Tufted Puffin in Kent: new to Britain. – British Birds 104: 261-265.
- Yann Kolbeinsson pr. mail: Icelandic Rarities Committee.
- SU-rapport 1965-1969: Dyck, J., J. Ramsøe Jacobsen, E. Kramshøj & J. Rabøl 1970: Rapport fra sjældenhedsudvalget med oversigt over godkendte forekomster 1965-1969. – Dansk Or. Foren. Tidsskr. 64: 126-151.

- SU-rapport 1970: Ramsøe Jacobsen, J., B.P. Nielsen & J. Rabøl 1971: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1970. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 65: 133-139.
- SU-rapport 1971: Bruun, J.B., J. Ramsøe Jacobsen, E. Kramshøj & B.P. Nielsen 1972: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1971. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 66: 123-131.
- SU-rapport 1972: Andersen, T., J.B. Bruun & B.P. Nielsen 1973: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1972. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 67: 139-144.
- SU-rapport 1973: Hansen, E., P.S. Hansen & B.P. Nielsen 1974: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1973. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 68: 138-144.
- SU-rapport 1974: Hansen, E. & B.P. Nielsen 1975: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1974. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 69: 135-139.
- SU-rapport 1975: Hansen, P.S. 1976: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1975. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 70: 131-138.
- SU-rapport 1976: Hansen, P.S. 1977: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1976. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 71: 139-144.
- SU-rapport 1977-1978: Pedersen, B.B. 1980: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1977 og 1978. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 74: 127-140.
- SU-rapport 1979-1980: Pedersen, B.B. 1982: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1979 og 1980. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 76: 111-122.
- SU-rapport 1981: Pedersen, B.B. 1984: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1981. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 78: 81-92.
- SU-rapport 1982-1984: Boertmann, D., K.M. Olsen & B.B. Pedersen 1986: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i årene 1982, 1983 og 1984. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 80: 35-57.
- SU-rapport 1985: Olsen, K.M. 1987: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1985. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 81: 109-120.
- SU-rapport 1986-1987: Olsen, K.M. 1988: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1986 og 1987. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: 81-100.
- SU-rapport 1988: Olsen, K.M. 1989: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1988. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: 131-149.
- SU-rapport 1989: Olsen, K.M. 1991: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1989. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 85: 20-34.
- SU-rapport 1990: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1992: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1990. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: 107-122.
- SU-rapport 1991: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1993: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1991. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 87: 231-241.
- SU-rapport 1992: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1994: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1992. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 88: 99-110.
- SU-rapport 1993: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1995: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1993. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 89: 101-110.
- SU-rapport 1994: Rasmussen, P.A.F. 1996: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1994. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 90: 141-152.



Sortbrynet albatros, Nordsøen 60 km vestnordvest for Hanstholm, 2. april 2022. Foto: Jonathan Vig.

- SU-rapport 1995-1996: Rasmussen, P.A.F. 1997: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og 1996. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 133-150.
- SU-rapport 1997: Rasmussen, P.A.F. 1998: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1997. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: 253-267.
- SU-rapport 1998: Rasmussen, P.A.F. 1999: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1998. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: 127-140.
- SU-rapport 1999: Thorup, K. & H.H. Nielsen 2000: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: 157-170.
- SU-rapport 2000: Nielsen, H.H. & K. Thorup 2001: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: 153-166.
- SU-rapport 2001: Ortved, T.E., K. Pedersen & K. Thorup 2002: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2001. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 96: 147-160.
- SU-rapport 2002: Klein, S., K. Pedersen & K. Thorup 2003: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2002. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 97: 289-302.
- SU-rapport 2003: Amstrup, O., A.S. Frich, K. Pedersen & K. Thorup 2004: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2003. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: 174-188.
- SU-rapport 2004: Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, K. Pedersen, & K. Thorup 2005: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 99: 169-181.
- SU-rapport 2005: Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, H.H. Nielsen, K. Pedersen & K. Thorup 2006: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 100: 359-371.
- SU-rapport 2006: Kristensen, A.B., O. Amstrup & T.E. Ortved 2007: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2006. – Fugleåret 2006: 99-113.
- SU-rapport 2007: Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortved & M. Schwalbe 2008: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2007. – Fugleåret 2007: 117-135.

- SU-rapport 2008: Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvad & M. Schwalbe 2009: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2008. – Fugleåret 2008: 123-143.
- SU-rapport 2009: Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvad & M. Schwalbe 2010: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2009. – Fugleåret 2009: 131-151.
- SU-rapport 2010: Neergaard, R.S., A.S. Frich, A.B. Kristensen, K. Pedersen, T.E. Ortvad, M. Schwalbe & R. Strack 2011: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2010. – Fugleåret 2010: 125-144.
- SU-rapport 2011: Neergaard, R.S., A.S. Frich, A.B. Kristensen, K. Pedersen, T.E. Ortvad, M. Schwalbe & R. Strack 2012: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2011. – Fugleåret 2011: 97-122.
- SU-rapport 2012: Neergaard, R.S. 2013: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2012. – Fugleåret 2012: 103-130.
- SU-rapport 2013: Ortvad, T.E., S.S. Christiansen, S. Klein, A.B. Kristensen, K. Pedersen & R. Strack 2014: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2013. – Fugleåret 2013: 114-139.
- SU-rapport 2014: Ortvad, T.E., S.S. Christiansen, O.Z. Göller, A.B. Kristensen, R.S. Neergaard, K. Olsen, K. Pedersen & R. Strack 2015: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2014. – Fugleåret 2014: 111-137.
- SU-rapport 2015: Olsen, K., S.S. Christiansen, M.B. Hansen, O.Z. Göller, R.S. Neergaard, R.D. Nielsen, K. Pedersen & R. Strack 2016: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2015. – Fugleåret 2015: 111-135.
- SU-rapport 2016: Olsen, K., S.S. Christiansen, O.Z. Göller, M.B. Hansen, S. Kauppinen, R.S. Neergaard, H.H. Nielsen, R.D. Nielsen & K. Pedersen 2017: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2016. – Fugleåret 2016: 119-148.
- SU-rapport 2017: Olsen, K., O.Z. Göller, M.B. Hansen, S. Kauppinen, A.B. Kristensen, H.H. Nielsen, R.D. Nielsen & K. Pedersen 2018: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2017. – Fugleåret 2017: 119-148.
- SU-rapport 2018: Olsen, K., O.Z. Göller, M.B. Hansen, S. Kauppinen, A.B. Kristensen, H.H. Nielsen, R.D. Nielsen & K. Pedersen 2019: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2018. – Fugleåret 2018: 140-167.
- SU-rapport 2019: Olsen, K., M.B. Hansen, S. Kauppinen, A.B. Kristensen, A.O.W. Nielsen, H.H. Nielsen, R.D. Nielsen & T.E. Ortvad 2020: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2019. – Fugleåret 2019: 138-176.
- SU-rapport 2020: Olsen, K., S. Kauppinen, A.B. Kristensen, A.O.W. Nielsen, H.H. Nielsen, O. Nilsson & T.E. Ortvad 2021: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2020. – Fugleåret 2020: 117-161.
- SU-rapport 2021: Olsen, K., H. Böhmer, M.B. Hansen, A.B. Kristensen, R.S. Neergaard, A.O.W. Nielsen, S.H. Nielsen, O. Nilsson & T.E. Ortvad 2022: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2021. – Fugleåret 2021: 107-147.

Rettelser og tilføjelser til tidligere publicerede fund.

Corrections and additions to previously published records

- SU-rapport 1965-69: s. 150: Brunhovedet værbling *Emberiza bruniceps*, 1966: 4-7/6, Henne Strand (RB), han syng., *Finn Birkholm-Clausen, Ole Hansen. Lokalitet skal være: 4-7/6, Stausø (RB), han syng., *Finn Birkholm-Clausen, Ole Hansen.
- SU-rapport 2004: s. 175: Tibetansk præstekrave *Charadrius atrifrons*, 2004: Bemærk, at der i rapporten står, at fundene i 2004 omhandlede en fugl med karakterer svarende til *C. m. atrifrons*. Dette var en fejl, hvor der mentes, at fuglen tilhørte *atrifrons*-gruppen, der består af de tre underarter ssp. *atrifrons*, ssp. *pamirensis* og ssp. *schaeferi*.
- SU-rapport 2004: s. 175: Sibirisk præstekrave *Charadrius mongolus*, 1988: Bemærk, at der i rapporten står, at fundet i 1988 omhandlede en fugl med karakterer svarende til *C. m. mongolus*. Dette var en fejl, hvor der mentes, at fuglen tilhørte *mongolus*-gruppen, der består af de to underarter ssp. *mongolus* og ssp. *stegmanni*.
- SU-rapport 2012: s. 127: *Prærietrane Antigone canadensis*, 2007: 25/9-6/10, Nuuk, ad., Lars Witting (Foto). – 2012: 8-17/6, Vandsøen, Thule, ad., *Mogens Werth (Foto). Anden og tredje grønlandske forekomst af denne art. Første fund var en 2K-fugl 29. juli-1. august 1985 ved Quaanaag/Thule (Boertmann 1994). Den korrekte tekst skal være: 2007: 25/9-6/10, Nuuk, ad., Lars Witting (Foto). – 2012: 8-17/6, Vandsøen, Quaanaag/Thule, ad., *Mogens Werth (Foto). Tredje og fjerde grønlandske forekomst af denne art. De to første fund var en 2K-fugl 29. juli-1. august 1985 ved Quaanaag/Thule (Boertmann 1994) og én 6. august 1990 ved Quaanaag/Thule (SU-rapport 2000). Desuden er opsummeringen angivet som (0, 2/2, 1/1). Den korrekte opsummering skal være (0, 3/3, 1/1).
- SU-rapport 2015: s. 132: Hellig ibis *Threskiornis aethiopicus*, 2015: 2-21/12, Humle (F), 1K, Tim Hesselballe Hansen m.fl. (Foto). Forekomstperiode skal være: 2-24/12, Humle (F), 1K, Tim Hesselballe Hansen m.fl. (Foto).
- SU-rapport 2021: s. 138: Dværgsnegås *Anser rossii*, 2020: 18-20/7, Klydesøen, Kalvebod Fælled (S), 2 3K+ hvid form, Lars Paaby, Finn Olofsen m.fl. (Foto). Forekomstperiode og lokalitet skal være: 18-23/7, Klydesøen og Villahøj Sø, Kalvebod Fælled (S), 2 3K+ hvid form, Lars Paaby, Finn Olofsen m.fl. (Foto).