


Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000

HENRIK HAANING NIELSEN og KASPER THORUP

Rapport nr 31 fra Sjældenhedsudvalget



(With a summary in English: *Rare birds in Denmark and Greenland in 2000*)

Indledning

Denne rapport omhandler 198 færdigbehandlede sager fra Danmark, heraf 185 fra 2000. Heri indgår 9 sager, som SU har behandlet på opfordring fra lokalrapporternes redaktioner vedrørende arter, som er udgået af SU-listen, men som skønnes at være sjældne lokalt. Disse fund publiceres (siden Rasmussen 1997) i den landsdækkende årsrapport i DOFT, men er tillige nævnt sidst i denne rapport. 162 (81%) af de behandlede sager blev godkendt, hvilket kan sammenlignes med en godkendelsesprocent på mellem 75 og 80 de seneste otte år. For Grønland færdigbehandles 2 sager, begge fra 2000, og begge godkendes.

Den systematiske gennemgang og den regionale inddeling er som i den foregående rapport (Thorup & Nielsen 2000). Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for henholdsvis første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen mindst er i sit andet (tredje) kalenderår, men kan være ældre. Ad. = adult (gammel, udfarvet fugl), imm. = immatur (dragter mellem juvenil og adult), juv. = juvenil (første egentlige fjerdragt), pull. = pullus (dununge), sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt, trk.fors. = trækforsøgende, trk. = trækkende, syng. = syngende og ringm. = ringmærket.

Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal anerkendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før 1950; 2) antal anerkendte og SU-godkendte fund og individer fra og med 1950 til og med 1999; 3) antal godkendte fund og individer i 2000. Denne opdeling er i overensstemmelse med den standard, der anbefales af AERC (Association of European Rarities Committees). For Topskarv er denne opdeling dog ikke gennemført, og her fremgår opdelingen af parentes. Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid er identisk med antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på én dag regnes som 5 fund. I lighed med europæisk standard regnes ynglefund (incl. unger) som ét



NATURBUTIKKEN

DOF-salg

har sponsoreret
farvetryk
i rapporten

fund, mens samme tilbagevendende individ over flere år regnes for flere fund.

Efter observatørnavnet er det oplyst, om de enkelte fund er dokumenteret med foto (Foto), videofilm (Video), lydoptagelse (Bånd) eller dødfunden fugl (Død). Desuden er finderen ved hvert fund markeret med en asterisk (*) foran observatørnavnet. Som finder(e) regnes den (de), der har været til stede, da fuglen blev opdaget/bestemt. Imidlertid fremgår det ikke altid tydeligt af beskrivelserne, hvem finderen er, og der kan derfor mangle enkelte markeringer. I beskrivelser til SU bør det angives, hvem finderen er.

I bemærkningerne til de enkelte arter og underarter er den normale yngle- og vinterudbredelse (eller området hvorfra danske forekomster vurderes at komme fra) tilføjet i parentes.

Bagest i rapporten findes en liste over forkastede fund.

Godkendte forekomster


Fra 2000 godkendtes Bairdsryle og Aztekerterne som nye arter for landet. Andre bemærkelsesværdige forekomster i 2000 var landets andet fund af Ørkenpræstekrave, tredje fund af Steppevibe (det første siden 1930), tredje til femte fund af Sumpvibe, tredje fund af Middelhavsstenpikker, samt fjerde og femte fund af Klippesvale. Desuden godkendtes fra 1993 Gråsejler og fra 1997 Iberisk Gransanger (to fund) som nye arter for landet, og fra 1990 godkendtes Prærietrane som ny art for Grønland.

Sjældne fugle i 2000

Sneugleinvasjonen, der startede i december 1999, fortsatte gennem vinteren og frem til maj. Flest fund var der på de vest- og nordjyske lokaliteter, bl.a. 6 ved Skagen, 3 i Hansted-reservatet og 2 ved Vest Stadil Fjord. Derudover gav vinteren/foråret bl.a. 2 Rosenmåger.

I forbindelse med varmt vejr og sydøstenvinde sås 9 af årets 11 Steppehøge i perioden ultimo april – medio maj, ligesom der primo maj blev der set 2 Klippesvaler på to dage! Maj og juni gav desuden hele 4 Korttåede Lærker, 4 Hvidskæggede Sangere, 4 Små Skrigørne, 2 Store Skrigørne samt 1 Dværgerne.

Perioden medio juli – primo august var god for sjældne vadefugle. Således sås 3 Sibiriske Tundrahejler, 3 Hvidryggede Ryler, 4 Stribede Ryler, 6 Damklirer (bl.a. 3 IK i flok) samt 1 Terekklire i denne periode. Ellers forløb efteråret ganske stille frem til oktober, hvor småfuglelus bl.a. gav



Regionsinddelingen anvendt i denne artikel.
Geographical regions of Denmark used in this report.

Steppeornskade, 2 Sibiriske Sortstrubede Bynkefugle, 2 Humes Sangere og 2 Brune Løvsangere. Desuden var der en invasionagtig optræden af Sortbugede Knortegæs, først 2 fugle medio september og siden 6 i perioden medio november – medio december.

En 1K Hvidskægget Terne sås fra ultimo oktober i Vejlerne, hvor den opholdt sig helt frem til juletid. Det meget milde vejr i december gav desuden Danmarks første vinterforekomster af Ørkenstenpikker og Kejsersørn.

Henlagte sager

Til og med denne rapport henligger der 9 sager, som af forskellige årsager endnu ikke er færdigbehandlet. En liste over disse sager findes bagest i rapporten.

SU-listen

Forekomsten af Sydlig Blåhals *Luscinia svecica cyaneacula* og Amerikansk Krikand *Anas crecca carolinensis* betragtes som veldokumenteret i landet (se Thorup & Nielsen 2000), og formerne er udgået af SU-listen fra og med 2000.

Listen over arter, som skal godkendes af SU, er senest publiceret i Rasmussen (1997), med ændringer i Rasmussen (1998, 1999) og Thorup & Nielsen (2000). Den opdaterede SU-liste, en generel vejledning i indsendelse af sager, samt DOFs officielle danske fugleliste kan findes på http://www.dof.dk/01_organisation/Udvalg/SU.html.

SU behandler fund af arter fra alle kategorier (se nedenfor), og for at få så fyldestgørende et billede

som muligt af de forskellige arters optræden herhjemme, er det i princippet vigtigt, at alt bliver rapporteret. Der vil dog forekomme tilfælde, hvor en SU-godkendelse må skønnes at være unødvendig, f.eks. fund af almindelige burfugle (Undulat, Mandarinand m.fl.). Er man i tvivl kan man kontakte udvalget.

Kategorier

I henhold til AERC standard inddeles de i Danmark trufne fuglearter i 5 kategorier, defineret som følger:

A Arter der betragtes som spontant optrædende og er truffet mindst én gang siden 1. januar 1950; f.eks. Vibe og Amerikansk Pibeand. Som spontant optrædende regnes ligeledes skibs- eller på anden måde assisterede forekomster, når fuglen ikke har været fodret eller tilbageholdt.

B Arter der betragtes som spontant optrædende, men kun er truffet før 1950; f.eks. Kravetrappe og Bartramsklire.

C Udsatte og undslupne arter, som har etableret en fritlevende og selvsupplerende bestand enten herhjemme eller i andre lande; f.eks. Nilgås og Fasan.

D Arter som vil være placeret i A eller B, hvis ikke der var rimelig tvivl om, hvorvidt de nogensinde har optrådt spontant i landet; f.eks. Flamingo og Almindelig Pelikan.

E Arter der betragtes som undsluppet fra fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i landet eller hvis fritlevende bestande – hvis eksisterende – formentlig ikke er selvsupplerende; f.eks. Rødrygget Pelikan, Dværsgnegås, Steppeørn med stropper og ynglefund af Mandarinand.

Den officielle danske liste udgøres af arterne i kategori A, B og C. Fund af arter i kategori D og E behandles også af SU, men publiceres særskilt bagest i SU-rapporten.

Sjældenhedsudvalgets medlemmer

SU bestod frem til udgangen af 2000 af følgende medlemmer: Ole Amstrup, Jan Hjort Christensen, Sebastian Klein, Henrik Haaning Nielsen, Kent Olsen, Klaus Malling Olsen, Troels Eske Ortvad, Knud Pedersen (sekretær), Palle A. F. Rasmussen og Kasper Thorup.

Sjældenhedsudvalgets adresse: Sjældenhedsudvalget, DOF, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V. E-mail: su@dof.dk.

For kritik og kommentarer til denne rapport takkes alle nuværende medlemmer af Sjældenhedsudvalget. Endvidere tak til Poul Hansen og Andreas Helbig for faglig bistand ved behandlingen af enkelte sager. Alf Tore Mjøs og Tom Lindroos takkes for givtig brevveksling samt orientering om fund af sjældne fugle i Norge og Finland i 2000. Den største tak rettes dog til de mange, der rapporterede deres observationer til SU og dermed skabte grundlaget for denne rapport.

Kategori A: Spontane forekomster

Category A: Species recorded in an apparently wild state

Middelhavskræpe *Puffinus yelkouan mauritanicus* (1/1, 31-32/33-34, 1/1)

2000: 18.8, Langerhuse (RK), trk., *Kristian Kirk Nielsen.

(Vestlige Middelhav; overvintrer Middelhavet og sydlige del af det nordøstlige Atlanterhav)

Topskarv *Phalacrocorax aristotelis*

(-, fra og med 1984: 30/30, 2/2)

2000: 9-10.11, Esbjerg Havn (RB), ad., *Tim Hesselballe Hansen, Michael Schwalbe, Mikkel Lüders. – 12-13.11, Blåvandshuk (RB), 1K ringm., *Jens Hjerrild Hansen, Janus Ethelberg m.fl. (Foto).

Fuglen fra Blåvandshuk blev indfanget tilfældigt i forbindelse med projektorfangst og ringmærkning af vadefugle på stranden ved nattetide. (Britiske Øer og Norge)

Knortegås *Branta bernicla*

Med karakterer svarende til **Sortbuget Knortegås** ssp. *nigricans* (0, 11/11, 9/9):

2000: 27.3-19.5, Sneum Sluse (RB), ad., Sebastian Klein m.fl. – 17.9, Køge Sydstrand (S), 2 ad., *Tim Andersen, *Thorkild A. Jensen m.fl. (Foto). – 18-19.11, Billesborg, Køge (S), ad., *Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl. – 21.11, Sneum Sluse (RB), ad., *Michael Mosebo Jensen. – 26.11, Skovhuse, Præstø (S), ad., *Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl. – 26.11-14.12, Søjord, Fanø (RB), ad., *Kim Fischer, Per Kjær m.fl. – 13-14.12, Søjord, Fanø (RB), ad., *Per Kjær. – 14.12, Søjord, Fanø (RB), ad., *Per Kjær.

Hidtil største forekomst herhjemme. De to fugle ved Køge Sydstrand ankom i hver sin flok Mørkbugede Knortegås, hvorfor de figurerer som 2 fund i opsummeringen. Bemærk at der sås 3 forskellige individer på samme lokalitet på Fanø 14.12! Desuden sås et fjerde individ denne dag, men dens halsring var tydeligt smallere end de andre fugles, den havde en tydeligt brun ryg, og i den hvide flanketegning fandtes en del brune fjer, så



Lille Skrigeørn 3K, Skagen 19.5 2000. Foto: Knud Pedersen. *Lesser Spotted Eagle*.



Stor Skrigeørn imm., Skagen 19.5 2000. Foto: Knud Pedersen. *Spotted Eagle*.



Steppevibe, Søborg Sø juli 2000. Foto: Allan Kjær Villen. *Sociable Lapwing*.



Rosenmåge ad., Skagen Havn 12.2 2000. Foto: Svend Andersen. *Ross's Gull*.

flanken havde et "snavset" udseende sammenlignet med det normale renhvide indtryk. På grund af disse afvigende karakterer er SU af den opfattelse, at en hybrid ikke kan udelukkes.

Også i Sverige optrådte formen invasionsagtigt, idet der perioden 29.10-25.11 noteredes 6 fund af 7 eks. (Cederroth 2001). I Norge er det første fund netop blevet godkendt, en fugl på Svalbard i slutningen af maj 1999 (Alf Tore Mjøs i brev). Denne fugl er kan evt. være identisk med den fugl, der i årene 1998-1999 har opholdt sig på Agerø sammen med hovedparten af Svalbardbestanden af Lysbugede Knortegæs (Rasmussen 1999, Thorup & Nielsen 2000). (Østsibirien og Nordvestamerika; overvintrer ved Stillehavskysten)

Amerikansk Pibeand *Anas americana* (0, 11/11, 6/6)

2000: 10.3 og 17.3, Tipperne (RK), ♂, *Henrik Knudsen. – 14-21.3, Bygholm Vejle (NJ), ♂, *Palle A. F. Rasmussen, Thomas Varto Nielsen m.fl. – 19-21.3, Geddal Enge (RK), ♂, *Stinne Aastrup, *Egon Mogensen m.fl. – 15.8, Ølsemagle Revle (S), ♂ i eclipsedragt, *Thomas Olsen, *Knud

Jønsson, Tim Andersen m.fl. – 17. og 20.11, Vest Stadil Fjord (RK), ♂, *Peter H. Kristensen, Henrik Knudsen. – 10. og 13-14.12, Søjord, Fanø (RB), ♂, *Kim Fischer, Per Kjær m.fl.

Hidtil største forekomst herhjemme. Den tidsmæssige fordeling af de danske fund er februar 1, marts 4, april 8, august 1, november 1 og december 2. Ved bestemmelse af Amerikansk Pibeand skal man være opmærksom på eventuelle hybridkarakterer. Hybrider mellem Pibeand og Amerikansk Pibeand er nu konstateret med sikkerhed herhjemme to gange og kendes også fra bl.a. England, Island, Hong Kong og Japan. Også hybrider mellem Pibeand og Chilensk Pibeand (især kendt fra fangenskab) kan i forbløffende grad ligne Amerikansk Pibeand. Problematikken omkring hybrider er bl.a. behandlet af Carey (1993) og Harrop (1994, 1994b). (Nordamerika).

Blåvinget And *Anas discors* (1/1, 12/13, 1/2)

1982: Ult. september, Grund Fjord (ÅH), 1K+ ♂ skudt, *Karsten Andersen (Foto).

2000: 17-19.4, Fjaltring Strand (RK), 2 ♂ ♂, *Peter H. Kristensen m.fl. (Foto).



Sumpvibe, Harboør Tange juni 2000. Foto: Allan Kjær Villesen. *White-tailed Lapwing*.

Bemærkelsesværdigt med et fund af 2 fugle sammen. Bortset fra yngleparret på Tipperne i 1986 (Olsen 1989) har alle danske fund været af enkeltindivider. (Nordamerika)

Halsbåndstroland *Aythya collaris* (0, 5/5, 1/1)

2000: 13-16.4, Mollerup (ÅH), ♂, *Peter Østergaard, Bjarne Golles m.fl. (Foto).

Første fund siden 1993. Arten optræder besynderligt uregelmæssigt i Danmark. I Sverige foreligger der således 21 fund, og bortset fra 1997 og 1999 har arten optrådt årligt siden 1990 (Cederroth 2001). I Norge er der i alt 22 fund og i Finland 4. (Nordamerika)

Hvidøjjet And *Aythya nyroca* (4/4, 23/26, 0/0)

1962: 8.10, Stadil Fjord (RK), 1K ♂ skudt, via DMU Kalø og Ole Amstrup (Foto).

(Øst- og Sydøsteuropa; overvintrer Middelhavet, Sortehavet og Nordøstafrika)

Slangeørn *Circaetus gallicus*

(Uddød 1882. Herefter 1/1, 24/24, 1/1)

2000: 7.10, Jellerød Have, Kokkedal (S), trk., *Mads Herbøl (Video).

Fundet udgør det 3. oktoberfund herhjemme og er det hidtil seneste. (Syd- og Østeuropa; overvintrer nordligt i tropisk Afrika)

Steppehøg *Circus macrourus*

(14/14, 76/77, 11/11)

2000: 20.4, Harboør Tange (RK), ad. ♂ trk., *André Riis Ebbesen, *Jørgen Munck Pedersen. – 21.4, Skagen (NJ), ad. ♂ trk., *Rasmus Due Nielsen, *Kasper Quist Jensen, *Hans Pindstrup. – 22.4, Bulbjerg (NJ), ad. ♂ trk., *Henrik Haaning Nielsen. – 26.4, Bøvling Klit (RK), 2K trk., *Peter H. Kristensen. – 30.4, Skagen (NJ), 2K trk., *Knud Pedersen, *Tina Ellis Pedersen m.fl. – 10.5, Skansen, Hundested (S), 2K trk., *Aage K. Mikkelsen, *Franck Ishøi. – 12.5, Skagen (NJ), 3K+ ♀ trk., Brian Rasmussen, Alex Bühring, Lennart Pedersen m.fl. – 15.5, Skagen (NJ), 3K+ ♀ trk., *Jan Hjort Christensen m.fl. – 17.5, Magleby (S), 2K trk., *Thomas Hilkjær. – 24-25.8, Horneks Odde, Læsø (NJ), 1K, *Kent Olsen, Christina Sandfeldt. – 16.9, Klarskov, Korsør (S), 1K trk., *Jørgen Bech.

Med 11 fund den næststørste forekomst herhjemme, kun overgået af 1999 med 13 fund (Thorup & Nielsen 2000). Lagttagelserne 20-22.4 kunne være samme fugl, men er regnet som 3 fund. I øvrigt andet fund af en adult ♂ i Skagen, hvor arten er truffet i alt 35 gange (36 ind.) i perioden 1963-2000. Norge havde 2 fund af adulte hanner hhv. 28.4 og 20.8 (Alf Tore Mjøs i brev). Finland noterede et meget fint år med i alt 22 fund, 18 i perioden 18.4-24.5 og 4 i perioden 27.8-13.10 (Luoto et al. 2001). Sverige havde

i alt 11 fund, hvoraf 8 sås i maj-juni (Cederroth 2001). Bestemmelse af hunfarvede kærhøge er for nylig behandlet af Olsen (2000). (Østeuropa og Centralasien; overvintrer tropisk Østafrika, Lilleasien og Indien)

Lille Skrigeørn *Aquila pomarina*

(9/? , 77-79/? , 4/4)

2000: 14-18.5, Skagen (NJ), 2K trk.fors., *Troels Eske Ortvad m.fl. (Foto) – 19.5, Skagen (NJ), 3K trk.fors., *Knud Pedersen, *Lars Paaby m.fl. (Foto). – 21.5, Aborrebjerg (M), imm./ad. trk., *Per Schiermacker-Hansen, *Niels Årsø. – 22.5, Aborrebjerg (M), imm./ad. trk., *Per Schiermacker-Hansen m.fl.

Dragt karakterer afslørede, at der var tale om to forskellige individer på Møn. (Østeuropa; overvintrer sydlige og sydøstlige Afrika)

Stor Skrigeørn *Aquila clanga* (3/? , 45/? , 2/2)

2000: 3-22.5, Skagen (NJ), imm. trk.fors., *Finn Enemark, *Erik Kramshøj, Knud Pedersen m.fl. (Foto). – 15.5, Skagen (NJ), imm. trk.fors., *Henrik Thorhauge Rask, Knud Pedersen m.fl. (Foto).

(Rusland og østlige Baltikum; overvintrer Sydøsteuropa, Mellemøsten, Lilleasien og Nordøstafrika)

Skriageørn *Aquila pomarina/clanga*

1995: 21.10, Amager (S), trk., *Anders Hammergart.

2000: 3.5, Gjerrild (ÅH), trk., *Per G. Henriksen m.fl.

Kejsereørn *Aquila heliaca* (0, 20/20, 1/1)

2000: 19-20.12, Store Vildmose (NJ), 1K, *Einar Flensted-Jensen m.fl. (Foto).

Første danske vinterfund. Fra Sverige kendes et enkelt fund af en overvintrende fugl i vinteren 1990/91 (Elmberg 1992). (Sydøsteuropa og Sydrusland; overvintrer Sydøsteuropa, Mellemøsten og Nordøstafrika)

Dværgørn *Hieraaetus pennatus* (0, 8/8, 1/1)

1992: 25. eller 26.5, Skagen, 2K lys fase trk.fors., *Briand Strack via Rasmus Strack (Foto).

2000: 10.5, Skagen (NJ), 2K mørk fase trk.fors., *Erik Christophersen, *Klaus Malling Olsen m.fl. (Foto).

Fjerde og femte fund ved Skagen. Fuglen fra 1992 er dokumenteret af fotos, der tilfældigt blev fundet i et billedarkiv. Fuglen dukkede op i de dage, hvor der har været flest ornitologer samlet i Skagen nogensinde. Det er derfor tankevækkende, at blot én observatør så denne fugl. Sverige havde 2 fund i 2000, begge af lys fase, hhv. 1.6 og 13.8 (Cederroth 2001). (Sydeuropa)

Triel *Burhinus oedicnemus* (22/29, 12/12, 1/1)

2000: 20.4, Bulbjerg (NJ), *Egon Mogensen, *Jørgen Bech m.fl.

Nordjylland har en fin "samling" af Trieler, idet alle fugle siden 1970 er truffet i denne landsdel, med én undtagelse (Als 1993, Frich & Nordbjærg 1995). (Sydeuropa)

Ørkenpræstekrave *Charadrius leschenaultii*

(0, 1/1, 1/1)

2000: 25-26.7, Saltvandssøen, Margrethekog (SJ), ♂ i sodr., *Klaus B. Friis m.fl. (Video).

Andet danske fund. Det første var 4-6.8 1994, Agger Tange (NJ) (Rasmussen 1996). Sverige havde et usædvanlig sent fund, idet en fugl rastede på Öland 21.10 (7. fund for landet, Cederroth 2001). (Tyrkiet til Centralasien; overvintrer kyster fra Østafrika til Sydøstasien og Australien)

Sibirisk Tundrahøjle *Pluvialis fulva* (0, 10/10, 3/3)

2000: 18.7, Vestamager (S), ad., *Lars Jensen m.fl. – 19-25.7, Agger Tange (NJ), ad., *Henrik Haaning Nielsen, Thomas Varto Nielsen m.fl. – 28.7, Vester Vedsted (RB), ad. ♂, *Ole Thorup. 3 fund på 11 dage er hidtil største forekomst herhjemme. Juli er klart den bedste måned for adulte fugle med i alt 8 observationer i perioden 14-28.7. Derudover er der truffet adulte fugle på datoerne 10.8 og 24.8. De blot 3 fund af 1K-fugle er set på datoerne 7.9, 11.9 og 3.10. Til sammenligning kan det nævnes, at der i Sverige er truffet adulte fugle i perioden 18.6-11.8 og 1K-fugle i perioden 8.9-22.10 (Cederroth 2000, 2001). (Nordrusland; overvintrer Sydøstasien og Australien)

Steppevibe *Vanellus gregarius* (2/2, 0/0, 1/1)

2000: 29.6-23.7, Søborg Sø og Villingerød (S), ad., *Jan Hjort Christensen m.fl. (Foto). – 24.7, Alsønderup Enge (S), ad., *Jens Lind.

Iagttagelserne regnes som samme fund. De to tidligere danske fund er begge af kategori B:1857, Sydjylland (LF) og 23.6 1930, Ræhr, Hanstholm (NJ) (Olsen 1992). 28.6 2000 rastede en adult fugl på Getterön i Sverige, som kan være identisk med den danske fugl (Cederroth 2001). Se endvidere Christensen (2000). (Centralasien; overvintrer Nordøstafrika, Irak og Indien)

Sumpvibe *Vanellus leucurus* (0, 2/2, 3/3)

2000: 28.4, Christiansø (B), *Peter Lyngs. – 29.4, Lakolk Klitsø (SJ), trk., *Lars Christiansen, *Henrik Højholm, *Kenneth Jørgensen. – 8-10.6, Harboør Tange (RK), *Peter H. Kristensen, *Morten J. Hansen, *Ole Amstrup m.fl. (Foto). – 17.6, Hanvejle (NJ), trk., *Thomas Olsen. – 19.6-28.7, 30.8 og 9-10.9, Bygholm Vejle (NJ), *Palle A. F. Rasmussen, Thomas Varto Nielsen, Helge Røjle Christensen, Poul Hald-Mortensen m.fl.

Fuglen fra Harboør Tange og Vejlerne regnes for samme individ, hvorfor de kun er regnet som ét fund i opsummeringen. De danske fund skal ses i forbindelse med en udvidelse af ynggeområdet mod vest. Bl.a. ynglede 7 par i Rumænien i 2000. Sverige havde ikke mindre end 5 fund i perioden 20.4-9.6, mens Norge noterede sit første fund med en fugl ved Porsanger, Finnmark 20.6-ca. 25.7, og Finlands 4. fund blev gjort 21.5 (Cederroth 2001, Alf Tore Mjøs i brev, Luoto et al. 2001). (Kaspiske Hav til Balkhash-søen samt sjældent i Tyrkiet og Syrien; overvintrer i Sudan, Irak, Pakistan og Indien)

Hvidrygget Ryle *Calidris fuscicollis* (0, 10/10, 4/4)

2000: 1.7, Nordstrand og Grenen, Skagen, ad. i sdr., *Steen Christensen, Rolf Christensen m.fl. (Foto). – 11-15.7, Tipperne (RK), antagelig 2K, *Henrik Knudsen, *Ole Amstrup. – 5.8, Bøtø Nor (LF), 2K+, *Klaus Malling Olsen, *Henning Bach Christensen, *Lars Munk. – 23.8, Køge Nordstrand (S), 2K+, *Mikkel Lausten, *Alex Rosendal. Hidtil største forekomst herhjemme. Den regionale fordeling er nu NJ 1, RK 5, M 3, LF 1 og S 4, med følgende månedsfordeling: maj 2, juni 1, juli 6, august 3, september 1 og oktober 1. (Arktisk Canada; overvintrer i Sydamerika)

Bairdsryle *Calidris bairdii* (0, 0, 1/1)

2000: 19-23.9, Stensnæs (NJ), 1K, *Palle A. F. Rasmussen, Esben Eriksen, Morten Heegaard m.fl. (Foto).

Første – og længe ventede – fund herhjemme. Arten er således truffet i samtlige nabolande, bl.a. 4 gange i både Sverige og Finland (Cederroth 1999), dog har nordmændene netop trukket deres eneste fund tilbage efter genbehandling (Alf Tore Mjøs i brev). (Nordamerika og nordøstlige Sibirien; overvintrer i Sydamerika)

Stribet Ryle *Calidris melanotos* (0, 33/34, 5/5)

2000: 14-15.7, Harboør Tange (RK), ad. ♀, *Rune Bjerre (Foto). – 17-18.7, Nørre Halne (NJ), ad. ♂, *Einar Flensted Jensen, Jørgen Pagter m.fl. (Foto). – 23.7, Løkkeby Enge, Langeland (F), 2K+ ♂, *Klaus Malling Olsen, *Andreas Hagerman, *Jan Eske Schmidt m.fl. – 3-6.8, Skallingen (RB), ad. ♂, *Bent Jakobsen, Ole Amstrup m.fl. (Foto). – 24.9, Norsminde Fjord (ÅH), 1K, *Ole Gylling-Jørgensen m.fl. (Foto).

2000 blev en flot opfølger til rekordåret 1999 (6 fund, Thorup & Nielsen 2000). Den tidsmæssige fordeling af de danske fund er nu maj 7, juni 4, juli 10, august 9, september 7 og oktober 1. Norge noterede sit hidtil største år med ikke mindre end 16 fund af 17 individer (Alf Tore Mjøs i brev). Fra Finland foreligger nu i alt 56 fund t.o.m. 2000, mens Sverige har i alt 124 fund t.o.m.

1999 (Luoto et al. 2001). Arten er fra 1999 udgået af den svenske SU-liste. (Nordamerika og Østsibirien; overvintrer Sydamerika)

Prærieløber *Tryngites subruficollis*

(1/1, 16/16, 2/2)

2000: 10.8, Ølsemagle Revle (S), *Jens Lind m.fl. (Foto). – 5-15.10, Vollerum Enge, Vest Stadil Fjord (RK), 1K, *Ole Amstrup, Peter H. Kristensen, m.fl.

Finland havde 2 fund af 1K-fugle hhv. 28.9-2.10 og 30.9-6.10, mens Sverige havde i alt 5 fund, heraf 2 1K-fugle i dagene 25.9-1.10 (Luoto et al. 2001, Cederroth 2001). (Arktisk Nordamerika; overvintrer i sydlige Sydamerika)

Stor Kobbersnepe *Limosa limosa*

Med karakterer svarende til **Islandsk Stor Kobbersnepe** ssp. *islandica* (0, 4/5, 2/2):

2000: 31.3, Værnengene (RK), ♂ i sdr., *Henrik Knudsen. – 21.4, Værnengene (RK), ♂ i sdr., *Henrik Knudsen m.fl.

(Island, for nylig også Lofoten og Shetland samt Færøerne)

Damklire *Tringa stagnatilis* (0, 44/60, 6/9)

2000: 29.4, Christiansø (B), 2 eks., *Peter Lyngs. – 5.5, Christiansø (B), *Mads Jensen Bunch, Peter Lyngs. – 22.7, Løkkeby Enge, Langeland (F), 3 1K, *Jacob Sterup m.fl. (Foto). – 29.7, Stignæs (S), 1K, *Jørgen Bech. – 1-3.8 og 15-16.8, Margrethekog (SJ), *Lars Maltha Rasmussen, Søren Gjaldbæk, Sebastian Klein m.fl. – 3.8, Bøtø Nor (LFM), *Erik Hartwich m.fl. Med 6 fund tangerer 2000 det hidtil bedste år 1994 (Rasmussen 1996). Også dengang sås en flok 1K-fugle (4 på Ølsemagle Revle (S)). I øvrigt de to første fund fra Christiansø. (Rusland; overvintrer tropisk og sydlige Afrika)

Terekklire *Xenus cinereus* (2/2, 24/24, 2/2)

2000: 12-15.5, Kjelst Grusgrav (RB), ad., *Bent Jakobsen, Jens Hjerrild Hansen m.fl. (Foto). – 28.7-14.8, Aflandshage og Koføeds Enge, Amager (S), ad., *Bent Bøggild Pedersen, *Frank Jensen, Preben Berg m.fl. (Foto).

(Finland og Nordrusland; overvintrer tropisk Afrika og Indiske Ocean)

Rosenmåge *Rhodostethia rosea* (1/1, 6/6, 2/2)

2000: 31.1, Hirtshals Havn (NJ), ad., *Kurt Prentow m.fl. (Foto). – 12-15.2, Skagen (NJ), ad., *Palle A. F. Rasmussen m.fl. (Foto). – 10.3, Vilslev, Ribe (RB), ad., *Ole Zoltan Göller m.fl. (Foto).



Stribet Ryle 1K, Norsminde Fjord 24.9 2000. Foto: Klaus Mortensen. *Pectoral Sandpiper*.



Sneugle 2K ♂, Grenen, Skagen 11.4 2000. Foto: Knud Pedersen. *Snowy Owl*.

Forekomsterne fra Hirtshals og Skagen drejer sig om samme individ og er kun regnet som ét fund i opsummeringen. I øvrigt tredje fund for Skagen. Fundet ved Vilslev er usædvanligt, da fuglen sås fouragere over fugtige enge ca 3 km fra kysten, i selskab med Hættemåger *Larus ridibundus*. (Østsibirien; overvintrer Polarhavet)

Aztekernerne *Sterna elegans* (0, 0, 1/1)

2000: 30.5-12.6, Langli (RB), ad., *Lars Maltha Rasmussen, *Jens Ryge Petersen, *Krestian Knudsen m.fl. (Foto).

Landets første fund, se Petersen (2001). (Nord- og Mellemamerikas stillehavskyst)

Hvidskægget Terne *Chlidonias hybridus*

(0, 16/20, 2/2)

2000: 29.4, Vest Stadil Fjord, ad., *Jan Bolding, Peter H. Kristensen, Ole Amstrup m.fl. (Foto). – 22.10-23.12, Tømmerby Fjord (NJ), 1K, *Søren Haaning Nielsen, Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Foto).

Fuglen fra Vest Stadil Fjord udgør det første aprilfund herhjemme, mens fuglen fra Tømmerby Fjord blot er 2. forekomst af en 1K og samtidig udgør Danmarks første vinterfund. Sidstnævnte sås på sidstedagen fouragere over en fuldstændig isdækket vandflade! I øvrigt 6. fund for Vejlejerne. (Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika)

Hvidvinget Terne *Chlidonias leucopterus*

(3/5, 69/86 ud over invasionen i 1997, 5/5)

2000: 3.5, Selbjerg Vejle (NJ), ad. trk., *Palle A. F. Rasmussen. – 13.5, Store Kattinge Sø (S), ad., *Steen Carstensen, *Pernille Fortmeier. – 4.6, Søby Sø (RK), ad., *Christian Svane (Video). – 10.6, Kammerslusen, 3K, *Ole Thorup. – 14-16.8, Arreskov Sø (F), ad. i odr., *Bent Nielsen, Lars Bonne Rasmussen m.fl. (Østeuropa og Rusland; overvintrer tropisk Afrika)

Sneugle *Nyctea scandiaca* (-, 36/36, 12/12)

1999: 19.12 1999-15.1 2000, Hansted-reservatet (NJ), 1K ♂, *Lars Raunsgaard, Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Foto). – 20.12 1999-20.2 2000, Hansted Reservat (NJ), ad. ♀, *Lars Raunsgaard, Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Foto).

2000: 13-17.2, Vest Stadil Fjord (RK), 2K ♀, *Erik Enevoldsen m.fl. – 16.2, Vest Stadil Fjord (RK), 2K ♂, *Erik Enevoldsen m.fl. (Foto). – 17-19.2, Hansted-reservatet (NJ), 2K ♂, *Henrik Haaning Nielsen m.fl. – 22.2, Saltholm (S), 2K ♂, *Michael Fink Jørgensen, *Morten Jørgensen m.fl. (Foto). – 27-28.2, Skallingen (RB), 2K ♂, Klaus B. Friis, Bent Jacobsen, Per Kjær m.fl. – 12-13.3, Nordstrand, Skagen (NJ), 2K ♀, *Lars H. Mortensen m.fl. (Foto). – 1-3.4, Nordstrand, Skagen (NJ), 2K ♀, *Alex Sand Frich, *Alex Bühring, *René Larsen, *Erik Holm Sørensen m.fl. – 2.4, Agger Tange (NJ), 2K ♂, *Claus Eriksen (Foto). – 7.4, Nordstrand (NJ), 2K+ ♀, *Erik Holm Sørensen, Kent Olsen m.fl. – 10-15.4, Nordstrand og Grenen, Skagen (NJ), 2K ♂ trk.fors., *Rolf Christensen m.fl. (Foto). – 11-15.4, Nordstrand og Grenen, Skagen (NJ), 2K ♂ trk.fors., *Rolf Christensen m.fl. – 18-25.4, Nordstrand, Nedermoste og Grenen, Skagen (NJ), 2K ♂ trk.fors., *Kurt Prentow, *Ulf Møller, Knud Pedersen m.fl. (Foto).

Største invasion herhjemme i 111 år. SU har godkendt fund af 14 individer (se også Thorup & Nielsen 2000), men er bekendt med, at der har optrådt yderligere et antal fugle, der ikke er forelagt udvalget. Der skal derfor lyde en stor opfordring til observatører om at få sendt disse fund ind til behandling, så vi kan danne os et så nøjagtigt billede af invasionen som muligt. Også i Norge sås store bevægelser af Sneugler, og mindst 23 blev set i områderne syd for Finnmark i løbet af vinteren og foråret (Alf Tore Mjøs i brev). (Nordskandinavien og arktisk Rusland)

Spurveugle *Glaucidium passerinum*

(17/17, 27/27 ud over invasionen i 1999/2000, -)

2000: 23-24.3, Skagen (NJ), *Per Nielsen, Lars H. Mortensen m.fl.

Forekomster af Spurveugle på Sjælland i forbindelse med invasionen efterår 1999/forår 2000 skal ikke forelægges SU (se Thorup & Nielsen 2000). (Mellem-skandinavien)

Gråsejler *Apus pallidus* (0, 1/1, 0)1993: 11.3 1993, Kirke Helsingø, Vestsjælland (S), ssp. *illyricus* fundet død, Keld Bennike, Kasper Thorup.

Første danske fund, se Thorup (2001). (Kystegne i det tidligere Jugoslavien; overvintrer Afrika)

Korttået Lærke *Calandrella brachydactyla*

(0, 26/26, 5/5)

2000: 25-26.4, Esbjerg Havn (RB), *Jens Thalund m.fl. (Foto). – 8.5, Nordstrand, Skagen (NJ), trk., *Brian Rasmussen, *Alex Bühring m.fl. – 18.5, Vestamager (S), *Mads Herbøl, Sebastian Klein m.fl. (Foto). – 24.5, Stege Jordbassin (M), *Morten Heegaard, *Henrik Kisbye. – 6-7.6, Nyeng, Skallingen (RB), *Ole Amstrup, *Henrik Knudsen m.fl. – 23.9, Sønderho, Fanø (RB), trk., *Per Kjær.

Hidtil bedste år. Den tidsmæssige fordeling af de danske fund er april 5, maj 13, juni 3, september 2, oktober 4, november 3 og december 1. I Sverige optræder arten nu så regelmæssigt (op til 12 fund i 1997), at fund efter 1998 ikke længere skal forelægges Raritetskomitéen (Cederroth 1999). Norge noterede 3 fund i 2000, bl.a. et medio maj, og Finland havde sit hidtil bedste år med i alt 10 fund fordelt med 6 i perioden 20.4-17.5 og 4 i perioden 25.10-25.11. Finlands total tæller nu 110 fund (Alf Tore Mjøs i brev, Luoto et al. 2001). (Sydeuropa og Asien)

Klippesvale *Ptyonoprogne rupestris* (0, 3/3, 2/2)

2000: 4.5, Blåvandshuk (RB), *Klaus B. Friis m.fl. (Foto). – 5.5, Grenen, Skagen (NJ), trk., *Andreas Hagerman, *Rolf Christensen m.fl.

To observationer på to dage er højst overraskende og kunne angå samme individ. SU har dog valgt at behandle sagerne som to særskilte fund, bl.a. pga. den store afstand mellem de to lokaliteter. Fra det øvrige Skandinavien kendes blot 1 fund fra Sverige og 1 fund fra Finland, mens arten endnu ikke er truffet i Norge (Alf Tore Mjøs i brev). (Mellem- og Sydeuropa)

Rødrygget Svale *Hirundo daurica* (0, 45/48, 1/1)

2000: 21.4, Spodsbjerg Fyr, Hundested (S), trk., *Michael Trasborg, *Franck Ishøi.

(Sydeuropa og Asien; overvintrer savannebæltet i tropisk Afrika og Sydasiens)

Vestlig Middelhavsstenpikker 2K ♂, Aflandshage 20.6 2000. Foto: Preben Berg. *Black-eared Wheatear ssp. hispanica*.

Citronvipstjert *Motacilla citreola* (0, 12/13, 3/3)

2000: 28.5, Nakkehoved Fyr, Gilleleje (S), ♂
 trk., *Stig Nielsen. – 28.8, Strødam (S), 1K,
 *Verner Højgaard, *Knud Højgaard. – 5.11,
 Lejodde, Korsør (S), 1K, *Jørgen Bech.

Fra Finland foreligger i alt 286 fund frem til 1994, hvor
 arten udgik af landets SU-liste (Luoto et al. 2001). (Vest-
 sibirien; overvintrer Indien og (fåtaligt) Arabien)

Sydlig Nattergal *Luscinia megarhynchos*

(2/2, 57/57, 5/5)

2000: 25.4, Tipperne (RK), ringm., *Ole
 Thorup, Henrik Knudsen, Ole Amstrup (Foto). – 6-
 26.5, Fiilsø (RB), syng., *Mogens Bak, Ole
 Amstrup m.fl. (Bånd). – 7.5, Blåvandshuk (RB),
 2K ♂ ringm., *Per Kjær (Foto). – 16.5-10.6,
 Vallensbæk Sø (S), syng., *Tim Andersen (Bånd).
 – 19.5, Bødkermosen (M), syng., *Per Schierma-
 cker-Hansen, Leo Borch m.fl. (Bånd).

(Mellem- og Sydeuropa; overvintrer tropisk Vest- og
 Centralafrika)

Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquata*

Med karakterer svarende til **Sibirisk Sortstrubet
 Bynkefugl** ssp. *maura* (0, 27/27, 2/2):

2000: 8-9.10, Svaneke (B), 1K ♂, *Lars Jensen
 m.fl. – 5-14.11, Bygholm Vejle (NJ), 1K ♂,
 *Henrik Haaning Nielsen, Søren Haaning Nielsen
 m.fl. (Foto).

Fundet fra Svaneke er det første fund for selve Bornholm,
 mens der i alt foreligger 13 fund fra Christiansø. Fundet
 fra Vejlerne er blot det andet fra Nordjylland. Bestem-
 melse af Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl er senest
 behandlet af Nielsen (2001). (Rusland; overvintrer
 Mellemøsten til Sydøstasien)

Middelhavsstenpikker *Oenanthe hispanica*

(0, 2/2, 1/1)

2000: 17.6 og 19-21.6, Aflandshage, Amager
 (S), 2K ♂, *Stig Kjærgaard Rasmussen, Preben
 Berg m.fl. (Foto).

Lige som landets første fund (♀ 18.10 1990, Klintholm
 Havn (M), Frich & Nordbjærg 1995) viste fuglen karak-
 terer som ssp. *hispanica*, der er udbredt i Sydvesteuropa
 og Nordafrika. (Sydeuropa; overvintrer Afrika)

Ørkenstenpikker *Oenanthe deserti* (0, 4/4, 2/2)

2000: 19-20.11, Vejers Strand (RB), 2K+ ♂,
 *Jan Bolding, Janus Ethelberg, Jens Hjerrild
 Hansen m.fl. (Foto). – 2-3.12, Gilleleje Havn (S),
 ♀, *Thomas J. Simonsen, *Frederik Brammer
 m.fl. (Foto).

Første danske vinterfund. Sverige havde 4 fund, heraf 2
 i dagene 25-26.11 (Cederroth 2001). (Centralasien;
 overvintrer Nordøstafrika til Nordindien)

Hvidskægget Sanger *Sylvia cantillans*

(0, 37/37, 4/4)

2000: 4.5, Værnsandekrattet, Værnengene
 (RK), ♂ syng., *Tim Andersen, *Thomas W.
 Johansen m.fl. – 16.5, Tipperne (RK), 2K ♂
 ringm., *Henrik Knudsen, Ole Amstrup m.fl.
 (Foto). – 16.5, Christiansø (B), 2K+ ♂ med karak-
 terer svarende til ssp. *albistriata*, *Michael Funch,
 *Mads Jensen Bunch m.fl. – 20.5, Christiansø (B),
 2K ♂, *Kasper Thorup, Peter Lyngs m.fl.

Endnu et topår i lighed med 1988 og 1999, hvor der også
 noteredes 4 fund (se endvidere Thorup & Nielsen 2000).
 Norge havde hele 5 fund i 2000, bl.a. godkendtes en ♂
 fra Revtangen, Rogaland som det første sikre fund af ssp.
cantillans (Alf Tore Mjøs i brev). (Sydeuropa; overvin-
 trer nordligt i tropisk Afrika samt i Arabien)

Iberisk Gransanger *Phylloscopus brehmii*

(0, 0, 2/2)

1997: 31.5-5.7, Fællesskoven, Stevns (S), *Tim
 Andersen m.fl. (Bånd). – 22.6-13.7, Svanninge
 Bakker (F), *Niels Bomholt m.fl. (Foto, Bånd).
 Første fund i Danmark. (Iberiske halvø; overvintrer Afrika)

Humes Sanger *Phylloscopus humei* (0, 8/8, 2/2)

2000: 15-16.10, Mandø (RB), *Mads Jensen
 Bunch, *Troels Eske Ortvad, *Sebastian Klein
 m.fl. (Foto og bånd). – 16-17.10, Ho Klitplantage
 (RB), *Michael Mosebo Jensen, Knud Pedersen
 m.fl.

Norge, Sverige og Finland noterede deres hidtil bedste år
 med 5 fund i såvel Norge som Finland og 6 fund i
 Sverige. I Sverige sås fuglene i dagene 17.10-11.11, i
 Norge 27.10-11.11, og i Finland 7-22.10. I Sverige er der
 nu 27 fund, i Norge 8 og i Finland 21 (Cederroth 2001,
 Alf Tore Mjøs i brev, Luoto et al. 2001). (Himalaya og
 Tien Shan; overvintrer Nepal og Indien)

Brun Løvsanger *Phylloscopus fuscatus*

(0, 29/29, 2/2)

2000: 21.10, Ho Klitplantage (RB), *Klaus
 Malling Olsen, *Andreas Bruun Kristensen m.fl.
 – 22.10, Hanstholm Fyr (NJ), 1K ♂ ringm., *Leo
 Salmonsens, *John Kyed m.fl. (Foto).

Finland havde 5 fund i perioden 14-23.10 og landets total
 er nu 61 (Luoto et al. 2001). Sverige havde 4 fund i dagene
 4-17.10 og har nu en total på 50 (Cederroth 2001). (Øst-
 sibirien; overvintrer Indien til Øst- og Sydøstasien)

Rødhovedet Tornskade *Lanius senator*

(2/2, 33/33, 1/1)

2000: 11.9, Blåvandshuk (RB), 1K, *Bent
 Jakobsen, Jens Hjerrild Hansen, Andreas Hager-
 man m.fl. (Foto).

(Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika)

Sydlig Stor Tornskade *Lanius meridionalis*
(0, 3/3, 1/1)

Med karakterer svarende til **Steppeornskade** ssp. *pallidirostris*:

2000: 6-7.10 og 12.10, Søndre Bæk, Hasle og Hasle Røgeri (B), *Steffen Nielsen, Thomas Søby m.fl. (Foto).

Hidtil tidligste danske fund. De øvrige er truffet i perioden 22.10-26.11. Fra Sverige foreligger 5 fund t.o.m 1999, hvoraf 4 efterårsfund er set i perioden 30.8-ca. 10.11 (Cederroth 2000). Finland har netop godkendt sit første fund, en dødfunden fugl fra 1981 (Luoto et al. 2001). (Centralasien; overvintrer Nordøstafrika til Irak)

Rosenstær *Sturnus roseus* (18/18, 39/39, 3/3)

1999: 17.10, Liver Å, Tornby Strand (NJ), 1K, *Anders Østerby.

2000: 27-30.5, Skagen (NJ), 2K ♀, *Svend Dybkjær m.fl. (Foto). – 28-30.5, Skagen (NJ), ad. ♂, *Svend Dybkjær m.fl. (Foto). – 28.5, Christiansø (B), ad. ♀, *Jan Fischer Rasmussen m.fl. Fundet fra 1999 bringer totalen for det år op på 3 fund. De to fugle i Skagen sås ofte sidde sammen på den samme tagryg hvor 2K-hannen 9-16.5 1999 også sad (se Thorup & Nielsen 2000). Finland noterede sit hidtil bedste år med 13 fund, heraf 7 i perioden 25.5-25.6 (Luoto et al. 2001). (Sydøsteuropa, Tyrkiet og Lilleasien; overvintrer Indien)

Pileværting *Emberiza rustica* (0, 39/39, 1/1)

1992: 27.9, Kroghage, Gedser (LF), 1K, *Klaus Nielsen, Jørgen Munck Pedersen (Video).

2000: 24.5, Christiansø (B), ♀, *Peter Lyngs, *Sebastian Klein, *Kasper Thorup m.fl.

De fleste danske fund (22) er fra Christiansø. (Nordlige Fennoskandinavien og Rusland; overvintrer nordlige Asien)

Dværgværting *Emberiza pusilla* (0, 56/56, 3/3)

2000: 16.5, Christiansø (B), *Michael Funch. – 20.10, Blåvandshuk (RB), *Christian Leth. – 4.11, Kærup Holme (NJ), *Henrik Haaning Nielsen, Søren Haaning Nielsen.

(Nordfinland og Nordrusland; overvintrer Kina og Sydøstasien)

Brunhovedet Værting/Hætteværting *Emberiza bruniceps/melanocephala*

2000: 12.9, Christiansø (B), 1K, *Kasper Thorup.

Andet fund af en 1K Brunhovedet Værting/Hætteværting; det første var 8.10 1993, Blåvandshuk (RB) (Rasmussen 1997). Årets fugl havde flere karakterer, som tyder på Hætteværting, men feltbestemmelse af ungfugle af disse to meget nærtstående arter er vanskelig, og fugle med intermediære karakterer forekommer.

Der foreligger 16 fund af Hætteværting i kategori A og 3 fund af Brunhovedet Værting i kategori D, alle adulte fugle. (Kazakhstan og Nordøstkina/Sydøsteuropa og Lilleasien; overvintrer Pakistan og Indien)

Kategori D: Mulige undslupne fangenskabsfugle**Category D: Possible escapes****Hjelmkallesluger** *Mergus cucullatus*

(0/0, 2/2, 1/1)

2000: 27-28.7, Saltvandssøen, Margrethekog (SJ), ♂ i eclipsedragt, *Klaus B. Friis.

Fuglen viste ikke direkte tegn på at skulle stamme fra fangenskab, hvorfor den figurerer i denne kategori.

Long-tailed Rosefinch *Uragus sibiricus*

(0/0, 2/2, 1/1)

1999: 20.4, Onsbjerg, Samsø (ÅH), ♂, *Svend Dybkjær, Birgitte Skjold Nielsen (Foto).

2000: 6-9.5, Christiansø (B), ♂, *Peter Lyngs, Mads Jensen Bunch m.fl. (Foto).

Første fund siden 1993, hvor en 2K ♂ rastede i Jydelejet, Møn (M) i dagene 28-29.4. Arten forhandles i fangenskab i stort omfang, men det er værd at bemærke, at arten i udbredelsesområdet fører en nomadeagtig tilværelse uden for yngletiden, ligesom det for nylig er konstateret, at arten er ekspanderet vestpå, så den nu akkurat yngler i det vestpalæarktiske område (Ryabitssev & Wilson 1999). At udelukke spontan optræden er således ikke en selvfølge. (Sydlige og østlige Sibirien og Kina)

Kategori E: Sandsynlige eller sikre undslupne fangenskabsfugle**Category E: Likely or certain escapes****Rødrygget Pelikan** *Pelecanus rufescens*

(0, 2/2, 1/1)

2000: 4-5.10, Stavns Fjord, Samsø (ÅH), 1K eller imm., *Svend Dybkjær, Leif Brauer.

(Afrika)

Dværgsnegås *Anser rossii* (0, 2/2, 1/1)

2000: 15.10, Margrethekog (SJ), ad., *Troels Eske Ortvad, *Sebastian Klein, *Mads Jensen Bunch.

(Nordamerika)

Kalkungrib *Cathartes aura* (0, 1/1, 1/1)

2000: 6-7.11, Harboør (RK), *Peter H. Kristensen, Jørgen Nørgaard (Foto).

(Nordamerika)

Ørnevåge *Buteo rufinus* (0, 0, 1/1)

2000: med. aug., NØ-Sjælland (S), ad., via Kasper Thorup (Video).

Fuglen, der ikke umiddelbart viste tegn på fangenskab, blev fundet afkræftet og siden indfanget. På videooptagelsen ses på fuglens ene ben hvad der formentlig er en indopereret microchip, altså et sikkert bevis på at fuglen har været i fangenskab. Det er første sikre fund af en undsluppen Ørnevåge; de øvrige fund er alle henregnet til Kategori A.

Blåskade *Cyanopica cyana* (0, 0, 2/2)

2000: 5-8.10, Havnsø (S), *Peter Bradtberg, – 24-26.10, Rørvig (S), *Erik Vikkelsø Rasmussen m.fl.

Første danske fund af denne udprægede standfugl. Fra det nordøstlige Spanien og det sydligste Frankrig er der i forårsmånederne enkelte rapporter om strejfende fugle (Cramp 1998), men arten er ikke truffet uden for dette område, hvorfor der ikke er nogen oplagt grund til at formode spontan optræden. (Iberiske halvø)

Rosendompap *Carpodacus roseus* (0, 2/2, 1/1)

2000: 17.4, Trend (NJ), ad. ♂, *Svend Holst Jensen, *Mona Beatie (Foto). (Central- og Østsibirien; overvintrer sydlige del af udbredelsesområdet samt Mongoliet)

Hybrider

Records involving hybrids

Pibeand × Amerikansk Pibeand *Anas penelope* × *americana*

2000: 5.12, Harboør Tange (RK), ♂, *Ole Amstrup.

Se bemærkning under Amerikansk Pibeand.

Grønland - Kategori A

Prærietrane *Grus canadensis*

1990: 6.8, Thule, *Kim Øllgaard.
Første forekomst på Grønland. Arten yngler i Nordamerika.

Bonapartemåge *Larus philadelphia*

2000: 3.8, Nuuk, 2K, *Martin Kviesgaard, *Lars Witting m.fl. (Foto).
Yngler i Nordamerika.

Årsrapporten

Species considered for regional reports

Stormsvale *Oceanodroma/Hydrobates* sp. 2000: 9.12, Arreskov Sø (F), *Erik Ehmsen.

Stellersand *Polysticta stelleri* 2000: 29.4, Nordstrand, Skagen (NJ), ad. ♀ trk., *Erik Holm Sørensen, *Erik Christophersen m.fl. – 11-12.11, Syrodde, Læsø (NJ), ad. ♀, *Kent Olsen m.fl. (Foto).

Sandterne *Gelochelidon nilotica* 2000: 28.4, Nordstrand og Grenen, Skagen (NJ), *Alex Sand Frich m.fl.


Storpiber *Anthus richardi* 2000: 22.1, Hanstedreservatet (NJ), trk., *Henrik Haaning Nielsen, *Søren Haaning Nielsen, *Jan Haaning Nielsen.

Gul Vipstjert *Motacilla flava* 2000: 19.12, Bygholm Vejle (NJ), antagelig østlig type, *Henrik Haaning Nielsen.

Bynkefugl *Saxicola rubetra* 2000: 17.12-30.1 2001, Nørlev Strand (NJ), *Poul Jespersen, Kurt Prentow m.fl. (Foto).

Korttæt Træløber *Certhia brachyactyla* 2000: 10.3-6.4 samt 4.7, Krabbesholm Skov (NJ), ynglefund, *David Boertmann.

Sydlig Fyrremejse *Parus montanus salicarius* 2000: 19-28.5, Stallerup Sø (VE), ynglefund, *Dennis Langholz m.fl.



Endnu ikke færdigbehandlede sager Records still under consideration

Steppeørn *Aquila nipalensis* 2000: 25.9-2.5.01, Bornholm.
 Steppehøg *Circus macrourus* 1999: 6.5, Rørvig (S), ♂ ad.
 Islandsk Stor Kobbersneppe *Limosa limosa islandica* 1999: 12.9-7.10, Bygholm Vejle (NJ), 3 1K. – 2000: 24.7, Kammerlusen (RB), 2 ad. – 3.10, Tipperne (RK), 1 ad. + 3 1K.
 Citronvipstjert *Motacilla citreola* 2000: 17.5, Grenen (NJ), ♀ rst. og trk.
 Gul Vipstjert ssp. *superciliaris* 1998: 7-8.5 Nordmarken, Læsø (NJ), ♂.
 Gærdesanger *Sylvia curruca* østlig type 2000: 9.9, Hanstholm (NJ), 1K ringm.
 Hætteværting *Emberiza melanocephala* 2000: 13.4, Søby Brunkulslejer (RK), ad. ♂.

Forkastede sager Records not accepted

Middelhavsskråpe *Puffinus yelkouan* 2000: 20.8, Ørhage (NJ).
 Storskråpe *Puffinus gravis* 2000: 9.9, Vejlbj Klit (RK).
 Stor Stormsvalde *Oceanodroma leucorhoa* 2000: 9.12, Arreskov Sø (F).
 Topskarv *Phalacrocorax aristotelis* 1997: 5.10, Lakolk Strand, Rømø (SJ), trk.
 Dværgsnegås *Anser rossi* 1999: 17.10, Borreby Mose (S), blå fase.
 Sortbuget Knortegås *Branta bernicla nigricans* 2000: 14.12, Søjord, Fanø (RB).
 Amerikansk Pibeand *Anas americana* 2000: 19.3, Ulvedyb (NJ).
 Slangeørn *Circaetus gallicus* 2000: 13.5, Hjallerup Enge (NJ).
 Steppehøg *Circus macrourus* 2000: 7.5, Gjerrild (ÅH), 2K ♂ trk.
 Lille Skrigeørn *Aquila pomarina* 2000: 7.10, Maglemose (S).
 Dværgørn *Hieraaetus pennatus* 1999: 15.5, Øsby (SJ), mørk fase. – 2000: 15.5, Vaserne (S), mørk fase.
 Lille Tårnfalk *Falco naumanni* 2000: 29.4, Sødrieholm Hede (ÅH). – 20.8, Kalø (ÅH), ♂ 2K. – 23.8, Kalø (ÅH), ♂ 1K.
 Eleonorafalk *Falco eleonorae* 2000: 15.8, Femmøller Strand (ÅH), ♂ ad. trk.
 Jagtfalk *Falco rusticolus* 2000: 9.3, Smørmosen (S). – 25.4, Hovvig, Rørvig (S).
 Stylteløber *Himantopus himantopus* 2000: 30.7, Klydesøen, Amager (S).
 Pomeransfugl *Charadrius morinellus* 1997: 29.9, Saltbækvig (S), 24-25 eks.
 Sibirisk Tundrahjelle *Pluvialis fulva* 1993: 26.7, Dalby Strand (S).
 Tundrahjelle sp. *Pluvialis dominica/fulva* 2000: 24.7,

Indvindingen (RB), ♂ ad.
 Sneppeklire sp. *Limnodromus scolopaceus/griseus* 2000: 6.9, Indvindingen (RB).
 Damklire *Tringa stagnatilis* 2000: 30.4, Lejsø, Halsskov (S). – 6-7.5, Sprogø (F).
 Stor Gulbenet Klire *Tringa melanoleuca* 1998: 5.4, Misthusum, Skærbæk (SJ).
 Lattermåge *Larus atricilla* 2000: 6.5, Sønderborg Bugt (SJ).
 Sabinemåge *Larus sabini* 2000: 30.1, Gilleleje Havn (S).
 Stor Hornugle *Bubo bubo* 1999: 30.12, Sletten Strand (S).
 Mellemlagspætte *Dendrocopos medius* 2000: 6.4, Kostræde Banker, Lundby (S).
 Sorthovedet Gul Vipstjert *Motacilla flava feldegg* 2000: 13.5, Elling Strandenge (NJ).
 Citronvipstjert *Motacilla citreola* 2000: 4.9, Tipperne (RK). – 22.10, Bygholm Vejle (NJ).
 Sydlig Nattergal *Luscinia megarhynchos* 2000: 15.6, Vejle Ådal (VE).
 Hvidbrynet Løvsanger *Phylloscopus inornatus* 2000: 17.3, Sønderskoven, Als (SJ).
 Hvidhalset Fluesnapper *Ficedula albicollis* 2000: 20.7, Fedtmosen, Gladsaxe (S), ♀.

Summary Rare birds in Denmark and Greenland in 2000

In 2000 the Danish Rarities Committee (Sjældnehedsudvalget, SU) processed 198 Danish records (including 9 records on behalf of the regional reports), of which 81% were accepted. In addition, there were 2 records from Greenland.

The main section of the report, Accepted records, includes species on the Danish list belonging to categories A, B and C according to the AERC standard. Species belonging to category D and E and records involving hybrids are treated after the main section, as are species considered for the regional reports, records from Greenland, records still under consideration, and records not accepted.

For each record the following details are included: 1) year and date, 2) locality (see map for regions), 3) number of individuals if more than one, 4) other details if known: sdr. = summer plumage, vdr. = winter plumage, odr. = transitional plumage, K = calendar year, ringm. = ringed, and 5) name of observer(s), with finders marked by asterisk(s). Where applicable, documentation by photo (Foto), video (Video), audiotape (Bånd) or corpse (Død) is indicated.

The numbers in brackets after the species name refer to, respectively, the total number of records and individuals (separated by a slash in Denmark 1) before 1950, 2) from 1950 to 1999 incl. and 3) in 2000.

The present report adds four new species to the Danish list: Baird's Sandpiper *Calidris bairdii* and Elegant Tern *Sterna elegans* from 2000, Pallid Swift *Apus pallidus* (ssp. *illyricus*) from 1993 and Iberian Chiffchaff *Phylloscopus brehmii* from 1997. Other remarkable records from 2000 were the second record of Greater Sand Plover *Charadrius leschenaultii*, the third record of Sociable

Lapwing *Vanellus gregarius*, the third, fourth and fifth record of White-tailed Lapwing *Vanellus leucurus*, and the fourth and fifth record of Crag Martin *Ptyonoprogne rupestris*. The Sandhill Crane *Grus canadensis* was reported as new to Greenland (1990).

Referencer

- Carey, G.J. 1993. Hybrid male wigeon in East Asia. – Hong Kong Bird Report 1992, Hong Kong Bird-watching Society.
- Cederroth, C. 1999. Sällsynta fåglar i Sverige i 1998. I SOF: Fågelåret 1998. – Stockholm.
- Cederroth, C. 2000. Sällsynta fåglar i Sverige i 1999. I SOF: Fågelåret 1999. – Stockholm.
- Cederroth, C. 2001. Sällsynta fåglar i Sverige i 2000. I SOF: Fågelåret 2000. – Stockholm.
- Christensen, J.H. 2000: Steppevibe. – DOF-NYT 6: 32.
- Cramp, S. 1998: The complete birds of the western Palearctic. – CD-ROM, Oxford University Press.
- Elmberg, J. 1992: Sällsynta fåglar i Sverige 1991. – Vår Fågelvärld 51(7-8): 17-32.
- Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1995: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1993. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 89: 101-110.
- Harrop, A. 1994a. Field identification of American Wigeon. – Birding World 7: 50-56.
- Harrop, A. 1994b. Photo-forum: a presumed hybrid American Wigeon in Grampian. – Birding World 7: 116-117.
- Luoto, H., A. Lindholm, T. Lindroos & V. Rauste 2001: Rare birds in Finland 2000. – Linnut-Vuosikinja.
- Nielsen, H.H. 2001: Feltbestemmelse af Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl. – Fugle i Felten 7: 24-27.
- Olsen, K.M. 1989: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1988. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: 131-150.
- Olsen, K.M. 1992: Danmarks Fugle - en oversigt. – Dansk Ornitologisk Forening.
- Olsen, K.M. 2000: Kærhøge. – DOF-NYT 6: 24-27.
- Petersen, J.R. 2001: Aztekerterne *Sterna elegans*. Første fund i Fennoskandinavien – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: 167-168.
- Rasmussen, P.A.F. 1996: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1994. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 90: 141-152.
- Rasmussen, P.A.F. 1997: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og 1996. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 133-150.
- Rasmussen, P.A.F. 1998: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1997. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: 253-267.
- Rasmussen, P.A.F. 1999: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1998. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: 127-140.
- Ryabitshev, V.K. & M.G. Wilson 1999: Range extension of Long-tailed Rosefinch into the Western Palearctic. – British Birds 92: 498-503.
- Thorup, K. 2001: First record of Pallid Swift *Apus pallidus* in Denmark and of ssp. *illyricus* in northern Europe. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: 169-172.
- Thorup, K. & H.H. Nielsen 2000: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: 157-170.

Rettelse til SU-rapport nr 29, DOFT 94: 157-170, 2000

- Sortbuget Knortegås ssp. *nigricans* 1998: 4.3-24.5, Agerø (NJ), ad. ♀, skal være ad. ♂. – 1999: 24.4-24.5, Agerø (NJ), ad. ♀, skal være ad. ♂.
- Sortbuget Knortegås ssp. *nigricans* Grønland 1999: 29.7, Kilen, Nordgrønland, ad., skal være 1998.
- Mørkbuget Knortegås ssp. *bernicla* Grønland 1999: 10.8, Mudderbugten, Peary Land, ad., skal være 1998.
- Amerikansk Krikand *Anas crecca carolinensis* 1999: Fuglen fra Værnengene (13.4) og Vest Stadil Fjord (15.4) skal *ikke* regnes som samme fugl, som det ellers fremgår af bemærkningen. Summeringen (0, 18/18, 7/7) er imidlertid korrekt.

Antaget 25. oktober 2001

Henrik Haaning Nielsen (haanings@hotmail.com)
Frimervej 16
DK-7742 Vesløs

Kasper Thorup (kthorup@zmuc.ku.dk)
Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø