

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2006

Ole Amstrup, Andreas Bruun Kristensen og Troels Eske Ortvad

Rapport nr. 37 fra Sjældenhedsudvalget

(With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 2006)

Indledning

Denne rapport omhandler 141 færdigbehandlede sager fra Danmark, heraf 93 fra 2006. Heri indgår 2 sager, som SU har behandlet på opfordring fra lokalrapporternes redaktioner, vedrørende arter, som er udgået af SU-listen, men som skønnes at være sjældne lokalt eller er truffet på usædvanlige tidspunkter af året. Disse fund publiceres (siden Rasmussen 1997) i den landsdækkende årsrapport i DOFT, men er tillige nævnt sidst i denne rapport. 99 (70%) af de færdigbehandlede sager (heraf 72 (77 %) af sagerne fra 2006) blev godkendt, hvilket kan sammenlignes med en godkendelsesprocent på mellem 75 og 83 de seneste 10 år. 51 (53 %) af de godkendte sager blev dokumenteret ved hjælp af foto, video eller bånd. For Grønland færdigbehandles 5 sager, hvoraf en blev forkastet.

Til og med denne rapport henligger der 11 sager, som af forskellige årsager endnu ikke er færdigbehandlet. En liste over disse sager samt en liste over forkastede fund findes bagest i rapporten.

Den systematiske gennemgang og den regionale inddeling er som i den foregående rapport (Amstrup et al. 2006). Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for henholdsvis første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen mindst er i sit andet (tredje) kalenderår, men kan være ældre. Ad. = adult (gammel, udfarvet fugl), imm. = immature (dragter mellem juvenil og adult), juv. = juvenil (første egentlige fjerdragt), pull. = pullus (dununge), rst. = rastende, sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt, trk.fors. = trækforsøgende, trk. = trækkende, syng. = syngende og ringm. = ringmærket.

Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal anerkendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før 1.1 1950; 2) antal godkendte fund og individer fra og med 1.1 1950 til og med 2005; 3) antal godkendte fund og individer i 2006. Denne opdeling er i overensstemmelse med den standard, der anbefales af AERC (Association of European Rarities Committees). Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid er identisk med antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på én dag regnes som 5 fund. I lighed med europæisk standard regnes ynglefund (inkl. unger) som ét fund. Mht. returnerende individer fra år til år, har SU valgt at ændre praksis, således at observationer fra flere år kun opsummeres som ét fund.

Efter observatørnavnet er det oplyst, om de enkelte fund er dokumenteret med foto (Foto), videofilm (Video), lydoptagelse (Bånd) eller dødfunden fugl (Død). Desuden er findere(n) ved hvert fund markeret med en asterisk (*) foran observatørnavnet. Som fin-

der(e) regnes den(de), der har været til stede, da fuglen blev opdaget/bestemt. Imidlertid fremgår det ikke altid tydeligt af beskrivelserne, hvem finderen er, og der kan derfor mangle enkelte markeringer. I beskrivelser til SU bør det angives, hvem finderen er.

I bemærkningerne til de enkelte arter/racer er artens/racens normale yngle- og vinterudbredelse eller udbredelsen, hvorfra danske forekomster vurderes at komme, tilføjet i parentes.

Sjældne fugle i 2006

År 2006 blev skudt i gang med manér nytårsdag med fundet af landets første Østlig Kalanderlærke ved Køge. Første kvartal stod i øvrigt i de amerikanske fugles tegn med Halsbåndstroland på Falster, Amerikansk Sortand ved Blåvandshuk og Ringnæbbet Måge i Nærum. Forårets højsæson begyndte lovende med en nordsjællandsk Alpejernspurv i april. Maj måned havde lidt svært ved at levere varen, men reddede åren i kraft af bl.a. Sibirisk- og Amerikansk Hjejle i Vejlerne og Hvidrygget Ryle på Møn.

Hvad foråret manglede af "megahit" blev dog rigeligt kompenseret hen over sommeren. Juni måned vil især huskes for landets første Audouinsmåge, som holdt audiens i Helsingør Havn, mens sensommeren bød på et slagkraftigt trekløver i form af Sortvinget Braksvale ved Esbjerg, Skadegøg på Als og den højst uventede første spontane forekomst af Krøltoppet Pelikan som krydsede Jylland på langs.

Under vadefuglernes returtræk var en nordjysk Baird-ryle det absolutte højdepunkt. På rovfuglefronten markerede Stevns Klint sig med fund af Ørnevåge i august og Eleonorafalk i september. Efterårets hovedbegivenhed fandt dog sted på Mandø, hvor landets første Stribet Sanger tilbragte et par dage i oktober.

Året sluttede omtrent lige så godt som det var begyndt med en længe ventet Ismåge på Lolland mellem jul og nytår.

SU-listen

Listen over arter og racer, som skal godkendes af SU, er senest publiceret i Rasmussen (1997), med ændringer i Rasmussen (1998, 1999), Thorup & Nielsen (2000), Nielsen & Thorup (2001), Ortvad et al. (2002), Amstrup et al. (2004), Amstrup et al. (2005) og Amstrup et al. (2006). SU-listen kan desuden findes på http://www.dof.dk/01_organisation/Udvalg/SU_listen.html. En generel vejledning i indsendelse af sager findes på http://www.dof.dk/01_organisation/Udvalg/SU.html#indsend.

Det er nu blevet muligt for indsendere at uploade deres

SU-beskrivelser direkte til SU's database. Hvis man vil uploade en beskrivelse til SU kan man gå ind på adressen: <http://www.netfugl.dk/su-upload/index.php>. Her bliver man vejledt. SU modtager naturligvis fortsat beskrivelser pr. post og e-mail, men vi anmoder om at folk uploader beskrivelserne selv. SU behandler fund af arter fra alle kategorier (se nedenfor), og for at få så fyldestgørende et billede som muligt af de forskellige arters og racers optræden herhjemme, er det i princippet vigtigt, at alt bliver rapporteret. Der vil dog forekomme tilfælde, hvor det må skønnes at en SU-godkendelse ikke er nødvendig, f.eks. fund af almindelige burfugle (Undulat m.fl.). Er man i tvivl om, hvorvidt et fund bør behandles af SU, kan man kontakte udvalget.

Kategorier

I henhold til AERC-standard inddeles de i Danmark trufne fuglearter i 5 kategorier, defineret som følger:

- A** Arter der betragtes som spontant optrædende og er truffet mindst én gang siden 1.1 1950; f.eks. Vibe og Amerikansk Pibeand. Som spontant optrædende regnes ligeledes skibs- eller på anden måde assisterede forekomster, når fuglen ikke har været fodret eller tilbageholdt.
- B** Arter der betragtes som spontant optrædende men kun er truffet før 1.1 1950; f.eks. Kravetrappe og Bartramsklire.
- C** Udsatte og undslupne arter som har etableret en fritlevende og selvsupplerende bestand, enten herhjemme eller i andre lande; f.eks. Nilgås og Fasan.
- D** Arter som ville være placeret i A eller B, hvis ikke der var rimelig tvivl om, hvorvidt de nogensinde havde optrådt spontant i landet; f.eks. Flamingo og Almindelig Pelikan.
- E** Arter der betragtes som undsluppet fra fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i landet, eller hvis fritlevende bestande – hvis eksisterende – formentlig ikke er selvsupplerende; f.eks. Rødrygget Pelikan, Steppeørn med stropper og ynglefund af Mandarinand.

Den officielle danske liste udgøres af arterne i kategori A, B og C. Fund af arter i kategori D og E behandles også af SU, men publiceres særskilt bagest i SU-rapporten.

Sjældenhedsudvalgets medlemmer

SU bestod frem til udgangen af 2006 af følgende medlemmer: Ole Amstrup, Alex Sand Frich, Tim Hesselballe Hansen, Sebastian Klein, Andreas Bruun Kristensen, Peter H. Kristensen, Kent Olsen, Troels Eske Ortvad, Michael Schwalbe og Kasper Thorup.
Sjældenhedsudvalgets adresse: Sjældenhedsudvalget,

DOF, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V.
E-mail: su@dof.dk.

For kritik og kommentarer til denne rapport takkes sjældenhedsudvalgets medlemmer samt Morten Bentzon Hansen. Takkes skal også Anders Blomdahl for informationer om sjældne fugleforekomster i Sverige i 2006. Den største tak rettes dog til de mange, der rapporterede deres observationer til SU og dermed skabte grundlaget for denne rapport.

Kuhls Skråpe *Calonectris diomedea* (0, 46/47, 3/3)

2006: 5.10, Gilbjerg Hoved (S), rst. og trk., *Alex Rosendal, Jakob Engelhard, Christian Leth m.fl. – 5.11, Skagens Gren (NJ), trk., *Knud Pedersen, Rolf Christensen m.fl. – 12.11, Gilleleje (S), trk., *Jim Christensen, *Christian Leth, Henrik Korsbæk m.fl., 12.11. – Kikhavn (S), trk., *Lars Rask, Morten Heegaard, Henrik Rask. – 12.11, Rørvig (S), trk., *Jørgen Hulbæk Christiansen.

Fuglen fra 5.11 viste en undervingetegning som tyder på ssp. borealis, som yngler i Atlanterhavet, men fundet er indtil videre godkendt som *C. diomedea* ssp., idet variationen hos ssp. diomedea, som yngler i Middelhavet, endnu ikke er tilstrækkelig dokumenteret. Begge underarter forekommer i Nordøstatlanten dog med en stor overvægt af ssp. borealis (Fisher & Flood 2004). Fundene fra 12.11 drejer sig om samme individ. (Middelhavet og Midtatlanten; overvintrer Sydatlanten).

Lille Skråpe *Puffinus assimilis* (1/1, 0, 0)

Landets andet forekomst (18.6 1997 Nordsøen) anerkendes efter genbehandling ikke længere. Fundet er publiceret i Rasmussen (1998). Eneste danske fund er fra 18.9 1912, hvor en adult blev indsamlet i Skagerrak (Hørring 1942). (Madeira, Kanariske Øer)

Krøltoppet Pelikan *Pelecanus crispus* (0, 0, 1)

2006: 22.7, Kongens Mose (SJ), imm., *Villy Petersen (Foto). – 4.-5.8, Hanstholm og Sårup Grusgrav, (NJ), imm., *Jan S. Kristensen, John Kyed m.fl. (Foto). – 5.-6.8, Ørum Sø, (NJ), imm., Silas K.K. Olofson m.fl. (Foto).

Ny art for landet. Samtlige iagttagelser fra 2006 drejer sig om samme individ og udgør landets første spontane fund af arten. Nordvesteuropæiske fund fra nyere tid anses typisk at gælde undslupne fangenskabfugle. SU vurderer dog, at det aktuelle fund efter al sandsynlighed er spontant, eftersom fuglen udviste udpræget vild adfærd uden tegn på fangenskab. Dragtdetaljer har desuden gjort det muligt at spore fuglen langt tilbage mod artens naturlige udbredelse. Samme fugl sås således med sikkerhed tidligere på sommeren på flere lokaliteter op gennem Polen og formentlig også i Tyskland (Hagerman & Jensen 2006). Fundet skal ses i lyset af de senere års fremgang for den europæiske ynglebe-



Krøttoppet Pelikan, Ørum Sø, Thy, 6. august 2006.
Foto: Søren Kristoffersen.

stand (Hagerman & Jensen 2006). (Sydøsteuropa og Asien; overvintrer østlige del af Middelhavet mod øst til Pakistan og Indien)

Sort Ibis *Plegadis falcinellus* (13/20, 20/22, 1/1)

2006: 28.9-29.10, Tobberup, Hobro (NJ), ad., *Børge Lyngaa, *Jenny Lyngaa, Hans Christophersen m.fl. (Foto).

Fuglen fouragerede på en mødding ved en gård. (Sydeuropa og Centralasien; overvintrer i Nord- og Østafrika samt Sydøstasien)



Sort Ibis, Tobberup, Hobro, 25. oktober 2006. Foto: Ole Krogh.



Amerikansk Pibeand, Thorsminde Havn, 8. januar 2006.
Foto: Gerner Majlandt.

Dværggås *Anser erythropus* (30, 57 t.o.m. 1996, -)

1978: 7.11, Harndrup, Bogense (F), 2K+, skudt, via Erik Ehmsen (Foto).

Det udstoppede eksemplar findes nu i samlingen på Valdemar Slot. Dværggås udgik af SU-listen fra og med 1997. (Nordskandinavien, arktisk Rusland)

Amerikansk Pibeand *Anas americana* (0, 26/26, 1/1)

2002: 9.4-16.4, Nexø Sydstrand (B), , Oluf Lou m.fl. (Foto).

2006: 5.1-9.1, Thorsminde Havn (RK), 3K+, *Ole Amstrup m.fl. (Foto) – 30.1-13.2, Indfjorden (RK), 3K+, *Jørgen Nørgaard m.fl.

Fundet for 2002 er tidligere godkendt fra 9.4 (Klein & Thorup 2003). Observationerne fra 2006 drejer sig med stor sandsynlighed om samme fugl, hvorfor de kun medregnes som ét fund. (Nordamerika)

Halsbåndstroidand *Aythya collaris* (0, 9/9, 1/1)

1990: 18.2-19.3, Hjarbæk Fjord, (NJ), 3K+ , Jens Lind.
2006: 29.1-11.3, Guldborgsund, Nykøbing Falster (LF), 3K+ , *Asbjørn Jensen m.fl. (Foto).

Fundet fra 1990 er tidligere godkendt for perioden 18.-25.2 (Frich & Nordbjærg 1992). (Nordamerika)

Hvidøjet And *Aythya nyroca* (4/4, 31/34, 2/2)

1971: 1.-19.6, Bromme Lille Sø, Sorø (S), Jens Lind m.fl.
2005: 31.10-4.12, Røgbølle Sø, Maribosøerne (LF), 2K+, *Lasse Strandgaard, Rasmus Strack m.fl.
2006: 3.9, Naskov Indrefjord (LF), 2K+, *Rasmus Strack. – 7.10, Søndersø, Maribosøerne (LF), 2K+, *Rasmus Strack (Foto).

Fuglen fra 1971 har tidligere været godkendt for perioden 1.-3.6 (Bruun et al. 1972). Der bør udvises stor forsigtighed ved bestemmelse af Hvidøjet And, idet hybrider



Halsbåndstrolch, Nykøbing Falster, 12. februar 2006.
Foto: Ib Jensen.

der med Taffeland let forveksles med rene Hvidøjede Ænder. (Øst- og Sydøsteuropa; overvintrer Middelhavet, Sortehavet og Nordafrika)

Amerikansk Sortand

Melanitta americana (0, 3/3, 0/0)

2006: 18.3-26.5, Blåvands Huk (RB), ad. , *Søren Kristoffersen, Henrik Knudsen m.fl. (Foto).

Fuglen regnes som samme individ som sås på den nærliggende lokalitet, Grønningen, 3.2 2005 (Amstrup et al. 2006). (Nordamerika og nordlige Østasien)

Brilleand *Melanitta perspicillata* (0, 28/30, 2/2)

2005: 14.10, Ørhage, Klitmøller (NJ), ad. , Anni Nielsen, Peter Nielsen (Foto).

2006: 1.1-28.3 Blåvands Huk (RB), 2 ad. , *Henrik Knudsen, Bent Jakobsen m.fl. (Foto). – 17.9-15.11, Blåvands Huk (RB), 2K+ , Rasmus Strack m.fl. – 7.10, Vedersø Klit (RK), ad. trk., *Tina Ellis Petersen, *Lars H. Mortensen m.fl.

Fundet fra 2005 har tidligere været godkendt fra 13.10 (Amstrup et al. 2006). Der var evt. tre forskellige hanner ved Blåvands Huk i vinteren 2005/06, heraf blev



Slangeørn, Skagen, 3. juli 2006. Foto: Knud Pedersen.

den ene opdaget 30.12 2005 (Amstrup et al. 2006). Fuglen fra perioden 17.9-15.11 2006 regnes som et af de individer der overvintrede på lokaliteten i vinteren 2005/06 - i lighed med Amerikansk Sortand. (Nordamerika)

Slangeørn *Circaetus gallicus*

(Uddød 1882. Herefter 1/1, 31/31, 1/1)

2006: 9.6-8.7, Skagen (NJ), 2K+, trk.fors., *Palle A.F. Rasmussen, Jørgen Kabel, Knud Pedersen m.fl. (Foto).

(Syd- og Østeuropa; overvintrer nordligt i tropisk Afrika).

Steppehøg *Circus macrourus* (14/14, 171/173, -/-)

2005: 23.5, Rørvig (S), 2K trk., *Anders Fischer. – 12.10, Rørvig (S), 1K trk., *Christian Gade, Anders Fischer.

Fuglen fra 23.5 2005 er tidligere godkendt fra Hundested (Amstrup et al. 2006). Arten er udgået af SU-listen fra og med 2006. (Østeuropa og Centralasien; overvintrer tropisk Østafrika, Lilleasien og Indien)

Ørnevåge *Buteo rufinus* (1/1, 13/13, 1/1)

2006: 22.-23.8, Mandehoved, Stevns (S), 1K, rst. og trk., *Bo Tureby m.fl. (Foto).

Fundet er det første fra Stevns og det sjette fra august måned. (Sydøsteuropa og Centralasien samt Nordafrika).

Stor Skrigeørn *Aquila clanga* (3/? , 55/56, 1/1)

2005: 30.4, Hesbjerg samt Hellebæk (S), imm. trk., *Per E. Pedersen, Alexander Lee, Hugo Petersen m.fl.

2006: 10.11, Højerup, Stevns (S), ad. trk., *Jan Pedersen, Tim Andersen m.fl. – 11.-12.11, Vemmetofte (S), ad., rst. og trk., *Lars Adler Krogh, Tim Andersen m.fl. (Foto). – 25.11-31.12, Søholt, Maribosøerne (LF), ad., rst., *Simon Vikstrøm, Tim Andersen m.fl.

Fundene fra 2006 drejer sig om samme individ; fuglen havde et stort hak i de venstre armsvingfjer. (Rusland og østlige Baltikum; overvintrer Sydøsteuropa, Lilleasien og Nordøstafrika)

Lille Skrigeørn *Aquila pomarina* (9/? , 93/97, 7/7)

1993: 29.-30.5, Aborrebjerget (M), 2 subad./ad., rst. og trk., Klaus K. Nielsen, Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl.

2005: 6.5, Lundegård, Præstø (S), 3K, trk., *Lars Paaby.
2006: 7.5, Ballum (SJ), 3K, trk., *Ole Thorup, Klaus B. Fries m.fl. (Foto). – 8.5, Bøtø Nor (LF), 3K+, trk., *Asbjørn Jensen. – 12.5, Aborrebjerget (M), ad., trk., *Niels Bahl Andersen, Jens Toftelund Madsen m.fl. (Foto). – 9.-11.6, Skagen (NJ), 3-4K, trk.fors., *Palle A.F. Rasmussen, Jørgen Kabel, Bo Tureby m.fl. (Foto). – 1.7,

Mou, Ålborg (NJ), ad., trk., *Lars Jakobsen (Foto) – 10.9, Mandehoved, Stevns (S), 3K+, trk., *Lars Paaby, Andreas Bruun Kristensen, Silas K.K. Olofson m.fl. (Foto) – 10.9, Hyllekrog (LF), 3K+, trk., *Jan Speiermann, Michael Fink Jørgensen, Andreas Petersen.

Fuglene fra 1993 regnes som to forskellige fund, idet de sås hver for sig. Fuglen fra 2005 regnes som samme individ, som sås tidligere på dagen på Møn (Amstrup et al. 2006). Tidspunkterne for observationerne 10.9.2006 viser at det drejede sig om to forskellige individer. (Østeuropa; overvintrer sydlige og sydøstlige Afrika)

Duehøg *Accipiter gentilis* (0, 0, 0)

Med karakterer svarende til Russisk Duehøg ssp. *buteoides*

Det hidtil eneste danske fund (17.3 1982, Skagen Nordstrand (NJ), ad. hun (Boertmann et al. 1986)) anerkendes efter genbehandling ikke længere. (Rusland).

Eleonorafalk *Falco eleonora* (0, 6/6, 1/1)

2006: 21.9, Holtug, Stevns (S), ad., lys fase, trk., *Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl.

Fuglen sås trække ud ved Falsterbo tidligere på dagen (A. Blomdahl i brev). (Middelhavet; overvintrer sydlige Afrika).

Jagtfalk *Falco rusticolus* (39/39, 78/78, 1/1)

2006: 23.1-24.3, Bøvling Klit og Stavsholm (RK) og Agger Tange (NJ), 2K, *Søren Wium Andersen, Silas K.K. Olofsson, Søren Kristoffersen, Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl. (Foto) – 21.12, Hanstholm Havn (NJ), 1K, *Søren Kristoffersen (Foto).

Fuglen fra januar-marts er samme fugl som registreres ved Bøvling Klit i perioden 28.10-28.11 2005 (Amstrup et al. 2006), hvorfor den ikke medregnes i opsummeringen. (Nordskandinavien).

Stortrappe *Otis tarda* (?/? , 5/5, 0/0)

1964: "allersidst på efteråret", Febbersted, Thy (NJ), hun, skudt, via John Kyed (Foto).

Fuglen fandtes tidligere i en privat samling, men er nu overdraget til Hanstholm Friskole. (Sydeuropa, Østeuropa og Rusland).

Dværgtrappe *Tetrax tetrax* (19/20, 3/3, 0/0)

1991: 27.7-27.8, Reersø (S), Flemming H. Nielsen.

Fuglen er tidligere godkendt for perioden 27.7-24.8 (Frich & Nordbjærg 1993). (Sydeuropa og Rusland)

Stylteløber

Himantopus himantopus (13/16, 29/41, 1/2)

2006: 4.-7.5, Lidsø, Rødby (LF), 2 eks. (+), *Ole Friis Larsen m.fl. (Foto).

Der er nu fund fra maj 9 år i træ og arten forekommer kun undtagelsesvis udenfor denne måned. (Mellem- og Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika)



Jagtfalk 1k, Hanstholm, 21. december 2006.
Foto: Søren Kristoffersen.



Jagtfalk, Agger Tange, 18. marts 2006. Foto: Søren Kristoffersen.



Triel, Skivholme, Østjylland, 17. juli 2006. Foto: Peter Nielsen.

Triel *Burhinus oedicnemus* (17/22, 22/22, 1/1)

2006: 16.-29.7, Skivholme (ÅH), *Jesper Windeløv, Tommy Kaae m.fl. (Foto).

(Mellem- og Sydeuropa; overvintrer Sydeuropa og Nordafrika).

Sortvinget Braksvale

Glareola nordmanni (2/2, 7/7, 1/1)

2006: 28.7, Margrethe Kog (SJ), 2K+, *Stefan Pihl. – 29.7-11.8, Sneum Sluse (RB), 2K+, *Svend-Erik Petersen, *Peter J. Petersen, Ole Amstrup m.fl. (Foto).

Begge observationer drejer sig med al sandsynlighed om samme fugl, hvorfor det kun regnes som ét fund. (Sortehavsegnene og Centralasien; overvintrer i det sydlige Afrika).



Sortvinget Braksvale, Sneum Engso, 10. august 2006. Foto: Carsten Gadgård.



Amerikansk Hjejele, Arup Vejle, 3. maj 2006. Forrest til højre med Hjejler til venstre. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

Sibirisk Hjejele *Pluvialis fulva* (0, 22/22, 3/3)

2003: 18.5, Revlbuske, Lønnerup Fjord (NJ), 2K, Mogens Erlandsen.

2006: 6.5, Lund Fjord (NJ), ad. sdr., *Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Foto). – 3.-9.7, Vidåslusen (SJ), ad. sdr., *Martin Kviesgaard m.fl. (Foto). – 10.7, Geddal Enge (RK), ad. sdr., *Leif Novrup m.fl. – 15.-16.10, Mandø (RB), ad. odr., *Henrik Mikkelsen, Freddy S. Hansen, Silas K.K. Olofson, Helge Sørensen m.fl. (Foto).

Ved Revlbuske blev der i 2003 set to forskellige individer hhv. 10.5 og 16.5. En beskrivelse fra 18.5 stemmer mest overens med beskrivelsen fra 10.5 (Amstrup et al. 2004, Amstrup et al. 2005). Fuglen fra Lund Fjord i 2006 regnes som samme individ, som stod på samme mark i hhv. 2004 og 2005 (Amstrup et al. 2005, Amstrup et al. 2006). Derfor regnes den kun som ét fund for årene 2004-2006 og opsummeringen er ændret. Månedsfordelingen er nu: april (1), maj (2), juli (14), august (2), september (3), oktober (3). (Nordrusland og Alaska; overvintrer i Sydøstasien og Australien).

Amerikansk Hjejele *Pluvialis dominica* (0, 9/9, 1/1)

2006: 3.-5.5, Arup Vejle, Vejerne (NJ), ad. sdr. *Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Foto).

Månedsfordelingen er nu: maj (3), juni (1), juli (1), august (1), september (3), oktober (1). (Nordamerika; overvintrer i Sydamerika).

Tyknæbbet Dværgryle *Calidris pusilla* (0, 1/1, 0)

Landets første forekomst (18.9 1987 Skagen (NJ)) anerkendes efter genbehandling ikke længere. Fundet er nævnt i Olsen (1991). Landets eneste fund er hermed 30.5-1.6 2005 Sneum Forland (RB) (Amstrup et al. 2006). (Nordamerika; overvintrer Sydamerika)

Hvidrygget Ryle *Calidris fuscicollis* (0, 17/17, 1/1)

2006: 29.5-2.6, Ulvshale Nordstrand (M), 2K+ sdr., *Per Schiermacker-Hansen m.fl. (Foto).

Arten er nu truffet hele 4 gange ved Ulvshale Nordstrand. (Arktisk Canada; overvintrer i Sydamerika).

Bairdsryle *Calidris bairdii* (0, 1/1, 1/1)

2006: 26.8, Geråens udløb (NJ), 2K+, *Rune Sø Neergaard (Foto).

Landets andet fund dukkede op ganske tæt på hvor landets første fund noteredes: 19.-23.9 2000, Stensnæs, Sæby (NJ) (Nielsen & Thorup 2001) (Nordamerika; overvintrer Sydamerika)

Spidsshalet Ryle *Calidris acuminata* (0, 0, 0)

Samtlige tre fund af arten (16.8 1989, Bygholm Vejle, Vejlerne (NJ), 25.8 1989, Bygholm Vejle, Vejlerne (NJ), 1K og 1.10 1996 Storefener, Kongeåslusen (RB), 1K (Olsen 1991, Rasmussen 1997)) anerkendes efter genbehandling ikke længere. Arten udgår dermed af den danske fugleliste. (Asien)

Prærieløber *Tryngites subruficollis* (1/1, 26/26, 0/0)

1977: 16.-22.10, Sidselbjerg, Vest Stadil Fjord (RK), Alex Sand Frich m.fl.



Hvidrygget Ryle, Ulvshale Nordstrand, Møn, 1. juni 2006.
Foto: Harry Lehto.



Bairdsryle, Gerå, 26. august 2006. Foto: Rune Sø Neergaard.
Fuglen midt i billedet med front imod sammen med Almindelig Ryle.

1995: 15.8-2.9, Indvindingen, Vester Vedsted (RB), Morten M. Hansen m.fl.

De omtalte fund er tidligere godkendt for hhv. 16.-21.10 1977 og 15.-28.8 1995 (Pedersen 1980, Rasmussen 1997). (Arktisk Nordamerika; overvintrer sydlige Sydamerika)

Terreklire *Xenus cinereus* (2/2, 35/35, 2/2)

2006: 25.-30.5, Kammerslusen (RB), 2K+, *Alex Sand Frich m.fl. (Foto). - 5.7, Tipperne (RK), 2K+, *Henrik Knudsen.

To typiske fund. Arten har været årlig siden 1998. Månedsfordelingen er nu maj (13), juni (8), juli (12), august (2) og september (4). (Finland og Nordrusland; overvintrer tropisk Afrika og Det Indiske Ocean)

Ringnæbbet Måge *Larus delawarensis* (0, 1/1, 1/1)

2006: 26.2-26.3, Nærum (S), 2K ringm., *Kjeld T. Pedersen, *Eddie Fritze, Arne Olesen m.fl. (Foto).

Fuglen blev fundet i forbindelse med ringmærkning og den blev mærket med en rød farvering med koden Y56. (Nordamerika)



Ringnæbbet Måge, Nærum, 12. marts 2006.
Foto: Gerner Majlandt..



Terreklire, Kammerslusen, Ribe, 29. maj 2006. Foto: Carsten Gadgård.



Audouinmåge, Helsingør Havn, 10. juni 2006. Foto: Helge Sørensen.

Audouinmåge *Larus audouinii* (0, 0, 1/1)

2006: 9.-12.6, Helsingør Havn, (S), 4K, *Jan Hjort Christensen, Arne Olesen m.fl. (Foto).

Ny art for landet. Der har været en række fund af arten i Nordvesteuropa indenfor de senere år, senest Finland 2007 (Gantlett et al. 2007) hvilket kan ses i sammenhæng med en markant bestandsstigning i den vestlige del af Middelhavet. (Sydeuropa, overvinter Afrika)

Hvidvinget Måge *Larus glaucoides* (0, 0, 0)

Med karakterer svarende til ssp. kumlieni
Det hidtil eneste danske fund (22.2 1987 Hanstholm Havn (NJ), 3K (Olsen 1989)) anerkendes efter genbehandling ikke længere. (Canada)

Thayers Måge *Larus thayeri* (0,1/1,0)

2002: 17.1, Hirtshals Havn (NJ), 2K, Morten M. Hansen m.fl.

Fuglen er tidligere godkendt for perioden 15.-16.1 2002 på lokaliteten (Klein et al. 2003).
(Nordvestlige Canada)

Ismåge, Langø, 29. december 2006. Foto: Ole Krogh.



Rosenmåge *Rhodostethia rosea* (1/1, 8/8, 0)

1984: 30.1-5.2, Thorsminde Havn (RK), ad., Niels Bomholt Jensen m.fl.

1988: 8.-21.5, Esbjerg Havn (RB), ad., John Kyed m.fl.

Fundene er tidligere godkendt for hhv. 30.1-4.2 1984 og 8.-18.5 1988 (Boertmann et al. 1986, Olsen 1989). (Arktis, Sibirien)

Ismåge *Pagophila eburnea* (2/2, 4/4, 1/1)

2006: 27.-31.12, Langø Havn (LF), 3K+, *Lars Adler Krogh m.fl. (Foto).

Ny art for regionen og en længe ventet gæst fra det høje nord. Seneste fund er fra 1994 og drejede sig om en dødfunden fugl (Rasmussen 1996). Man skal helt tilbage til 1983 for at finde seneste fund af en Ismåge set i levende live herhjemme (Boertmann et al. 1986). (Arktis, Sibirien)



Skadegøg, Birkepøl, Sydals, 3. august 2006. Foto: Jens Kristian Kjærgaard.

Hvidskægget Terne

Chlidonias hybridus (0,18/22,1/1)

1983: 14.+16.+24.5 og 18.6, Tipperne (RK), Jens Lind.

2006: 26.4, Korshage, Rørvig (S), ad. sodr. trk., *Erik Vikkelsø Rasmussen, Lasse Braae, Anders Fischer, Christian Gade.

Fundet fra 1983 er tidligere godkendt for datoerne 14.+16.5 og 18.6 (Boertmann et al. 1986). April-fundet er det tidligste herhjemme med 3 dage. (Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika)

Skadegøg *Clamator glandrius* (3/3, 2/2, 1/1)

2006: 1.-11.8, Birkepøl, Sydals (SJ), 1K, *Gert L. Jørgensen, Kim Søvæld m.fl. (Foto).



Høgeugle, Grib Skov, 18. marts 2006. Foto: Helge Sørensen.

Seneste fund er også fra Sønderjylland, men fra 1995 (Rasmussen 1997). (Sydeuropa; overvintrer Afrika)

Høgeugle *Surnia ulula* (ca. 30/30, 39/39 ud over invasionen i 1983/84, 1/1)

1990: 4.3, Margrethelund Plantage, Viborg (NJ), Flemming H. Nielsen.

2006: 1.1-5.2, Hjørdemål (NJ), *Peter H. Kristensen, Jens Kristian Kjærgaard m.fl. (Foto) – 14.1-25.3, Grib Skov (S), *Kim Lunding, Arne Olesen m.fl. (Foto).

Fuglen fra 1990 er tidligere godkendt fra og med 5.11 1989 (Olsen 1991). Fuglen ved Hjørdemål blev opdaget 18.12 2005 og indgår derfor ikke i opsummeringen (Amstrup et al. 2006). (Skandinavien, Finland og Rusland)

Spurveugle *Glaucidium passerinum* (17/17, 31/31 ud over invasionen på Sjælland i 1999/2000, 1/1)

2006: 11.-24.3, Frederiksdal Skov (S), *Steffen Sommer Nielsen, Preben Berg m.fl. (Foto). (Skandinavien, Finland og Rusland)

Korttået Lærke *Calandrella brachydactyla* (0, 38/38, 1/1)

2006: 17.5, Tarphage Enge (RB), *Carsten Gadgaard m.fl. (Foto). (Sydeuropa)

Østlig Kalandrlærke *Melanocorypha bimaculata* (0, 0, 1/1)

2006: 1.-4.1 og 3.-6.3, Staunings Ø (S), *Connie Grubbe Jensen, Rasmus Strack m.fl. (Foto).



Spurveugle, Frederiksdal Skov, 11. marts 2006. Foto: Helge Sørensen.



Korttået Lærke, Tarp Enge, 17. maj 2006. Foto: Carsten Gadgaard.

Ny art for landet. Med bl.a. 5 fund i Sverige var det ventet at arten også ville dukke op herhjemme. (Mellemøsten og sydlige Asien; overvintrer Nordøstafrika, Mellemøsten mod øst til Nordindien)

Gul Vipstjert *Motacilla flava*

Med karakterer svarende til Sorthovedet Gul Vipstjert, ssp. feldegg (0, 13/14, 1/1)

2006: 16.-31.7, Kelds Nor, Langeland (F) sdr., *Henrik Knudsen m.fl. (Foto).

(Balkan og Lilleasien; overvintrer tropisk Afrika)

Citronvipstjert *Motacilla citreola* (0, 26/27, 4/4)

2006: 28.4, Grenen, Skagen (NJ), 2K+ , trkf., *Alex Sand



Alpejerspurv, Munkeruphøve, Sjælland, 18. april 2006. Foto: Lars Jensen.

Frich, Rasmus Turin m.fl. – 14.5, Sydvestpynten, Kongelunden, (S), hun-farvet, *Preben Berg. – 23.8, Borreby Mose (S), 1K, rst., derefter trk. *Rasmus Strack, *Sebastian Klein. – 31.8, Nexø Havn, (B), 2K+, rst., derefter trk., *Sune Riis Sørensen (Foto).

4 fund på et år er ny rekord. (Rusland mod vest til Baltikum og Polen; overvintrer Indien og fåtalligt Arabien)

Alpejerspurv *Prunella collaris* (1/1,9/9,1/1)

2006: 18.4, Munkerup (S), *Allan Nielsen, Arne Olesen m.fl. (Foto).

Fuglen opholdt sig i et parcelhuskvarter. (Alperne og Sydeuropa; overvintrer i østlige og sydlige Afrika)



Østlig Kalenderlærke, Staunings Ø, 3. januar 2006. Foto: Ole Krogh.



Brun Løvsanger, Korshage, Rørvig, 14. oktober 2006.
Foto: Lars Jensen.

Lille Gulbug / Steppegulbug *Hippolais caligata* / *Hippolais rama* (0, 4/4, 0)

2001: 16.10, Nexø Havn (B), *Henrik Haaning Nielsen, *Søren Haaning Nielsen, *Michael Mosebo Jensen m.fl. (Foto).

Lille Gulbug er nu splittet op i to arter: Lille Gulbug *H. caligata* og Steppegulbug *H. rama*. Arterne ligner hinanden meget og er vanskelige at skelne i felten. (Rusland og Centralasien; overvintrer Indien)

Spottesanger *Hippolais polygotta* (0, 2/2, 0)

Et hidtil godkendt fund (20.8 1978, Korshage, Rørvig (S), 1K ringm. (Frich & Nordbjærg 1992)) anerkendes efter genbehandling ikke længere. De to godkendte fund er: 11.-22.6 1982, Klinteskoven ved Jydelejet (M) og 1.6 1990 Blåvands Huk (RB) (Hansen 1986, Frich & Nordbjærg (1992). (Sydeuropa; overvintrer Afrika)

Brun Løvsanger

*Phylloscopus fuscatu*s (0, 39/39, 3/3)

2005: 12.10, Christiansø (B), *Lars Christiansen, Peter Lyngs, Mikkel Lausten m.fl.

2006: 4.10, Frederikssø, (B), *Henning Vikkelsø Rasmussen, Peter Lyngs, Mikkel Lausten m.fl. – 11.10, Christiansø (B), ringm., *Mikkel Lausten, Peter Lyngs m.fl. (Foto). – 14.-15.10, Korshage, Rørvig (S), *Erik Vikkelsø Rasmussen m.fl. (Foto).

Et fund fra 9.11 1987 Stignæs (S) anerkendes ikke længere efter genbehandling (Olsen 1988). Derfor er der ændret i opsummeringen. Af landets 42 fund er de 22 registreret på Ertholmene (B). (Østsibirien; overvintrer Indien til Øst- og Sydøstasien)

Nordsanger *Phylloscopus borealis* (0, 3/3, 0/0)

Et hidtil godkendt fund (27.5 1988, Amager Fælled (S), syng. (Olsen 1989)) anerkendes efter genbehandling ikke længere. De tre godkendte fund er fra: 18.-20.9 1996, Tipperne (RK), 28.9 1998, Blåvands Huk (RB) og 22.8 2001, Holmsland Klit (RK) (Rasmussen 1997, Ras-



Stribet Sanger, Mandø, 16. oktober 2006. Foto: Ole Krogh.

mussen 1999, Ortvad et al. 2002). (Nordskandinavien og Sibirien; overvintrer Filippinerne, Sydøstasien og Indonesien)

Humes Sanger *Phylloscopus humei* (0, 22/22, 0/0)

2003: 13.-17.11, Gammel Hviding Kirke (RB), *Kurt B. Christensen, Martin Kviesgaard m.fl.

Hermed tiende fund fra rekordåret 2003 (Amstrup et al. 2004). (Himalaya og Tien Shan; overvintrer Nepal og Indien)

Rosenbrystet Tornskade

Lanius minor (3/3, 42/42, 2/2)

2006: 7.6, Margrethe Kog (SJ), 2K+ , *Kent Olsen. – 5.8, Borris Hede (RK), 2K+, *Egon Østergaard m.fl. (Foto).

(Syd- og Østeuropa samt Centralasien; overvintrer tropisk Afrika)

Stribet Sanger *Dendroica striata* (0, 0, 1/1)

2006: 15.-16.10, Mandø (RB), 1K, *Tim Hesselballe Hansen m.fl. (Foto).

Ny art for landet og første fund af en amerikansk skovsanger-art. (Nordamerika; overvintrer nordlige Sydamerika)

Dværgværling *Emberiza pusilla* (0, 66/66, 2/2)

2006: 1.2-1.4, Sivested, Kolind (ÅH), *Ingelise Jensen,

Birger Jensen m.fl. (Foto). – 3.11, Grenen, Skagen (NJ), trkf., *Rolf Christensen, *John Pedersen, *Andreas Bruun Kristensen.

Første fund for februar. Eneste øvrige vinterfund stammer fra Vorsø (VE) 9.-26.12 1986 (Olsen 1988). (Nordfinland og Nordrusland; overvintrer Kina og Sydøstasien).

Kategori D:

Mulige undslupne fangenskabsfugle

Category D: Possible escapes

Brunhovedet Værling

Emberiza bruniceps (0, 7/7, 0)

1967: "efter 16.8", Febbersted, Thy (NJ), ad. , fundet død, via John Kyed (Foto).

(Centralasien; overvintrer Indien)

Kategori E: Sandsynlige eller sikre undslupne fangenskabsfugle

Category E: Likely or certain escapes

Krøltoppet Pelikan *Pelecanus crispus*

1974-1976: 2. halvår 1974 primært set i Vejlerne (NJ). 1. halvår 1975 Vejlerne og Agger Tange (NJ). Andet halvår 1975 Læsø, Skagen, Limfjordsområdet og Thy (NJ). Første halvår 1976 Vejlerne og Østre Anlæg, Ålborg (NJ), fuglen fandtes død på sidstnævnte lokalitet 26.3, Hans Christophersen (Foto).



Dværgværling, Sivested, 24. marts 2006. Foto: Kim Aaen.

Det drejer sig om samme fugl, som sås på Tipperne 12.5 1974 og i Vejlerne 16.-24.5 1974 (Pedersen 1980). Fuglen kan muligvis spores tilbage til en østjysk fugleholder. Den bar ingen ringe, men SU vurderer at det med største sandsynlighed har drejet sig om en undsluppet burfugl, idet den var tam og Østre Anlæg næppe havde faldet i en vild pelikans smag.

Hybrider

Records involving hybrids

Hvidøjet x Troldand *Aythya nyroca x fuligula*

2005: 28.7, Hejrede Sø, Maribosøerne (LF), , Klaus Malling Olsen (Foto),

2006: 26.-29.7, Sønderød, Maribosøerne (LF), , *Rasmus Strack, Sebastian Klein, Andreas Bruun Kristensen m.fl. (Foto). – 8.11, Bøjden Nor (F), , *Tim Hesseballe Hansen, Bente Christensen, Jacob Størup (Foto).

Fuglen fra Sønderød 2006 drejer sig formentlig om samme individ, der sås i Hejrede Sø i 2005.

Troldand x Halsbåndstroland *Aythya fuligula x collaris*

2006: 12.-18.3, Gavnø (S), ad. , *Lars Michael S. Nielsen, Klaus Malling Olsen, Rasmus Strack m.fl. (Foto). Andet danske fund af denne hybrid, første sås i foråret 2001 og igen på to lokaliteter i foråret 2002 i Vestjylland (Klein et al. 2003).

Grønland – Kategori A

Greenland – Category A

Krikand/Amerikansk Krikand *Anas crecca/carolinensis*

2006: 25.-26.8 1 med 5 pull., Kapisillit-fjorden/Isfjorden, *Martin Kviesgaard, Lars Witting (Foto). Jagttagelsen er indsendt som Krikand, men dokumentationen tillader ikke udelukkelse af Amerikansk Krikand.

Skeand *Anas clypeata* (? , ?/? , 1/2)

2006: 16.6, Sisimiut, 2 (+), *Jørgen Nielsen, Kaj Høgh (Foto).

Stribet Ryle *Calidris melanotos*

2006: 6.-7.7, Zackenberg, *Jannik Hansen, Christian Dinsen (Foto).

Ringnæbbet Måge *Larus delawarensis* (? , ?/? , 1/1)

2006: 12.7, Qarajat qeqertait Øerne syd for Lille Narsaq, Nuuk, ad., Lars Witting, Aili Lage (Foto).

Østlig Kongetyran *Tyrannus tyrannus* (? , ?/? , 1/1)

2006: 12.7, Paamiut, *Aron Peter Fly (Foto).

Årsrapporten

Species considered for regional reports

Grønspætte *Picus viridis*

2006: 26.4, Korshage, Rørvig (S), *Anders Fischer m.fl. – 13.5, Vestamager, København (S), trk., *Morten Kofoed-Hansen, *Kristoffer Hansen, *Ib Jensen.

Endnu ikke færdigbehandlede sager

Records still under consideration

- Lille Canadagås *Branta hutchinsii* 2004: Maj, Borreby Mose (S). (Foto). – 21-22.3, Margrethe Kog (SJ). (Foto).
- Sibirisk Krikand *Anas formosa* 2005: 24.11, Skælskør (S), 1K , skudt.
- Halsbåndstroland *Aythya collaris* 2006: 1.10, Sønderød, Maribosøerne (LF), ad. .
- Hvidøjet And *Aythya nyroca* 2004: 6.-20.3, Gavnø (S).
- Stylteløber *Himantopus himantopus* 1998: 16.5, Borreby Mose (S), 3 eks.
- Rødvinget Braksvale *Glareola pratincola*: 2006: 13.6, Store Stege, Fåborg (F), trk.
- Perleugle *Aegolius funereus* vinteren 1967/68: Kongelunden (S), 3 eks.
- Gul Vipstjert *Motacilla flava*, ssp. *feldegg* 2002: 20.5, Gilleleje (S), .
- Vestlig Bjergløvsanger *Phylloscopus bonelli* 2005: 31.5, Skagens Gren (NJ), ringm., (Foto).
- Ensfarvet Stær *Sturnus unicolor* 2003: 15.4-31.5, Tane Sø (RB) .

Forkastede sager

Records not accepted

- Kap Verdepetrel/Madeirapetrel *Pterodroma fea/madeira* 2003: 12.10, Helsingør Nordhavn (S).
- Lille Skråpe *Puffinus assimilis* 1997: 18.6, Nordsoen.
- Hvidøjet And *Aythya nyroca* 2006: 11.4, Nakskov Indrefjord (LF), – 9.7, Bøjden Nor (F), . – 27.8, Gentofte Sø (S), 2 ind.
- Steppehøg *Circus macrourus* 2005: 21.8, Borreby Mose (S), ad. trk.
- Ørnevåge *Buteo rufinus* 2006: 11.-18.8, 2K, Blåvands Huk (RB).
- Lille Skrigeørn *Aquila pomarina* 2006: 31.5, Hostrup Sø, Åbenrå (SJ), trk. – 9.6, Solkær Enge, Kolding (VE), trk.
- Kejserørn *Aquila helica* 2005: 13.5, Borreby Mose (S).
- Steppevåge *Buteo bueo* ssp. *vulpinus* 2006: 11.5, Skagens Gren (NJ) ad., trkf.
- Duehøg *Accipiter gentilis* ssp. *buteoides* 1982: 17.3, Skagen Nordstrand (NJ).
- Jagtfalk *Falco rusticolus* 2006: 18.11, Hejrede Sø, Maribosøerne (LF).
- Sibirisk Hjejle *Pluvialis fulva* 2006: 25.7 Rørvig (S) ad. sodr. – 13.9 Lejsø, Korsør (S) 1K, (Foto).
- Sibirisk/Amerikansk Hjejle *Pluvialis fulva/dominica* 1995: 31.8 trk. Grønjødsøen, Amager (S).

- Tyknæbbet Dværgryle *Calidris pusilla* 1987: 18.9 Skagens Gren (NJ).
- Spidshalet Ryle *Calidris acuminata* 1989: 16.8 Bygholmengen (NJ). – 25.8 Bygholmengen (NJ), 1K. – 1996: 1.10 Storefener, Kongeås-lusen (RB), 1K.
- Damklire *Tringa stagnatilis* 2005: 4.9 Agger Tange (NJ).
- Armensk Måge *Larus armenicus* 2006: 3.4 4K+ Billum (RB).
- Kumlien's Måge *Larus glaucooides* ssp. *kumlieni* 1987: 22.2, Hanstholm Havn (NJ), 3K.
- Azteker-/Bengalsk Terne *Sterna elegans/bengalensis* 2006: 11.4 1 trk. Lejodde, Korsør (S).
- Forsters Terne *Sterna forsteri* 2006: 6.7 Nørre Lyngvig (RK), ad. vdr. trk.
- Spurveugle *Glaucopteryx holbrooki* 2006: 4.4 Hornbæk (S).
- Alpesejler *Apus melba* 2005: 7.9 Hellebæk (S).
- Gråsejler *Apus pallidus* 1987: 19.10, 1K ringm., Christiansø (B).
- Korttået Lærke *Calandrella brachydactyla* 2006: 4.5 Korshage, Rørvig (S), trk. – 22.5 Grenen, Skagen (NJ), trkf.
- Gul Vipstjert *Motacilla flava*, ssp. *feldegg* 2006: 15.5, Tontoft Nakke, Nordborg (SJ), .
- Tornsanger *Sylvia communis* 2006: 18.4 Amager Fælled (S).
- Buskrørsanger *Acrocephalus dumetorum* 2006: 12.5 syng. Sønderkoven (SJ).
- Spottesanger *Hippolais polygotta* 1978: 20.8, Korshage, Rørvig (S), 1K ringm.
- Brun Løvsanger *Phylloscopus fuscatus* 1987: 9.11 Stigs-næs (S).
- Løvsanger *Phylloscopus trochilus* 2006: 21.-26.12 Jyderup (S).
- Nordsanger *Phylloscopus borealis* 1988: 27.5, Amager Fælled (S), syng.
- Dværgeværling *Emberiza pusilla* 1969: 21.4 Refshaleøen (S), 2 eks. – 2006: 8.5, Rørvig (S). – 15.10 Næs-skoven, Furesøen (S).
- Pileværling 2006: 13.9 Dueodde (B), trk.

Summary

Rare birds in Denmark and Greenland in 2006

In 2006, the Danish Rarities Committee (Sjældenhedsudvalget, SU) processed 141 Danish records (including two records on behalf of the regional reports) of which about 70% were accepted. Five records from Greenland were processed of which four were accepted.

The main section of the report, Accepted records, includes species on the Danish list belonging to categories A, B and C according to the AERC standard. Species belonging to category D and E and records involving hybrids are treated after the main section, as are species considered for the regional reports, before the sections dealing with records from Greenland, records still under consideration, and records not accepted.

For each record the following details are included: (1) year and date, (2) location (see map for regions), (3)

number of individuals if more than one, (4) other details if known: sdr. = summer plumage, vdr. = winter plumage, odr. = transitional plumage, K = calendar year, ringm. = ringed, and (5) name of observer(s), with finders marked by asterisk(s). Where applicable, documentation by photo (Foto), video (Video), audiotape (Bånd) or corpse (Død) is indicated.

The numbers in brackets after the species name refer to the total number of records and individuals (separated by a slash) in Denmark (1) before 1950, (2) from 1950 to 2004 incl. and (3) in 2005, respectively.

Four new species recorded during 2006 were added to the Danish list: Dalmatian Pelican *Pelecanus crispus*, Audouin's Gull *Larus audouinii*, Bimaculated Lark *Melanocorypha bimaculata* and Blackpoll Warbler *Dendroica striata*. Other remarkable sightings included the second records of Ring-billed Gull *Larus delawarensis* and Baird's Sandpiper *Calidris bairdii*, the third record of Black Scoter *Melanitta americana* and the sixth record of Great Spotted Cuckoo *Clamator glandarius*. All older records Danish records of Goshawk *Accipiter gentilis beteoides*, Sharp-tailed Sandpiper *Calidris acuminata* and Iceland Gull *Larus glaucooides kumlieni* were reconsidered and rejected. From Greenland, Ring-billed Gull and Eastern Kingbird *Tyrannus tyrannus* were documented for the first time.

Referencer

- Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, H.H. Nielsen, K. Pedersen, K. Thorup 2006: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005. Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 100: 359-371.
- Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, K. Pedersen, K. Thorup 2005: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004. Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 99: 169-181.
- Amstrup, O., A. S. Frich, K. Pedersen & K. Thorup 2004: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2003. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: 174-188.
- Boertmann, D., K.M. Olsen & B.B. Pedersen 1986: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i årene 1982, 1983 og 1984. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 80: 35-57.
- Bruun, Jens Bruun, J.R. Jacobsen, E. Kramshøj & B.P. Nielsen 1972: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1971. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 66: 123-131.
- Fisher, A. & B. Flood 2004: A Scopoli's Shearwater off the Isles of Scilly. Birding World vol. 17: 334-336.
- Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1992: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1990. Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 86: 107-122.
- Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1993: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1991. Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 87: 231-241.
- Gantlett, S., R. Millington & S. Harrap 2007: Western Palearctic Bird News – Birding World vol. 20: 278.
- Klein, S., K. Pedersen & K. Thorup 2003: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2002. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 97: 289-302.
- Hagerman, A. & I. Jensen 2006: En ægte pelikan? Fugle i felten, nr. 4 2006, s. 26.
- Hørring, R. 1942: Om 6 for Danmarks Fauna nye fuglearter. Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 36: 40-54.

- Nielsen, H.H. & K. Thorup 2001: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: 153-166.
- Olsen, K.M. 1988: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1986 og 1987. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: 81-100.
- Olsen, K.M. 1989: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1988. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: 131-149.
- Olsen, K.M. 1991: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1989. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 85: 20-34.
- Ortvad, T.E., K. Pedersen & K. Thorup 2002: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2001. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 96: 147-160.
- Pedersen, B.B. 1980: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1977 og 1978. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 74: 127-140.
- Rasmussen, P.A.F. 1996: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1994. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 90: 141-152.
- Rasmussen, P.A.F. 1997: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og 1996. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 133-150.
- Rasmussen, P.A.F. 1998: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1997. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: 253-267.
- Rasmussen, P.A.F. 1999: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1998. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: 127-140.
- Thorup, K. & H.H. Nielsen 2000: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: 157-170.

Rettelse til SU-rapport nr 31 DOFT 95: 153-166, 2000

Kategori A: Spontane forekomster

s. 158 Kejserørn *Aquila heliaca* 2000: 19-20.12, St. Vildmose (NJ), 1K, *Einar Flensted-Jensen m.fl. (Foto), skal være 19-21.12.

Rettelse til SU-rapport nr 35 DOFT 99: 169-181, 2005

Kategori A: Spontane forekomster

S. 172: Amerikansk Rørdrum *Botaurus lentiginosus*. Fund fra Vejlerne 2001, 2002, 2003 og 2004 regnes nu som samme fugl. Idet Sjældenhedsudvalget har valgt at fund af returnerende individer ikke påvirker opsummeringen ændres den til (0, 2/2, 0).

Ole Amstrup (olea@nypost.dk)
Tarmvej 97
6893 Hemmet

Andreas Bruun Kristensen (anbrkr@yahoo.dk)
Æbeløgade 46, 2
2100 København Ø

Troels Eske Ortvad (teortvad@gmail.com)
Arkonagade 19, st.tv.
1726 København V



Skadegøg, Birkepøl, Sydals, 6. august 2006. Foto: Helge Sørensen.